


14242/B

vol. 2.

prezzo Fr. 60



CONSIDERAZIONI

S O P R A

I CORPI ORGANIZZATI

Dove si tratta della loro origine, del loro sviluppo, della loro riproduzione ec. e dove si raduna in compendio tutto ciò che la storia naturale, offerisce di più certo, e di più interessante sopra questa materia.

O P E R A

DEL C. BONNET

DELLE ACCADEMIE D'INGHILTERRA, DI SVEZIA, DELL' ISTITUTO DI BOLOGNA, CORRISPONDENTE DELL' ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE, ec.

RECATA DAL FRANCESE

DAL P. F. F. N. N.

Sacerdote Professo Carmelitano Scalzo della Provincia di Toscana.

T O M O P R I M O.



IN VENEZIA,

APPRESSO FRANCESCO DI NICCOLÒ PEZZANA.



MDCCLXXLI.

CON APPROVAZIONE, E PRIVILEGIO.



P R E F A Z I O N E .

*D*Opo aver tentato di analizzare le facoltà dell'anima nostra (1), ho procurato di analizzare l'origine, lo sviluppo, e la generazione de' Corpi Organizzati. Non si presuma che io abbia preteso di scuoprare il mistero della generazione: egli è tuttora nascosto a' più valenti fisici; io ho
sola-

(1) Saggio Analitico sopra le facoltà dell' Anima. A Copenhague, chez les Freres Philibert 1760. in quarto.

solamente cercato di ricondurre questa bella parte della storia naturale a' principj più filosofici di quelli che si era procurato di sostituire loro in questi ultimi tempi . Li primi otto Capitoli di queste Considerazioni , sono opera della mia gioventù , li ho presi da un' Opera più voluminosa , che aveo intitolata Contemplazioni della Natura , e non era , che un seguito di meditazioni filosofiche intorno alla natura ; l' aveo già quasi condotta a perfezione , allorchè la interruppi per travagliare intorno alle mie Ricerche sopra l' uso delle foglie nelle piante , che pubblicai nel 1754. (1) Allettato dopo dalle meditazioni di un' altro genere , obbliai la mia contemplazione della natura : nientemeno di tempo in tempo attendevo a prenderne quello , che aveo scritto intorno alla generazione , ed a sottometterlo al giudizio del pubblico ; ma sempre ero ritenuto dal sentimento della sua imperfezione : presi adunque il partito di differire la pubblicazione di questo scritto , e di attendere de' nuovi lumi dalle esperienze , di cui la fisica quotidianamente è arricchita . Io aveo ammessa l' evoluzione , come

(1) A Leide, chez Elie Luzac, in 4. avec Figures.

me il principio più conforme a' fatti , e alla sana filosofia ; supponevo che ogni corpo organizzato preesistesse alla fecondazione , e che questa sviluppasse il tutto organico disegnato avanti in miniatura nel granello , o nell' uovo . Io procuravo di spiegare come la fecondazione operasse questo effetto , ed a misura che analizzavo mi persuadevo di mano in mano che un giorno si dimostrerebbe la preesistenza del germe nella femmina , e che lo spirito seminale niente generasse . Ma io non facevo che vedere , e volevo vedere per ragionare con più forza . Alcuni fatti mi sembravano equivoci , altri mi erano apparentemente contrarj , e quantunque io conoscessi che vi sarebbero stati de' mezzi per conciliarli colle mie idee , contuttociò non ero contento de' miei tentativi in questo genere . Io sempre pensavo che non vi era nessuna generazione propriamente detta , e che tutto si riduceva ad un semplice sviluppamento ; avevo tra mano molti fatti i quali pareva che concorressero a provarlo ; procuravo di penetrare questi fatti ; li paragonavo tra loro , li scomponevo ; opponevo la mia ipotesi a quella che avea pubblicata un celebre accademico ; e questo parallelo che non mi era contrario , terminava di confermarmi ne' miei primi principj . In-

tanto rimaneva sempre da dimostrarsi che il germe appartenesse alla femmina , e che in questa maniera preesistesse alla fecondazione , e che l'evoluzione fosse la legge universale di tutti gli esseri organizzati . Finalmente questa importante scoperta che io attendevo , e che avevo osato predire , mi fu annunziata nel 1757. dal Sig. Baron De Haller che l'avea ricavata dalla natura medesima . Io avevo detto nel mio scritto (come si può vedere nell' articolo 125.) rispondendo ad una obbiezione che si poteva prendere dalle osservazioni di Malpighi intorno al pollo , che si volea giudicare del tempo in cui le parti di un corpo organizzato hanno incominciato ad esistere , da quello , in cui hanno incominciato a diventar sensibili . Non si considera , soggiungo io , che il riposo , la picciolezza , e la trasparenza di alcune di queste parti , quantunque realmente esistono , possono rendercele invisibili . La scoperta del Sig. De Haller dimostrava rigorosamente questa gran verità , e provava ancora di una maniera incontrastabile che il pollo apparteneva originalmente alla gallina , e ch'è preesisteva alla concezione : le sue belle memorie sopra la formazione del pulcino , che questo valente Fisico mi mandò ben presto , mi somministrarono tutte le particolari-

*larità che io cercavo . Io mi affrettai di dimo-
strargli la mia giusta gratitudine , e la mia sod-
disfazione , nella lettera seguente data in Ginevra
il 30. di Ottobre 1758.*

„ Le vostre scoperte sopra i pulcini m' in-
„ cantano: io non pensavo che il segreto del-
„ la generazione incominciasse così presto a
„ svelarsi , voi Signore avete saputo prender
„ la natura sul fatto . Io aveo tentato die-
„ ci anni sono d' indovinarla , e rimasi pia-
„ cevolmente sorpreso , allorchè viddi le vo-
„ stre osservazioni perfettamente accordarsi col-
„ le mie conghietture , e la vostra ipotesi col-
„ la mia . Se voi avete ponderate le mie
„ lettere, e se vi prendete l'incomodo di scor-
„ rer quelle che ho avuto l'onore di scriver-
„ vi da quattro anni in quà , vi troverete li
„ primi rudimenti di questa ipotesi . Ella è
„ il soggetto di uno scritto che io composi
„ nel 1747. e che pensavo di pubblicarlo , ma
„ essendomi sopraggiunte altre occupazioni ,
„ non ho potuto ritravigliarlo , ma ho ben
„ voglia di sottometterlo tale , com' egli è al
„ vostro giudizio ec.

*Il Sig. De Haller volle contestarmi il desiderio
ch' e' avea di vedere le mie meditazioni: io dun-*

que gliele mandai, facendole precedere una lettera che ne conteneva la storia, e della quale pongo qui sotto la copia.

Ginevra li 4. Dicembre 1758.

„ Voi dunque volete, Signore, che io v'
 „ infastidisca dandovi a leggere le mie medi-
 „ tazioni intorno alla formazione de' corpi or-
 „ ganizzati. Io obbedisco; eccole dunque ori-
 „ ginali come le scrissi, o dettai dieci, o un-
 „ dici anni sono; non ne ho mutata ne pu-
 „ re una parola, acciocchè voi possiate me-
 „ glio giudicare quali siano state le mie pri-
 „ me idee sopra questa materia interessante,
 „ e quale sia stato il cammino del mio spiri-
 „ to in queste giravolte tenebrose; conoscere-
 „ te da' numeri de' Capitoli, de' paragrafi, e
 „ delle pagine, che questo manoscritto è par-
 „ te di un' opera, di cui eccovene in due pa-
 „ role la storia. Lo studio degl' insetti aven-
 „ domi affaticata estremamente la vista, fui
 „ costretto ad abbandonare un piacere per me
 „ assai vivo; ma il mio spirito naturalmente
 „ attivissimo non può abbandonarsi nelle brac-
 „ cia di una totale inazione; dunque mi posi
 „ a me-

„ a meditare sopra tutte le parti della natura ; disposi le mie meditazioni in un certo
 „ ordine , ne formai una specie di sistema armonico , che intitolai : *Contemplazione della*
 „ *natura* . La mia opera insensibilmente diveniva voluminosa , ed in pochi anni mi ritrovai un volume di meditazioni di più di
 „ 900. pagine , ed era un seguito di pitture altrettanto varie , quanto la natura . Non
 „ permettendomi i miei occhi di scriver sempre di per me medesimo , condannaï la mia
 „ memoria a ritenere ciò che avea composto , fintantochè qualche amico mi ajutasse , e
 „ scrivesse quel che io dettavo ; quindi è la diversità de' caratteri , che voi troverete nel
 „ manoscritto che vi mando . Frattanto io non ero arrivato alla fine del piano che mi
 „ ero disegnato : la molteplicità delle materie , che mi rimaneva da meditare , mi spaventava : mi sopravvennero le mie Ricerche
 „ sopra l' uso delle foglie , e sospesi la mia grand' opera , e quando l' ebbi sospesa per
 „ qualche tempo , non ebbi più coraggio di rimettermi ; dunque la lasciai riposare nel
 „ mio gabinetto , dopo averla letta tutta ad una società di Letterati , che ne rimase più

„ con-

„ contenta di quello che io speravo . Mentre-
 „ chè quest' opera dormiva , mi veniva di ma-
 „ no in mano in pensiero di staccarne alcune
 „ parti per darla alla luce ; ma le imperfe-
 „ zioni che scuoprivo in queste produzioni ,
 „ la giusta diffidenza che ho de' miei talenti ,
 „ e de' miei lumi distornavano sempre questa
 „ idea del mio spirito . Finalmente , le vostre
 „ mirabili osservazioni sopra il pollo sono ve-
 „ nute alla luce ; io le ho lette con avidità ,
 „ e sono restato piacevolmente sorpreso dal-
 „ la conformità di alcune delle vostre idee
 „ colle mie , ho incominciato a sentirmi un
 „ poco riscaldare per quest' opera sfortunata
 „ che aveo abbandonata alla polvere del mio
 „ gabinetto ; ho preso dunque il partito di
 „ scrivervi sopra ciò che aveo rigirato lungo
 „ tempo nel mio spirito ; ma l' ho fatto in
 „ pochissime parole : le vostre risposte hanno
 „ terminato di convincermi , che noi abbia-
 „ mo le medesime idee intorno alla genera-
 „ zione . Presentemente voi avete la bontà di
 „ occuparvi nelle mie meditazioni ; questo vo-
 „ stro desiderio mi è gratissimo ; dunque io
 „ sottometto il mio manoscritto al vostro giu-
 „ dizio , se avrà la fortuna di piacervi , farò
 „ as-

„ affai ricompensato del mio travaglio ; se vi
 „ piacesse in maniera che lo giudicassi degno
 „ di esser pubblicato , una delle principali ra-
 „ gioni che mi obbligherebbono ad acconsen-
 „ tirvi , sarebbe l' estrema impazienza che ho
 „ di vantarmi al pubblico dell' amicizia di cui
 „ voi mi onorate , Sig. , e di farsi noto fino a
 „ qual punto vi stimo , e vi rispetto : leggen-
 „ do questo manoscritto sovvengevvi ch' è stato
 „ composto , siccome il resto dell' opera , ora
 „ in un giardino , ora alla campagna , ora in
 „ un bosco , a piedi , a cavallo , in carrozza .
 „ La parte che immediatamente segue a que-
 „ sta , è un parallelo delle piante , e degli
 „ animali , nel quale ho radunate in piccolo
 „ tuttociò che queste due classi di esseri orga-
 „ nizzati di più interessante offeriscono . Quan-
 „ do leggevo quello ch' è stato scritto avanti
 „ di voi , Sig. , intorno alla formazione de'
 „ corpi organizzati , ne restavo poco soddis-
 „ fatto , ed ero quasi tentato di preferire le
 „ mie idee a quelle degli Autori miei prede-
 „ cessori , almeno mi sembrava di penetrare
 „ un poco più la natura di quello che aveano
 „ fatto essi .

Nel rimandarmi il mio manoscritto il Sig. De

Hal-

Haller mi onorò di una risposta , ch' ei mi permise di pubblicare , la quale pongo qui sotto , poichè mi pare che la vera modestia non consista nel tacere l' approvazione di un grand' uomo ; ma ch' ella consista in non risguardarla che come un' incoraggiamento ; daltronde bisogna bene che il pubblico sappia i motivi che mi hanno obbligato a non opprimere le primizie di un travaglio che in seguito ho procurato di perfezionare .

Roche 5. Gennajo 1759.

„ Io vi sono obbligatissimo , Sig. della let-
 „ tura piacevole , e istruttiva che voi mi
 „ avete procurata . La ricevei appunto in un
 „ accesso di gotta che mi ha incomodato per
 „ quindici giorni , alcuni momenti de' quali
 „ sono stati dolorosissimi . Io vi rimando il
 „ vostro manoscritto , pregandovi col zelo di
 „ un Cosmopolita a pubblicarlo . Io goderei
 „ sommamente se potessi contribuire a trar-
 „ re dal gabinetto un' opera così bene ragio-
 „ nata come la vostra . Vi sono due classi
 „ di dotti . Quelli della prima classe offer-
 „ vano senza scrivere , quelli della seconda
 „ scrivono senza osservare ; quelli della pri-
 „ ma

, ma classe sono pochi , e sono forse troppo , pi quelli della seconda . V'è ancora una terza classe , e più cattiva ed è quella che offerva male .

Io cedei ad un' invito sì pressante , e sì proprio ad assicurarmi intorno al giudizio del pubblico , e immediatamente dopo aver terminato il mio Saggio Analitico sopra l'anima , ripresi le mie ricerche sopra i Corpi organizzati ; pensai da principio a comporre un nuovo Capitolo che contenesse un preciso delle scoperte del Sig. De Haller , ma dacchè ebbi incominciato ad eseguire questo progetto , previddi che avrei dovuto penetrare diverse materie che non avevo se non sfiorate nel mio primo scritto ; io non vedevo ne pure fin dove mi avrebbero condotto queste nuove meditazioni ; conoscevo la somma necessità di perfezionare le mie ricerche . Ecco come mi sono indirizzato a racconciare la mia materia , a sviluppare , ed a rettificare le mie prime idee , ed a presentare al pubblico un nuovo seguito di fatti , di conseguenze , e di analisi . Io non ho scorso tutti gli Autori che hanno scritto intorno a' Corpi Organizzati , poichè sono troppo numerosi ; ma mi sono contentato di consultar quelli che mi sono sembrati più originali , ed ho riportate

tate le loro osservazioni con tutta l'esattezza , e precisione di cui ero capace . Ho avuto un gran vantaggio , poichè ho osservato di per me stesso ; questo mi ha dato maggior facilità nel concepire , e nell'estrarre i naturalisti che io consultavo , ho creduto che mi fosse lecito di usare delle mie proprie osservazioni , e l' ho fatto allorchè ne avevo il bisogno . Io non ho tratte dai fatti se non le conseguenze che naturalmente se ne inferivano ; ho desiderato che il mio Libro fosse una specie di Logica : dunque non ho date le conghietture per fatti ; ma ho fatto in maniera ch' elle risultassero da' fatti come da' loro principj . Coloro de' miei leggitori che non vorranno giudicare che dal mio frontespizio , leggeranno solamente il Capitolo XII. del primo Tomo , ed i Capitoli I. II. VII. VIII. del secondo Tomo . Tra i molti fatti , e varj che si sono offerti al mio esame , ho scelti quelli , ho giudicati i più certi , e i più interessanti : forse ancora non è venuta alla luce Opera alcuna intorno alla generazione , che ne contenga più di questa , e sopra la verità de' quali possano nascere meno dubbj . Viddi di buon ora che il mio Libro sarebbe in qualche modo una storia naturale in piccolo ; ho sempre creduto che sia per essere ben rice-

ricevuta in questo secolo , che potrebbesi chiamare il secolo degli osservatori . Se ho rilevate alcune opinioni azzardate , l' ho fatto certamente senza intenzione nessuna di offendere quelli che le adottano , ho voluto premunire i miei leggitori contro l' impressione della celebrità . Non si giudichi del mio travaglio dalla lettura degli otto primieri Capitoli del primo volume , già ho detto che non sono se non sbozze , e li avrei ancora totalmente soppressi , se il Sig. De Haller non li avesse onorati della sua approvazione . Quello che non mi sazio di ripetere si è , che sarò sempre pronto ad abbandonare le mie opinioni , per le più probabili , il mio amore per la verità è sincero , e mai avrò difficoltà a confessare pubblicamente i miei errori : ho sempre pensato che un , io ho il torto , vaglia assai più di cento repliche ingegnose .

Ginevra 1. Marzo 1762.

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

AVendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Gio: Tommaso Mascheroni Inquisitor Generale del Santo Offizio di Venezia nel Libro intitolato: *Considerazioni sopra i Corpi Organizzati ec. Opera del C. Bonnet &c. Tomi 2. stamp. non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e Buoni Costumi, concediamo Licenza a Francesco Pezzana, Stampator di Venezia, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.*

Dat. li 5. Febbraro 1780. M. V.

(ALVISE VALLARESSO RIF.

(ANDREA TRON KAV. PROC. RIF.

(GIROLAMO ASCANIO GIUSTINIAN KAV. RIF.

Registrato in Libro a Carte 458. al Num. 1934.

Davidde Marchesini Segr.

Addi 4. Febbraro 1780. M. V.

Registrato nel Magistrato Eccellentiss. contro la Bestemmia a Carte 102.

Andrea Sanfermo Segr.

CON-

CONSIDERAZIONI

S O P R A

I CORPI ORGANIZZATI



CAPITOLO PRIMO.

De' Germi , Principj de' Corpi organizzati.

1. *Fondamento dell'esistenza de' Germi.*

U A Filosofia avendo appresa l'impossibilità , in cui si trovava, di spiegare meccanicamente la formazione degli esseri organizzati , ha felicemente immaginato , che essi esistessero innanzi sotto la forma de' *Germi* , o de' *Corpuscoli organici*. E questa idea ha prodotta due ipotesi , che piacciono molto alla ragione.

2. *Due Ipotesi sopra i Germi.*

La prima suppone , che i Germi di tutti i corpi organizzati di una medesima spezie fossero gli uni dentro gli altri racchiusi, e sieno quindi sviluppati successivamente. La seconda ipotesi spande questi Germi da per tutto , e suppone , ch'è non giungano a svilupparsi , se non allora , che riscontrano delle *Matrici* convenevoli , o de' Corpi della medesima spezie , disposti a ritenerli , a fomentarli , ed a farli crescere.

3. *Prima Ipotesi dello Inviluppo.*

La prima Ipotesi è un grande sforzo della mente sopra i sensi. I differenti ordini degl'*infinitamente piccoli* gli uni negli altri nabissati , che ammette questa ipotesi , opprime l'Immaginazione senza sgottire la ragione. Imperocchè accostumata questa

a distinguere ciò , ch'è d'attenenza della mente ; da quello che appartiene a sensi, riguarda con piacere il granello di una pianta, o l'uovo di un animale, come un piccolo mondo popolato di una moltitudine di esseri organizzati, destinati a succedersi per tutta la continuazione de' secoli. Le prove che stabiliscono la divisione della materia all'*indefinito* servono dunque di base alla teoria degl'*Inviluppi*. Il Sole, che è un milione di volte più grande della Terra, ha per suo estremo un globetto di luce, più miglaja de' quali entrano in una sola volta nell'occhio di un animale ventette milioni di volte più piccolo di un Lendine. Ma la ragione passa ancora di là ; poichè da questo globetto di luce vede uscire un altro Universo, che ha il suo Sole, i suoi Pianeti, i suoi vegetabili, i suoi animali, e fra questi ultimi un animaletto che è rispetto a questo nuovo mondo ciò ch'è quello, di cui abbiamo parlato, al Mondo da noi abitato.

4. Seconda Ipotesi della Disseminazione.

La seconda ipotesi, in seminando i germi per ogni parte, fa dell'aria, dell'acqua, della terra, e di tutti i corpi solidi, vasti e numerosi magazzini, ne' quali la natura ha deposte le sue principali ricchezze. Quivi si trova in ristretto tutta la serie delle generazioni future. La prodigiosa piccolezza de' germi li libera dall'affalto delle cause che cagionano il discioglimento de' misti. Entrano nello interno delle piante, e degli animali: ne diventano le medesime parti componenti, ed allorchè questi composti soffrono degli scioglimenti, essi escono senza alterazione, per andar nell'aria, o nell'acqua, o per entrare in altri corpi organizzati. Non vi sono che i Germi, che contengano dei tutti organici della medesima specie, come quello nel quale sono introdotti, che vi si sviluppano. Portati sulla scorza di un albero, vi si fermano,

vi s' ingrossano appoco appoco , e danno così nascimento alle gemme , alle radici , a' rami , alle foglie , a' fiori , ed a' frutti . Portati poi nelle ovaje della femmina , o nelle vescichette femminali del maschio , divengono il principio della generazione del feto .

CAPITOLO II.

Del crescimento de'Corpi organizzati in generale .

5. Difficoltà della materia .

LA maniera , onde si fa il crescimento de' corpi organizzati , è un punto oscurissimo nella Fisica . Quando però noi avremo bene inteso una volta , come una semplice fibra ingrossa , e si distende , allora comprenderemo ancora in qual guisa un granello divenga un albero , od un uovo produca un animale . Possono ben farsi delle sperienze per iscoprire le leggi , che osservano i corpi organizzati nel loro ingrossamento ; si possono formare delle scale esatte della loro rispettiva estensione ; si può osservare fino ad un certo segno la struttura interna di questi corpi , e l' artificio degli organi , che separano e distribuiscono i sughi nutritivi ; può ancora ridursi a calcolo l' azione de' vasi , e la prestezza de' liquori , che vi circolano : tutte queste cognizioni però , benchè precise , non bastano per dissipare le tenebre , che ricoprono il meccanismo di questo crescimento . Tentiamo di supplirvi , ponendo de' principj , che ci conducano ad una ragionevole ipotesi .

6. Principj sopra il crescimento .

La natura non va a salti .

La natura non va per salti . Ogni cosa ha la sua ragione sufficiente , o la cagione sua prossima , ed

immediata. Lo stato attuale di un corpo è la conseguenza , od il prodotto del suo stato antecedente ; o per parlare più giusto , lo stato attuale di un corpo è determinato dal suo stato antecedente .

7. *Gradazioni universali.*

Avvi una certa gradazione tra gli esseri , ed avviene un' altra ancora nel loro crescimento . Ogni cosa giugne per gradi insensibili alla perfezione sua propria ; e questo è ciò , che si chiama *sviluppatamento* ne' corpi organizzati .

8. *Sviluppamenti.*

Le piante e gli animali , che noi ora veggiamo , sono dunque passati successivamente per tutti i gradi di grandezza compresi tra quello , in cui hanno incominciato ad essere a noi visibili , e quello , nel quale attualmente li veggiamo . Se noi osserviamo col microscopio il grano di una pianta , o l' uovo di un animale , noi ci persuaderemo , che il corpo organizzato , che dee quindi nascere , già vi esiste in piccolo con tutte le sue parti essenziali . Noi ammiriamo la sagacità di quel naturalista , che ha saputo il primo discoprire la farfalla sotto l' involuppo del bruco .

9. *La nutrizione , cagione dello sviluppo.*

Lo sviluppo insensibile di tutte le parti del corpo organizzato , si fa per la *nutrizione* .

10. *Alimenti.*

Gli alimenti sono una mescolanza d' aria , d' acqua , di terra , di sali , di olj , di zolfi , e di più altri principj differentemente combinati .

11. *Loro preparazione.*

Questa mescolanza , per rendersi atta a far corpo , passa per diversi generi di vasi , che s' impiccoliscono gradatamente , e de' quali ella soffre l' azione . Gli uni la ricevono , altri la preparano , ed altri la distribuiscono preparata a tutte le parti .

O R G A N I Z Z A T I. 5

12. *Tre operazioni de' Vasi.*

L'azione de' Vasi suppone dunque tre operazioni principali; cioè, la separazione del superfluo, la decomposizione di una parte de' principj, e la riunione di più in una medesima massa analoga alla natura del corpo organizzato.

13. *Composizione de' Vasi.*

I Vasi, come tutti gli altri organi, sono originamente formati di *fibre semplici*, vale a dire, che non sono composte di altre fibre (perchè altrimenti si andrebbe all'infinito) ma di particolari *elementi*. La natura, la forma, e l'ordine di questi elementi determinano la specie del Corpo organizzato.

14. *Idee sopra la distribuzione, e l'assimilazione de' sughi nutritivi.*

L'estratto nutritivo si distribuisce nelle fibre semplici, e l'estendersi di queste per ogni verso fa lo sviluppo del tutto organico. Gli elementi delle fibre sono il fondo, che riceve le particole del fluido nutritivo. L'affinità di queste particole con gli elementi le rende atte a unirsi ad essi. La forma, e la disposizione degli elementi permette, ch'è s'estendano per ogni parte sino ad un certo segno, e che cedano così all'impressione del fluido nutritivo. Ci possiamo rappresentare una fibra semplice come una spezie di opera fatta *a rete*. Gli atomi nutritivi s'insinuano nelle maglie, e le ingrandiscono appoco appoco per tutti i versi. I Vasi, che ricevono l'alimento più grosso, che vien di fuori, e quelli, che lo preparano, sono nutriti per mezzo d'altri vasi più piccoli, destinati a spandere questo alimento per tutto. Questi vasi versano il prezioso estratto negl'interstizj, che si frappongono tralle fibre, donde poi passa nelle magliette delle medesime fibre per mezzo di un certo succiamento, o imbevimento. E come

anche gli stessi piccoli vasi hanno bisogno di essere nutriti, si può supporre, ch'eglino si nudriscano di per se medesimi del sugo, che contengono, o di quello, che incontrano tra' diversi fascetti delle fibre, che vanno scorrendo.

15. *Limiti del crescimento.*

Finalmente quando le maglie di una fibra semplice si sono tanto ingrandite, quanto l'hanno potuto permettere e la natura, e la disposizione de' loro principj, questa fibra cessa di crescere, e non riceve, se non il solo nutrimento destinato a risarcire quello, che dissipano la traspirazione, ed i moti intestini.

C A P I T O L O III.

Della generazione de' Corpi organizzati. De' Mostri, e de' Muli in generale. Principj, e conghietture sopra la loro formazione.

16. *Introduzione.*

Tutti i Corpi organizzati moltiplicano, e mentre la legge del discioglimento esercita il suo impero distruttivo sopra la massa degli esseri viventi, la legge della generazione presiede alla conservazione delle specie, ed assicura loro l'immortalità.

17. *La generazione è un mistero, che forse col tempo si discoprirà.*

La generazione è un di que' segreti, che sembra essersi riserbati per se la natura. Contuttociò io credo, che un giorno le si caverà di sotto; e si ne giudico principalmente per lo numero, e per la natura delle scoperte, delle quali si è già arricchita questa materia. Le verità fisiche, frutto della osservazione, e della sperienza, si moltiplicheranno, e si perfezioneranno incessantemente. Le
veri-

verità metafisiche più indipendenti da' sensi, e dalle macchine, e legate ad un piccol numero d'idee astratte, non si moltiplicheranno senza dubbio colla medesima proporzione. Una intelligenza, che conoscesse a fondo le forze dello spirito umano, potrebbe tirare l'oroscopo delle scienze, e predire il grado di perfezione, al quale ognuna di loro giugnerà. Io sarei molto portato a credere, che non seguirà la distruzione del nostro Globo, finattantochè gli uomini non avranno consumata tutta la cognizione delle produzioni, ch'esso contiene. Ma questo avvenimento è congiunto ad altri, che non sembrano tanto prossimi ad accadere.

18. *Due ipotesi intorno al sito dell' Embrione. Prima, che ammette degli uovi, o de' grani prolifici.*

Il germe esisteva egli già nel grano, o nell'uovo prima della fecondazione? La polvere degli stami, od il liquore che contribuisce il maschio, non è egli il solo principio del suo sviluppamento?

19. *Seconda, che pone l' Embrione nel liquore femminile.*

Ovvero la materia femminile è ella piuttosto il veicolo del germe, ed il grano, o l'uovo il luogo destinato a riceverlo? Queste sono le due ipotesi, che si disputano la preferenza, ed il loro combattimento non è così presso a terminare.

20. *Animali spermatici.*

Una scoperta non preveduta, fatta nell'ultimo secolo per mezzo del microscopio, pare aver data qualche superiorità alla seconda ipotesi sopra la prima. Io voglio dire della scoperta degli *Animalletti spermatici*. Questi animali di una estrema piccolezza, è paruto, che nuotino quasi in tutte le semenze, che sottoposte si sono a questo esame. È stata paragonata la loro forma a quella del *Girino*. La loro testa è grossa e ritonda, ed il resto del

corpo è sottilissimo . La più piccola gocciola della femenza ne contiene un numero prodigioso . Vi si veggono saltellare con un' agilità maravigliosa , come i pesci in un lago . Coloro , che non sono ancora in istato di generare , e quelli , che sono avanzati in età , ovvero attaccati da malattie veneree , non danno a divedere alcuno di sì fatti animali .

21. *Sistemi , a' quali hanno data cagione questi Animali.*

Per questi fatti o reali , od apparenti è stato pensato , che gli Animaletti spermatici fossero gli autori immediati della generazione . Quindi si è ingegnosamente supposto , ch' essi fortissero delle metamorfosi analoghe a quelle degl' insetti , o de' *Girini* ; ma nella maniera della fecondazione è nato del disparere . Gli uni non volendo riconoscere alcuna sorta di ovaje nelle femmine degli animali vivipari , hanno creduto , che l' animaletto si attacchi in qualche punto particolare della *matrice* , donde tragga il nutrimento destinato a farlo crescere . Gli altri , partitanti dichiarati delle *ovaje* , vogliono , che il *Verme spermatico* s' introduca nella *vescichetta* , che , secondo loro , si distacca dall' *ovaja* , e cade per la Tuba nella matrice , e che il verme in questa vescichetta prenda il suo primo ingrossamento .

22. *Applicazione fatta di uno di questi sistemi alla generazione delle Pianta .*

Questi Fisici applicano al granello della *Polvere degli stami* ciò , che dicono degli *Animali spermatici* . Essi riguardano ciascun granello racchiuso in un globetto degli *stami* , come un piccolo uovo , che contiene il germe della Pianta futura . E' ci fanno osservare , che il granello prima della fecondazione non è altro , che una vescichetta piena di un liquore limpido , nel quale i migliori Microscopj niuna traccia di embrione ci discoprono , ma che se si esamina questo medesimo granello dopo la fecondazione ,

ne, vi si scorgerà un punto verdastro, rassomigliante peravventura ad un grano della polvere degli stami.

23. *Dubbj e difficoltà sopra il sistema degli Animali spermatici.*

Il sistema de' Vermi *feminali* è certamente ingegnoso, e sembra a prima vista non essere privo di probabilità. Alcune osservazioni però lo rendono almeno dubbioso, per non dire di più. Primieramente nel seme di alcuni animali non si è potuto scoprire veruno di questi vermi. Inoltre si sono trovati in quello del *Calamajo* de' piccoli corpi elastici, che sembrano essere analoghi a' vermi spermatici, e che potrebbero far dubitare, che questi vermi sieno veri animali (1). E supponendoli tali, vi sarebbe luogo a pensare, che sia del liquore femminile come di tante altre spezie di liquori, cui l'Autore della natura, ha giudicato bene il popolare di diverse spezie di abitanti. Finalmente si crede aver rintracciati simili vermetti nella semenza di alcune femmine de' quadrupedi. Or qual sito assegneremo noi a questi vermi, e qual giro faremo loro fare nel sistema, di cui ragioniamo? Si crederà egli per avventura, ch'è si congiungano con quelli, che abitano la semenza del maschio, e che da questi congiugnimenti nascano i germi autori della generazione? Questo sarebbe un allontanare la difficoltà un solo grado. Potrà egli conghietturarsi, che questi vermetti s'innestino, o si uniscano gli uni agli altri, per formare diversi tutti individuali?

24. *Rislessioni sopra le nuove conghietture, che possono immaginarsi per ispiegare la generazione.*

Non so, se oserei io quì unire le mie conghietture sopra la generazione a quelle di tanti dotti Fisici, che

(1) *Nuove scoperte fatte col Microscopio dal Sig. Needham. Leida, Luzac. 1717. Cap. V.*

che hanno trattato di questa materia ; ma una riflessione , che credo giusta , mi dà animo a farlo .

Per verità non possono mai esser troppe le conghietture sopra un soggetto tanto oscuro . Queste sono come tanti fili , che per diverse vie possono al vero condurci , od almeno darci luogo a scoprire nuovi paesi . Sono anche come scintille , al fuoco delle quali la buona Fisica accende la fiaccola alla esperienza . Io lodo il modesto timore di quei Fisici , che se ne stanno a' fatti , ma non saprei nè pure biasimare l'ingegnoso ardimento di coloro , che intraprendono qualche volta di penetrare più oltre . Lasciam pure operare l'immaginazione , sempre però la ragione tenga la briglia a questo pericoloso corridore . Giriamo lo sguardo per ogni banda ; formiamo pure nuove conghietture ; facciamo delle novelle ipotesi ; ma ci sovenga sempre , che queste non sono altro , che conghietture , ed ipotesi , e perciò non le ponghiamo giammai nella serie de' fatti . Con questo spirito soltanto io ardisco pubblicare i miei pensieri sopra la generazione .

25. Principio fondamentale intorno alla generazione .

Ogni corpo organizzato cresce per ilviluppamento . Nell'istante medesimo , che comincia ad essere visibile , gli si veggiono in piccolissimo , le stesse parti essenziali , che egli mostrerà col tempo in più grande . Qualunque sforzo , che noi facciamo per ispiegare meccanicamente la formazione del più piccolo organo , noi non ne potremo venire a capo . Siamo dunque condotti a pensare , che gli stessi corpi organizzati , che ora esistono , esistessero anche prima della loro nascita ne'germi , one'corpicciuoli organici .

26. Che la generazione non è altro , che un semplice sviluppo di ciò , che esisteva prima in piccolo .

L'atto della generazione può dunque altro non essere , se non se il principio dello sviluppo de' germi .

27. Che questo sviluppo si fa per mezzo della nutrizione.

Lo sviluppo si fa colla nutrizione. La nutrizione non è altro propriamente, che l'incorporazione de' sughi nutritivi nella maglia delle fibre elementari. Posti questi principj, io domando:

28. *Quistione intorno a questo soggetto: se il liquore seminale sia il sugo nutritivo destinato a procurare i primi sviluppi del germe?*

La polvere degli stami, ed il liquore seminale conterrebbero mai peravventura que' sughi nutritivi, destinati per la loro sottigliezza, e per l'estrema loro attività ad aprire la maglia del germe, ed a farvi nascere uno sviluppo, che da' sughi meno fini, e meno elaborati non ha potuto incominciare, come può bene da' medesimi continuarsi, e condursi al suo ultimo termine?

29. *Applicazione di questa idea a' principali fenomeni della generazione.*

Stendiamo un poco questa conghiettura, e procuriamo di applicarla a' diversi casi della cosa, che ci tiene ora occupati. Questi si possono ridurre principalmente a tre; alla rassomiglianza de' figliuoli al Padre, ed alla Madre, ai *Mostri* ed a' *Muli*. Fermiamoci nell'ipotesi, che ammette gli uovi nelle femmine vivipare, e che riconosce questi uovi in luogo de' germi, cioè per *prolifici*.

30. *De' Mostri.*

Si chiamano *Mostri* tutte le produzioni organizzate, nelle quali la forma, la disposizione, ed il numero di alcune parti non osservano le leggi ordinarie.

31. *Quattro generi di Mostri.*

Quinci quattro generi di *Mostri* noi abbiamo. Il primo contiene quelli che son tali per la conformazione straordinaria di alcune delle loro parti. Il secondo comprende i *Mostri*, che hanno alcuno de' lo-

ro organi , o dei loro membri diversamente distribuiti , che nello stato naturale . Il terzo abbraccia i *Mostri* , che hanno minori parti di quelle , che sono state date alla specie . Il quarto genere racchiude quelli , che al contrario hanno più parti , di quelle che comporti il loro stato naturale , o che queste parti proprie non sieno nella specie , o che essendo proprie , si trovino in esso in maggior numero .

32. *De' Muli.*

I *Muli* sono specie di *Mostri* , che provengono dall' accoppiamento di due individui di specie diversa , e che però partecipano della natura dell' uno , e dell' altro . La simiglianza dei *Muli* con gl' individui , da' quali traggono loro origine , non si manifesta in tutte le specie in una maniera uniforme ; cioè , non ha luogo questa similitudine costantemente nelle medesime parti . Si crede contuttociò aver rintracciato , che generalmente il corpo de' *Muli* ritenga più della femmina , che del maschio , e che l' estremità ritengano più del maschio , che della femmina .

33. *Quistioni , che nascono da' principali fenomeni della generazione nell' ipotesi dell' Autore .*

Se i germi si contengono originalmente nelle ovaje della femmina , e se la materia femminile è una specie di fluido nutritivo , destinato a divenire il principio dello sviluppo ; donde nascono i diversi tratti di similitudine de' figliuoli co' loro genitori ? Donde i *Mostri* ? Come si formano i *Muli* ? Lasciamo il primo caso , come quello , che fa minore impressione , e sempre un poco equivoco , e attacchiamoci a' due ultimi più capaci di determinazione e di analisi .

34. *Tentativi per risolvere alcune di tali quistioni .*

Si spiegherebbe assai felicemente colla proposta ipotesi il primo , il terzo , ed il quarto genere di mostri , supponendo pel primo , e pel terzo , che
il

il corso, o l'operazione del fluido seminale sia stato turbato, o modificato per qualche accidente; ed ammettendo pel quarto genere, che due germi si sieno sviluppati in un medesimo stante, donde l'uno abbia fornito l'altro, per una spezie d'innesto, di una, o più parti soprannumerarie. Il secondo genere è molto più difficile a spiegarsi, nè mi parrebbe, che se ne potesse render ragione, se non ricorrendo all'ipotesi de' germi originalmente mostruosi: rifugio veramente propizio, ma che non piace egualmente a tutti i Fisici.

I rapporti de' Muli colle spezie, alle quali debbono la lor nascita possono essere collocati sotto moltissimi generi. Noi considereremo qui solamente i rapporti del colore, e quello della forma. I rapporti di colore si spiegano agevolmente coll'ipotesi del liquore seminale considerato come fluido nutritivo. Imperocchè si sa, quanto la qualità degli alimenti influisca nel colore de' corpi organizzati. La *robbia* tinge di rosso gli ossi degli animali, che se ne cibano. Si cangiano i colori de' vegetabili facendo loro succhiare diverse spezie di tinture. E questo si è, per dirlo ora di passaggio, un genere di sperienze assai degno dell'attenzione de' Fisici; e farebbe attissimo a perfezionare l'istoria della vegetazione, ed a scoprirci il vero destino degli organi principali (1).

Se non che, mi si dirà, i colori impressi dal fluido seminale nel germe dovrebbero alterarsi appoco appoco, e finalmente cancellarsi affatto. Io rispondo, che la disposizione a riflettere certi colori, dipende dalla natura, e dalla distribuzione delle parti. Or questa natura, e questa distribuzione essendo una volta determinata, pare molto possibile, che si conservino,

(1) Veggansi le mie *Ricerche sopra l'uso delle foglie nelle piante*. Memor. 5. Leida 1754. in quarto.

no , e che i nuovi fughi , che soppravengono , si accomodino a questa determinazione , come noi ben presto vedremo . Il nudrimento influisce molto anch' esso nelle proporzioni di tutte le parti ; e questa verità sì conosciuta ci conduce a' rapporti della forma . Due oggetti principali si offeriscono quì alla nostra meditazione ; il germe , ed il fluido seminale . Esaminiamo queste due idee fino a quel segno , che possiamo .

35. *Qualsia la vera idea , che dee farsi del germe .*

Si dice , che il germe è un abbozzo , o uno schizzo del corpo organizzato . Questa nozione può non essere abbastanza precisa : imperocchè o bisogna prendere a spiegare meccanicamente la formazione degli organi , lo che la buona Filosofia riconosce essere superiore alle sue forze , o è d'uopo ammettere , che il germe contiene attualmente in piccolo tutte le parti essenziali della pianta , o dell' animale , che rappresenta .

36. *Conseguenza di questa idea .*

La principale differenza , che vi è dunque tra il germe , e l' animale sviluppato , si è , che il primo è composto delle sole parti elementari , e che le maglie , che questa formano sono strette tra loro , quanto mai possono essere ; dovechè nel secondo le particelle elementari sono unite ad infinite altre particole affociate a quelle per la nutrizione , e le maglie delle fibre semplici sono in esso , quanto mai esser possono , larghissime relativamente alla natura , ed alla distribuzione delle loro parti .

37. *Altra conseguenza , che si tira dalla varietà delle parti del corpo animale , relativamente alle loro proporzioni , ed al loro grado di consistenza .*

La varietà , che passa tra tutte le parti dell' animale , o rispetto alle proporzioni , o riguardo alla consistenza , indica negli elementi una diversità re-

lati-

lativa, da cui quella dipende. Così le fibre elementari degli ossi hanno originalmente maggior consistenza, e sono meno capaci di estensione, che quelle de' vasi, o delle membrane.

38. *Rapporti del liquore seminale a queste varietà.*

Il grado di estensione di ciascun organo è di più relativo alla potenza, che l'ha prodotto. Questa potenza è quì il fluido nutritivo, od il liquore seminale. Vi sono dunque, oltre questo fluido, ed il germe, certi rapporti, che determinano la consistenza, e l'estensione di ciascuna parte, questi rapporti, se vogliamo ragionare sulle idee conosciute, non possono essere altro, se non rapporti di forma, di proporzioni, di moto, di calore, ec.

39. *Supposizione dell'Autore intorno al liquore seminale per tentare di spiegare la generazione.*

A queste riflessioni generali io aggiungerò alcuni particolari supposti. Io suppongo in primo luogo, che nel liquore seminale vi sieno tante spezie di elementi, quante n'entrano nella composizione del germe. Secondo, che glì elementi di una medesima spezie sieno più disposti ad unirsi, che quelli di spezie diverse. Terzo, che le maglie di ciascuna parte osservino una certa proporzione colle *molecule* relative della semenza. Quarto, che l'efficacia del liquore seminale dipenda dal grado del suo moto, e del suo calore, e dal numero delle parti elementari di ciascuna spezie.

40. *Saggio di spiegazione del Mulo, conforme a' principj dell'Autore, e breve esposizione della sua ipotesi.*

Posti tali principj, sembra schiarsi fino ad un certo segno la generazione de' Muli. Nasce il Mulo propriamente detto dalla congiunzione di un asino con una giumenta. Questo prodotto esisteva già in piccolo, ma sotto la forma di un Cavallo nelle ovaje della giumenta. Come s'è egli questo cavallo trasfor-

mato ? Donde gli vengono in particolare que' lunghi orecchj ? Perchè sì poco fornita di crini la coda ? Lo schiarimento di questi due punti terminerà di spiegare il mio pensiero.

Io dico adunque , che gli elementi del liquore femminile corrispondendo a quelli del germe , la semenza dell' Asino contiene più particelle atte a servire allo sviluppamento delle orecchie , che non ne contenga quella del Cavallo , e che all' opposto quella ha minori particole capaci a sviluppare la coda , che non ne ha questa . Quindi nasce l' eccesso di allungamento nelle maglie degli orecchi , e la scancellatura d' una parte di quelle della coda .

41. *Obbiezioni, e Risposte.*

Mi si obbjetterà senza dubbio , che le semenze , ed i germi di una medesima specie deono esattamente corrispondersi , e che perciò la sola semenza del Cavallo può fare sviluppare i germi contenuti nelle ovaje della giumenta . Io rispondo , che può supporfi senza veruno assurdo , che nel rapporto della semenza , e del germe vi sia una certa latitudine , che permetta al seminal liquore di un animale lo sviluppare i germi di un altro , che da quello non sia estremamente diverso nella forma , e nella grandezza . Mi si opporrà ancora , che le nozioni , ch' io dò del liquor femminile , e del germe , sono troppo composte , considerata la moltitudine degli elementi che vi soentrare , e la diversità delle combinazioni , ch' esse suppongono . Rispondo che non sono mai troppo grandi le idee , che noi possiamo fabbricarci dell' arte , che regna nelle opere della natura , e specialmente nella struttura dei corpi organizzati .

Un' altra obbiezione assai più considerabile è quella , che si deduce da certi bastardumi , nei quali si osservano alcune parti , che non tirano assolutamente , che dal maschio . Tal è quello , che nasce dall' accoppiamento del Gallo coll' Anitra femmina , del qua-

quale si dice per sicuro che abbia i piedi perfettamente simili a quelli del gallo. Io confesso, che non saprei soddisfare a questa obbiezione se il fatto stesse come si riporta; ma io dubito della perfetta simiglianza di questi piedi con quelli del gallo, e perciò me ne appello ad un esame più profondo.

42. *Importanza delle sperienze sopra i bastardi per ischiariare il mistero della generazione. Riflessioni intorno a questo soggetto.*

Io desidererei anche moltissimo, che si moltiplicassero le sperienze intorno alla generazione dei bastardi; perchè non vi sarebbe cosa più atta di questa a somministrare de' lumi sopra sì fatta tenebrosa materia; ed in ciò potrebbero molto servire i Vegetabili. Sopra tutto però vorrei, che si accertasse, se ne' feti, che provengono da' individui di una medesima specie, ed in quelli, che provengono da specie diverse, ella sia cosa costante, che alcune parti traggano più dal maschio, ed altre più dalla femmina, e se questa similitudine sia sempre uniforme, ovvero se muti. Nell'uno e nell'altro caso potrebbe farsi intervenire il liquore seminale della femmina, e ragionarsi sopra questo liquore, siccome ho fatto su quello del maschio. Nel primo caso potrebbe con qualche verisimiglianza conghietturarsi, che la semenza della femmina contenesse gli elementi particolari per una, o per più parti, e quella del maschio contenesse quelli, che son propri per l'altra. Nel secondo caso si ammetterebbe, che queste combinazioni cangiassero nelle differenti specie. Coll'ajuto di tali conghietture potrebbe giugnersi a render ragione de' diversi tratti di similitudine, cui ci pare di vedere tra i parti, ed i loro generanti, ma sarebbe sempre di mestiere lo stabilire per principio, che i due semi non possano agire l'uno senza l'altro. Potrebbe anche, col soccorso della medesima ipotesi, spiegarsi la formazione di alcuni *Mestri*. Per

esempio, se due animali, le cui semenze contenessero solamente gli elementi atti allo sviluppo del tronco, venissero ad unirsi insieme, ciò, che da essi ne proverrebbe, farebbe una massa lunga, od un tronco senza estremità.

43. *Principio della circolazione del germe, secondo l'ipotesi dell'Autore.*

La generazione contiene un altro punto tanto importante, quanto oscuro. Io voglio dire del principio della circolazione nel germe; ed ecco come io ne concepisco la bisogna. Io non penso, che si faccia alcuna circolazione nel germe non fecondato; anzi credo piuttosto, che tutto sia in esso in una quiete perfetta, e che i solidi non contengano allora alcun liquore; ma nel tempo della fecondazione il liquore femminile è portato negli organi della circolazione del germe. Ella li dilata, e questa dilatazione essendo naturalmente seguita dalla riassunzione del vaso sopra il liquore medesimo, per cotale guisa incomincia ad operare la circolazione. Il fluido femminile portato per questa via a tutte le parti apre le maglie delle fibre semplici, e le dispone a ricevere i sughi, che loro tramanda la matrice. Elle continuano così ad allargarsi per una spezie di duttilità analoga a quella de' metalli, finchè sien giunte al termine della loro estensione rispettiva.

44. *Maniera, con cui l'Autore ravvisa la sua ipotesi; egli la riguarda solo come un Romanzo.*

Tutto ciò, ch'io ho esposto intorno alla generazione, non sarà ricevuto peravventura, che come un Romanzo; ed io ancora per me son dispostissimo a riguardarlo in tal vista. Veggio di aver solo imperfettamente soddisfatto a' fenomeni. Ma domando io, se trovisi, che anche l'altre ipotesi si spieghino meglio? Intanto io farò su questo due riflessioni.

45. *Riflessioni favorevoli a questa ipotesi.*

La prima riflessione mia si è, ch'io non saprei risolvermi ad abbandonare una sì bella teoria, come è questa de' *germi preesistenti*, per abbracciare altre spiegazioni puramente meccaniche. La seconda, che mi parrebbe, che si avrebbe dovuto prima ingegnarsi di più penetrare, come si faccia lo sviluppo, che cercar di conoscere come si faccia la generazione.

CAPITOLO IV.

Della moltiplicazione per incisione, e di quella, che si fa per via di germogli.

46. *Fatti principali, che quì si offeriscono all'esame del Fisico.*

LA conservazione della vita in ciascuna porzione dell'individuo diviso, il crescimento di questa porzione, il producimento de' suoi nuovi organi, la moltiplicazione per via di *germogli*, sono i fatti principali, che ora si offeriscono al nostro esame.

47. *Primo fatto: La conservazione della vita in ciascuna parte. Spiegazione.*

Il primo fatto si spiega agevolmente, perchè si ammetta, che ciascuna porzione contenga tutte le parti necessarie alla vita dell'Animale, e che tal sia la loro struttura, che la separazione di esse dal tutto non cagioni alcun disordine nelle loro funzioni. L'osservazione conferma l'uno, e l'altro di questi supposti; mentre ella ci dimostra le principali viscere, stese da un capo all'altro del corpo ne' vermini, ch'io ho moltiplicati per via d'incisione, e de' quali ho pubblicata l'istoria nel 1745. (1) e ce ne discopre
il

(1) *Trattato dell'Insettologia*, seconda parte a Parigi in Ottavo.

il moto fino alle minime parti, dove giunge la sezione. Finalmente ci fa vedere, che le ferite, che si fanno a questi animali per ridurli in pezzi, si consolidano con somma facilità, per la disposizione singolare, che hanno i labbri de' vasi rotti, o squarciati, a rappresentarsi, e riunirsi. Quindi non essendo punto interrotte le funzioni vitali dal taglio; il fugo nutritivo racchiuso in ciascuna porzione continua ad esser portato a tutte le parti per nutrirle, e farle crescere.

48. *Secondo fatto. La consolidazione della ferita, ed i primi accrescimenti. Spiegazione.*

La maniera, colla quale si fa questo aumento, è la stessa precisamente di quella, che passa in un albero, al quale sia stata tolta della scorza. Gli orli della ferita si ravvicinano continuamente per l'estensione delle piccole fibre, di cui son guerniti, e così appoco appoco viene a formarsi sulla ferita come un cordone, che la ricopre. A questa prima opera della natura ne segue ben presto un'altra più considerabile, ed alla quale quella serve, per così dire, di preparativo; voglio dire, della produzione degli organi che mancano alle diverse porzioni del verme, per diventare animali perfetti. Fermiamoci un momento a tener dietro ad una di queste porzioni, che sono state tagliate dalle due estremità.

49. *Terzo fatto: La produzione di una nuova testa, e di una nuova coda. Spiegazione.*

Dall'estremità anteriore apparir dee una testa, e dalla posteriore una coda. Di mezzo al cordone, che si forma in ciascuna estremità, e spesso è insensibile, esce fuori un piccolissimo bottone di un colore più chiaro, che non è il resto del corpo. Egli ingrossa a gradi, e prende la forma di una punta ottusa, e schiacciata. Questa punta si allunga di mano in mano, e ben presto vi si scoprono degli anelli, attraverso de' quali appariscono delle nuove viscere, che
altro

altro non sembrano, se non se un semplice prolungamento delle vecchie. Finalmente si manifestano la testa, la coda, accompagnate da tutte le parti loro proprie. Ed ecco un verme perfetto, cui altro non manca, se non che l'acquistare la grandezza di quelli della sua specie. Or da questo breve racconto si vede, ch'è lo stesso parlare della moltiplicazione de' vermi *per incisione*, che di quella delle piante; perchè sì negli uni, come nell'altre tutto si fa per mezzo di uno sviluppamento di parti preesistenti; non essendovi Meccanica a noi nota, capace di formare un cuore, un cervello, uno stomaco &c. I germi sparsi per tutto il corpo di questi animali non aspettano per isvilupparsi, che una favorevole circostanza. E l'incisione appunto è quella, che produce una tal circostanza. Ella distorna a prò de' germi, la parte del fluido alimentizio, che impiegato stato sarebbe nell'aumento del verme intero nella stessa guisa, che nello scoronare un albero, o nel tagliare uno de' suoi grossi rami, vedesi scaturire dintorno al taglio un gran numero di bottoni, che senza questa operazione non si farebbono mai svilupparsi.

50. *Difficoltà, che risulta dalla precedente spiegazione.*

Questa spiegazione, benchè semplicissima, non è però esente da alcuna difficoltà. Secondo l'idea da me data del germe, egli è un animale, per così dire, in miniatura, che tutte le parti, che hanno in grande gli animali della sua specie, ha esso in piccolissimo. Ora nell'applicazione di questa idea al caso di cui parliamo, solamente alcune parti del germe si sviluppano, cioè, la testa in quel germe, che è collocato dalla parte anteriore di ciascun pezzetto, la coda in quello della parte posteriore. Che cosa dunque diventa nel primo germe la coda, e nel secondo la testa? E perchè quando lo sviluppo è incominciato in qualche parte determinata,

non continua in tutte le altre ? Le medesime quistioni hanno luogo ancora rispetto alle piante . I germi , che si suppongono aver dato l'essere a' rami , contenevano una pianta in piccolo . Tanto dee dirsi di quelli , da' quali sono state prodotte le radici . Dunque e gli uni , e gli altri si sono sviluppati solamente in parte .

§1. Risposta alla difficoltà .

Queste difficoltà , sottilmente rilevate fino a un certo segno , si riducono , per quanto a me sembra , ad investigare delle cagioni atte ad impedire lo sviluppo di alcune parti del germe . Infatti io non credo , che si voglia ammettere de' germi particolari per ciascun organo , e moltiplicare così gli esseri inutilmente , senza parlare delle difficoltà più grandi ancora , e più numerose , che produrrebbe una sì fatta ipotesi . Le cagioni dunque che noi cerchiamo , le potremo trovare o nella distribuzione , nella positura , e nella struttura de' germi , o ne' segreti rapporti di tale struttura con quella del corpo , nel quale e' debbono svilupparsi , o finalmente in diverse circostanze esteriori .

§2. Conghietture sulla maniera , onde sono distribuiti i germi ne' Vermini moltiplicati per incisione , e del modo , con cui giungono a svilupparvisi .

Da questi diversi principj adunque noi tiriamo le seguenti conghietture . Prima , che i germi destinati a perfezionare ciascuna porzione , sono collocati in fila , nel mezzo , e lungo l'interno del verme . Seconda , ch' e' vi sono situati in maniera , che la lor parte anteriore riguarda la testa dell'animale . Terza , che nel verme intero i germi , o non ricevono alcun nutrimento , o se ne ricevono , distrutto ne rimane totalmente l'effetto dalla resistenza , o pressione delle parti vicine . Quarta , che l'effetto della sezione è primieramente di volgere verso il germe più vicino al taglio la parte del fluido nutritivo ,
che

che sarebbe stata impiegata nel nudrimento, e nell'accrefcimento del tutto; in fecondo luogo di agevolare l'eruzione, e l'allungamento del germe, apparecchiandofi una libera ufcita. Quinta, che a mifura, che il germe ingroffa, e fi ftende, la parte del fuo corpo, che ftà in quello del Verme, o vogliam dire nel tronco, fi unifce con effo per mezzo di un vero *innesto*, imboccandofi i vafi di un genere con quelli del medefimo genere, in guifa, che fi forma loro una circolazione comune, e diretta, come fi vede avvenire alle porzioni di diverfi Polipi pofta a capo a capo.

53. *Efempj tratti dalle Pianta, e dalle loro barbatelle.*

Rifpetto alle circoftanze efterne, le barbatelle delle piante ce ne fomministrano un efempio palpabile. Imperocchè la parte fuperiore del germe non potrebbe mai fvilupparfi, fe non all'aria aperta; l'inferiore al contrario la teme, e richiede una certa umidità. Così da quella porzione di tallo, che è fuor di terra, fcaturifcono i rami; da quella che è dentro terra, fcappano le radici. Ma la differenza fenfibile, che fi offerva tralla ftruttura della radice, e quella del tronco, è appunto quella, che cagiona quefte diverfe bifogne.

54. *Fatto ftraordinario. Vermini, che gittano una coda in luogo di una tefta. Difficoltà di fpiegare quefto fatto.*

Avvi una fpezie di Verme lungo, aquatico, in cui la proprietà di nafcere per incifione è racchiufa dentro alcuni termini affai fingolari. Allora che tagliafi la tefta a quefta razza di vermini, ella non ne rigetta, come gli altri, una nuova; ma fe fi fa la fezione ne' punti meno lontani dal mezzo del corpo, o fe fi divide quefto verme in due, in tre, in quattro, od in più parti, ognuna di effe gitterà una coda

nel luogo , dove avrebbe dovuto gittare la testa . Or come spiegare un fenomeno sì strano , ed accor-
 darlo colle conghietture , che quì sopra si sono avan-
 zate ? Si ricorrerà egli a sorte all'ipotesi de'germi
 originalmente mostruosi ? Ma la frequenza del feno-
 meno mal s'accorderebbe con questa spiegazione .
 Si supporrà egli , che questa coda soprannumeraria
 sia una testa mal formata , tal divenuta per diversi
 accidenti ? Ma l'osservazione smentisce questo sup-
 posto , assicurandoci essa , che questa coda è formata
 tanto bene , quanto quella gittata dalla parte poste-
 riore . Si conghietturerà egli finalmente , ch'è sia d'
 uopo di maggior forza in questa spezie di vermi ,
 per isviluppare la testa , che per lo sviluppo della
 coda ? E ciò su questo stesso fondamento , che in
 quelli solamente ha luogo la riproduzione della te-
 sta , dalla parte anteriore de'quali si è recita una
 sola porzione . Ma questa conghiettura altro non fa ,
 che richiamare più da lungi la difficoltà ; poichè in
 fatti , e perchè la testa esigerà ella più di forza , e
 di vigore per parte del verme , a fin di giugnere
 a svilupparsi , di quel che richieda la coda ? Sarebb'
 gli forse , perchè ella è più composta , ed i suoi
 vasi più increspati ? In questa risposta avvi solamen-
 te un raggio di verisimile , di cui peniamo a con-
 tentarci . (1.)

55. *Differenza tralla moltiplicazione de'Vermi per
 via di taglio , e quella delle Piante .*

Questo divario passa tra'l riproduzione dei Ver-
 mi per via di taglio , a quello dello piante , che
 il primo si fa soltanto secondo la lunghezza del cor-
 po , dovechè questo si fa più o meno obbliquamen-
 te alla lunghezza medesima .

56. *Mol-*

(1) Vedi la seconda parte del mio Trattato dell'*Insetto-*
logia Osserv. XXIII. e seq.

56. *Moltiplicazione del Polipo per germoglio :*

Spiegazione.

Quistione su questo proposto, e Risposta.

La moltiplicazione de' Polipi, e degli altri *Vermi per germoglio* si fa come quella per *incisione*, da' germi sparsi nell'interno dell'animale, i quali vi si sviluppano coll'ajuto di certe circostanze. Ma sopra ciò si può fare una quistione, ed è questa: i germi impiegati a perfezionare ciascuna porzione nell'animale, son eglino precisamente gli stessi, che ne cagionano la moltiplicazione per germoglio? Si può crederlo; ma se vi si volesse trovare qualche differenza, ella vi avrebbe poco luogo, salvochè nella positura. Imperocchè i germi destinati alla moltiplicazione per *incisione*, saranno collocati nel mezzo del corpo, come l'abbiamo già supposto; e quelli poi, che producono la moltiplicazione per *germoglio*, posti saranno ne' lati del corpo, nella grossezza della pelle.

57. *Obbiezione contra il sistema de' germogli, tratta dalla loro prodigiosa piccolezza, e dalla velocità del loro ingrandimento. Risposta.*

Si fa contro i germi un'obbiezione, cui non debbo trascurare il rispondere; e questa è tratta dall'infinita loro piccolezza, e dalla prodigiosa velocità, che si suppone nel loro primo ingrandimento. In fatti il feto è visibile pochi giorni appresso il suo concepimento. Dunque egli ha già allora acquistato un volume più milioni di volte maggiore, che non era il suo volume originale. Or come concepire uno sviluppamento così subito, e così rimoto da' progressi ordinarij? Rispondo, non essere alcuno assurdo il supporre, che le leggi determinanti i primi sviluppi del germe, sieno diverse da quelle, che ne regolano gli sviluppi posteriori; ovvero che gli effetti di una medesima legge varino in diversi tempi.

Noi non conosciamo abbastanza la natura di questo

sto atomo organizzato , e la maniera , con cui il liquore femminile agisce sopra esso , per decidere sopra l'impossibilità della cosa . Noi vogliamo giudicare di ciò , che passa nel germe allorchè incomincia a svilupparsi da quel che veggiamo seguire in esso , dappoichè è divenuto abitante del mondo visibile . E pure è cosa molto naturale il pensare , che questi due stati debbano essere differenti . Imperocchè nel primo le fibre hanno tutta la flessibilità possibile , ed i sughi destinati a nudrirle ed a distenderle , sono i più elaborati , i più sottili , ed i più penetranti , che v'abbiano nella natura . Nel secondo stato per lo contrario le fibre sono indurite fino ad un certo segno , e questo indurimento cresce in ciascun giorno . Onde anche l'aumento non può farsi , che lentamente , e per gradi del tutto insensibili . Inoltre i sughi , che lo cagionano , sono più misti , più grossi , e meno attivi . Finalmente la diversità de' siti destinati a queste due età , può essere nel nostro caso di una grande influenza : il maggiore , o minor calore , il contatto più , o meno immediato dell'aria , il moto più , o meno veloce , sono altrettante cagioni particolari , delle quali ben si concepisce l'efficacia .

Se alcuno poi si supponesse , che la natura del germe s'appressi a quella de' fluidi , rappresentandosela per esempio sotto l'immagine di un globetto d'acqua , ei potrebbe anche concepire , che la parte più spiritosa del seme potesse occasionare in questo globetto un'espansione , od una spezie di rarefazione analoga a quella , che segue nell'azione di due fluidi posti l'uno sopra l'altro . Ma a questa spezie di rarefazione sempre succede ben tosto anche un accrescimento reale , prodotto dall'incorporazione delle particelle più solide del liquor femminile . E questo liquore diviene al germe quel , ch'è alla *piccola* pianta quella spezie di farina contenuta nel granello .

L'idea

L'idea da me proposta intorno alla natura del germe, s'accorda benissimo coll'estrema delicatezza, o piuttosto mollezza, che si osserva in tutte le parti dell'embrione; le quali, se si potesse tanto alto misurare, si ritroverebbero peravventura pressochè fluide.

58. *Della conservazione de' germi, e maniera di concepirla.*

Dall'altro canto questa conghiettura potrà parere, che non quadri colla conservazione de' germi, che abbiamo supposti sparsi in tutte le parti della natura. Ma non dee averfi maggior difficoltà a concepire la conservazione di un germe della maniera che si tratta, di quel che abbiassi a concepire quella di un globetto di qualunque fluido. L'acqua, per esempio, si converte in ghiaccio, s'innalza in vapori, entra nella composizione di un gran numero di corpi, senza che le particole componenti cangino di natura.

CAPITOLO V.

Nuove riflessioni sopra i germi, e sopra l'economia organica.

59. *Introduzione, e fine dell'Autore.*

L'Ipotesi de' germi ci offerisce tuttora più quistioni da discutersi, delle quali noi toccheremo le principali, poichè io non fo quì un trattato intero della generazione, ma scorro rapidamente quel tanto, che contiene di più interessante, o di più difficile questa materia.

60. *Prima quistione. Perchè certi germi abbiano bisogno del liquore, che somministra il Maschio, per svilupparsi? Risposta.*

La prima quistione si è, perchè i germi, che si sono introdotti nel corpo delle femmine soggettate alla legge della congiunzione, non possano svilupparsi senza il soccorso del liquore somministrato dal maschio.

Risposta. Questo è l'ordine quì della natura ; che l'interno delle femmine di sì fatta spezie non contenga alcun liquore tanto sottile , o tanto attivo , per aprire di per se stesso le maglie del germe , ed incominciarvi lo sviluppo.

61. *Seconda quistione. Come il germe continui a crescere dappoichè il liquore seminale ha cessato di agire? Risposta.*

La seconda quistione è questa : Come tale sviluppo continui , allorchè il liquore , che l'ha prodotto , è affatto dissipato ?

Risposta. Le macchine animali sono state costrutte con un'arte sì maravigliosa , che convertono in loro propria sostanza le materie alimentizie. Le preparazioni , le combinazioni , le separazioni , che vi eccitano tali materie , insensibilmente le cangiano in chilo , in sangue , in linfa , in carne , in ossa &c. Così dacchè nel germe è incominciata la circolazione , dacchè egli è divenuto animale , si fanno nel suo interno le medesime metamorfosi , La diversità quasi infinita delle particole , che entrano nella composizione degli alimenti , il numero , la struttura , la finezza , l'uffizio de' varj organi , de' quali provano esse l'azione , ci persuaderebbono agevolmente della possibilità di tali metamorfosi , quand'anche da noi con gli occhi stessi non si seguitassero fino ad un certo punto.

62. *Terza quistione. Perchè i germi , che s'introducono ne' Maschi , non vi si sviluppano? Risposta.*

La terza quistione è la seguente : Che forse i germi s'introducono soltanto nel corpo delle femmine ? O se s'introducono ancora nel corpo de' maschi , perchè non si sviluppano , se non in quello delle femmine ?

Risposta. La piccolezza de' germi , la loro dispersione per l'aria , per l'acqua , ed in tutti i misti , che somministrano il nutrimento a' corpi organizzati ,

non

non lasciano alcun luogo a dubitare, che non se ne introduchino ne' corpi di maschi in sì gran quantità, come in quello delle femmine. Ma essendo queste sole provvedute di organi atti a ritenerli, a fomentarli, ed a farli crescere; quindi è, che solamente in esse compiesi la generazione.

63. *Quarta quistione. Perchè di tanti germi, che s'introducono nelle femmine, solamente due, o tre giungono a svilupparsi? Risposta.*

La quarta quistione è: Perchè essendo i germi sparsi in sì gran numero ne' corpi organizzati, solamente uno per volta, e di rado due se ne sviluppano nelle diverse spezie di femmine?

Risposta. Noi non conosciamo gli organi, che nelle femmine ragunano i germi destinati a moltiplicarvi la spezie. Forse è tale la struttura di questi organi, che l'azione del liquor seminale non si fa sentire se non a uno, o a due germi per volta solamente. Ma quand'anche passasse diversamente la bisogna, e quando dovesse supporfi, che il fluido seminale agisse nel medesimo tempo sopra molti germi, niuno assurdo sarebbe l'ammettere, che non tutti egualmente ne fossero affetti. E così quello, o quelli, che ne sono più impregnati si sviluppano, vie più; ed esercitandovisi con maggior forza la circolazione, e gli altri moti, il fluido nutritivo vi si porta in maggiore abbondanza. Gli altri germi poi meno nutriti, e ben presto affamati cessano di crescere, e non propagano la spezie.

64. *Di ciò, che può avvenire in quei germi, de' quali sono stati fermati i primi sviluppiamenti. Egli è impossibile, che ritornino al loro primiero stato.*

Se mi si domanda quel che accade di questi germi sfortunati; io rispondo, non essere impossibile, che le loro parti elementari si rappressino insieme per l'evaporazione de' sughi che erano penetrati nelle ferma glie, e che questi germi non sieno più nel medesimo

simo stato, nel quale erano prima che il liquor seminale avesse operato sopra di loro. Oltraciò, quanti grani, che non producono alcuna pianta! Quanti uovi, da' quali non iscaturisce alcuno uccello! La natura è tanto ricca, che non guarda punto a queste piccole perdite; e ciò, che non serve per un fine, serve per l'altro.

65. *Quinta questione. I germi di una medesima spezie son eglino tutti identici, ovvero vi sono tra essi diverse spezie? Risposta.*

La quinta quistione è in questi termini. I germi di una medesima spezie son eglino tutti eguali e simili? Variano essi peravventura soltanto per gli organi, che caratterizzano il sesso? ovvero vi è ancora tra loro una diversità analoga a quella, che noi osserviamo tra gl'individui di una stessa spezie di Pianta, o di Animale?

Risposta. Se noi consideriamo l'immenza varietà, che regna nella natura, quest'ultima sentenza ci sembrerà più probabile. Forse le differenze che noi osserviamo tra gl'individui di una medesima spezie, meno dipendono dal concorso de' due sessi, che dalla configurazione primitiva de' germi.

66. *Riflessioni sopra la rassomiglianza de' parti a' loro generanti.*

Io confesso nonpertanto, esservi de' tratti di simiglianza, tra i parti, e quelli cui debbono il loro nascimento, la quale non son giunto ancora a spiegare coll'ipotesi da me proposta. Ma veramente questi son eglino punto equivoci? Non si commetterebbe già quel sofisma, che gli scolastici chiamano, *non causa pro causa*; e non si prenderebbe già a sorte per causa ciò, che non è veramente causa? Un Padre gobbo ha un figliuolo gobbo; e tosto si conclude, che il figliuolo trae la sua gobba dal Padre. Questo può esser vero; ma può anche esser falso. La gobba dell'uno, e quella dell'altro posso-

no avere diverse cagioni, e queste possono in mille guise variare. Le malattie ereditarie soffrono minori difficoltà; imperocchè s'intende facilmente, che alcuni fughi viziati alterar deono la costituzione del germe; e se le medesime parti, che sono malaffette nel Padre, o nella Madre, lo sono ancora nel figliuolo, ciò proviene dalla uniformità di esse parti, che le rende capaci a ricevere le medesime alterazioni. Del resto le difformità del corpo derivano bene spesso dalle malattie ereditarie; lo che sminuisce assai la difficoltà, di cui testè ragionavamo. Imperocchè i fughi doveano portarsi a certe parti essendo mal condizionati, queste parti ne resteranno più o meno sfigurate, secondochè si troveranno più, o meno disposte a ricevere queste cattive impressioni.

67. *Sesta quistione. Perchè i bastardi non generino? Risposta.*

La sesta quistione è, perchè i bastardi non generino?

Risposta. Avendo voluto l'Autore della natura limitare le spezie, ha stabilito un tal rapporto tra il liquore seminale ed il germe, che gli organi della generazione di questo non possono essere del tutto sviluppati, se non dal fluido seminale proprio della sua spezie. Dico, del tutto, perchè avvi nei bastardi una certa differenza di sesso; ma questa differenza è incompleta, sendochè essi difatto non generano. Alcuni vasi dunque, che il fluido seminale non ha potuto sviluppare, e che sono restati scancellati subito dopo il concepimento, son quelli, che danno luogo a questa impotenza.

68. *Settima quistione. I germi, che nelle piante producono i rami, producon eglino eziandio la pianticella situata nel grano? Risposta.*

La settima quistione si è; se i medesimi germi che ne'Vegetabili producono i rami e le radici, producono ancora la piccola pianta racchiusa nel grano?

Ri-

Risposta. Il germe, ch'è contenuto nel granello non potrebbe svilupparfi senza il soccorso della *polvere degli stami*. Questa polvere racchiude un liquore, che può supporfi, essere il più sottile, ed il più attivo di quanti ne circolano nella pianta. I germi, che danno l'essere a' rami, ed alle radici, si sviluppano senza fecondazione almeno apparente. Dunque un fluido meno sottile, e meno attivo, che non è il liquor femminile, basta per isviluppare questi germi. Donde può legittimamente conchiudersi, che tali germi sono diversi da quelli, che producono la *pianticella*, in questo, ch'eglino sono più grandi, od hanno le maglie meno serrate. Si potrebbe forse supporre, che il liquore degli *stami* penetri nel corpo della pianta, e vi fecondi i germi, da' quali nascano i bottoni. Ma il troncamento de' fiori non impedisce punto la pianta a gittare de' nuovi rami, e delle nuove radici. Facciafi una forte legatura ad un ramo: si verrà a formare di sopra la legatura un *cordone*. Taglisi quindi il ramo a diritto della legatura, e si planti in terra; vi si attaccherà con molta maggiore facilità, e prontezza che fatto non avrebbe senza questa piccola preparazione. La legatura, interrompendo il corso del fluido nutritivo, lo determina a portarsi in maggior copia a' germi, che sono situati sopra la legatura. L'arte colla quale tutte le parti della pianta sono disposte nel granello ci aiuta a concepire quella, che suppone la distribuzione di queste medesime parti nel germe primitivo.

69. *Ottava quistione. Come si formi una nuova scorza, ed una nuova pelle? Risposta.*

L'ottava quistione è la presente. Se tutte le parti di un corpo organizzato esistevano in piccolo nel germe; e se non si fanno nuove produzioni, come concepire la formazione di una novella scorza, di una nuova pelle &c.?

Risposta. Le fibre di un corpo organizzato non si svi-

si sviluppano tutte in una volta. Ve n'ha un gran novero, che non possono giugnervi, se non coll'ajuto di certe circostanze. Tali sono le fibre, che servono alle riproduzioni, delle quali si tratta. La ferita fatta alla pelle vecchia determina i sughi nutritivi a portarsi alle fibre invisibili, che circondano i labbri della stessa ferita, ec. Ma senza ricorrere all'esistenza di queste fibre invisibili possiamo contentarci di ammettere, che le fibre circostanti la ferita essendosi allargate per la distruzione delle fibre, che le accostavano scambievolmente, e ricevendo tutto il sugo, ch'era portato a queste, debbono naturalmente ingrossare, edistendersi vieppiù.

70. *Nona quistione. Se i cambiamenti, e le metamorfosi degli Insetti, la produzione de'denti, e la riproduzione delle zampe ne'Gamberi, provino, esservi de'germi appropriati a diverse parti. Risposta.*

La nona quistione è, se i cambiamenti di varj animali, le loro metamorfosi, la riproduzione delle zampe ne'Gamberi, quella de'denti ec. provino esservi de'germi particolari, destinati alla riproduzione di diverse parti?

Risposta. Se noi non possiamo spiegare meccanicamente la formazione di una semplice fibra, almeno in guisa tale, che soddisfaccia la ragione, come spiegheremo noi per la medesima via la riproduzione degli organi tanto composti, quanto sono quei della maggior parte degl'Insetti? Qual Meccanica preferirà mai alla formazione di un dente, di una gamba, di un occhio ec.? Se si vogliono preferire l'idee più chiare alle oscurissime, si converrà, che tutte queste parti esistevano in piccolo nel germe principale. Così il germe dell'Insetto, che si trasforma, contiene attualmente tutti gl'inviluppamenti, de' quali e' dee disfarsi, e tutti gli organi, che quelli accompagnano. Queste diverse pelli incastrate l'une nell'altre, o collocate l'une sopra l'altre, possono essere

considerate come tanti germi particolari , racchiusi nel germe principale . Per render ragione della moltiplicazione per incisione , e per germoglio , sono ricorso io stesso ad un' altra ipotesi , perchè mi è paruto , che queste sieno produzioni di un genere differente .

71. *Decima quistione . Un germe di una data spezie , può egli svilupparsi in un tutto organizzato di diversa spezie ? Risposta .*

La decima quistione è, se un germe di una data spezie possa svilupparsi in un corpo organizzato di spezie diversa ; se il germe per esempio del baco detto *Tenia* (1) portato nel nostro corpo , ed imbevuto de' sughi più atti ad alimentare questo verme , giugneste a svilupparvisi , e fosse questo l' origine de vermi del corpo umano .

Risposta . Com'io non credo , che il germe del *Tulipano* possa giammai svilupparsi nella *Rosa* ; così non penso , che il germe del baco *Tenia* possa svilupparsi nel corpo umano , come in sua natural matrice . Io credo anzi , non esservi nella natura legge più invariabile di quella , che ordina , che i germi di una spezie non si sviluppino ne' corpi organizzati di una spezie diversa . Quindi per quanto l' origine de' Vermi del corpo umano sia estremamente oscura , io per me preferirò sempre nondimeno il sospendere piuttosto il mio giudizio in questa materia , che l'abbracciare l'ipotesi di cui si ragiona .

72. *Riflessioni sopra l'origine de' Vermi del corpo umano .*

Una *Mosca* va a deporre le sue uova sul naso di un *Montone* . Un' altra anche più ardita va a gittarle

(1) Alcuni de' nostri Medici Italiani , dalla sua figura lo chiamano *Verme cucurbitino* , altri co' Francesi , e co' Latini , *Lombricolato* .

le nella gola di un *Cervio*. (1) Quando s'ignorassero questi fatti, saremmo egualmente intrigati sopra l'origine de' Vermi del naso del *Montone*, o di quelli della gola del *Cervio*, come lo siamo ora intorno all'origine de' Vermi del corpo umano. Un caso felice di osservazioni più minute, o più inoltrate ci scopriranno forse un giorno il mistero, e ci insegneranno, esser l'istessa cosa dell'origine de' Vermi del corpo umano, come di quella degli altri animali. Se il Verme *Tenia* esistesse nella terra, come l'assicura un valente Naturalista, il problema sarebbe facile a risolversi. Ma l'osservazione, sulla quale s'appoggia questo fatto, non è stata ripetuta, e manca di quelle particolarità, che state sarebbero atte a contestarla. (2) Il *Tenia* è comune a diversi animali: la *Tinca*, ed il *Cane* vi sono molto soggetti. S'intende facilmente, come questo Insetto possa passare dal corpo di questi animali in quello dell'uomo. Ma come s'introduce egli poi nell'interno della *Tinca*? Le acque sono anche meno conosciute che la Terra; farann'elleno dunque la vera patria del *Tenia*? I semi invisibili di questo verme, o il verme stesso, per anche piccolo; passerebbon'eglino peravventura con gli alimenti negl'intestini della *Tinca*? Ma il medesimo insetto può egli poi vivere egualmente nell'acqua, che nel corpo di un animale vivente? Le osservazioni delle Piante, che hannogermogliato nello stomaco, e negl'intestini di varj animali; quelle parimente d'insetti terrestri, o acquatici, che sono usciti dal corpo di molti uomini renderebbono più probabile questa conghiettura, s'elle fossero più sicure, o meglio confermate. Chechè sia di

ciò,

(1) *Memorie sopra gl'Insetti* del Sig. di Reaumur T. 4. e 5.

(2) Vedi la mia Dissertazione sopra la *Tenia*. 1. Vol. des *Scavanss Etrangers*.

ciò, noi veggiamo gli stessi uomini, e gli stessi animali prodursi sotto climi differentissimi, e talora anche contrarj. Li veggiamo anche accostumarsi ad alimenti, che non sono meno diversi de' climi. Noi prolunghiamo, ed abbreviamo a nostro talento la durazione della vita di molti insetti, noi li facciamo vivere indifferentemente in un'aria, o fredda al sommo, od al sommo calda: noi ritardiamo, od acceleriamo, come ci piace, la traspirazione di questi piccoli animali, senza ch'è ne mostrino patimento. (1) Tutte queste sono altrettante presunzioni a favore delle trasmigrazioni del *Tenia*. Finalmente non sarebbe già del *Tenia*, e degli altri vermi del corpo umano, come di più altre spezie d'insetti, la vita de' quali pare, essere stata allegata, dopo il suo incominciamento a quella di diversi animali? I vermi del Montone, e quelli del Cervio, di cui abbiamo parlato, la Pulice, il Pidocchio, ec. ne potrebbero servire d'esempio. Gli esseri dotati di sentimenti sono stati tanto moltiplicati quanto l'ha potuto permettere il piano della creazione. Un animale è un mondo abitato da altri animali; questi sono altresì tanti mondi nel loro ordine; nè sappiamo noi, dove ciò finisca.

73. *Undecima quistione. Come si faccia la moltiplicazione, senza congiungimento? Risposta.*

L'undecima quistione è, come si faccia la moltiplicazione senza congiungimento?

Risposta. Nelle spezie, che non sono soggette alla legge del congiungimento, ciascuno individuo ha in se stesso il principio della fecondazione. Egli è provveduto di organi, che separano dalla massa del suo sangue il liquore sottile, che dee operare lo sviluppo de' germi. Questi germi sono nudriti, crescono, e si perfezionano, come l'altre parti

(1) *Memorie sopra gl'Insetti* del Sig. di Reaumur Tom. 2.

ti dell'animale, e questa moltiplicazione, che ci pare sì straordinaria, ci parrebbe la più naturale, perchè la più semplice, se veduto mai non avessimo animali congiugnerfi.

74. *Riflessione sopra il congiungimento.*

In fatti come avremmo noi supposto, che per produrre una pianta, o un animale, la natura vi avesse dovuto impiegare il concorso di due piante, o di due animali? Consideriamo l'apparato degli organi, che sono stati adoperati ne' due sessi per questo importante fine. Facciamo attenzione alle diverse circostanze, che precedono, che accompagnano, e che seguono l'unione de' due individui, e resteremo convinti, nella natura di più singolare, e di più atto ad eccitare la nostra ammirazione.

75. *Conghietture sopra la ragione metafisica del congiungimento.*

Da qual motivo la suprema Sapienza è stata determinata a scegliere un mezzo sì fatto per conservare le spezie? Qual è la ragione metafisica del congiungimento? La stessa quistione può proporsi intorno le metamorfosi degli Insetti. Le riflessioni, alle quali esse danno luogo, ricompariscono quì, quasi sotto lo stesso aspetto. Se l'*unità*, e la *varietà*, costituiscono il *bello fisico*, la distinzione della maggior parte degli animali in maschi, e femmine, è adattatissima ad abbellire la natura. La diversità, che risulta da questa distinzione, o riguardo all'a forma, alle proporzioni, a' movimenti, o rispetto al carattere, a' genj, alle inclinazioni, fa una prospettiva, che fissa gradevolmente la vista dello spettatore. Potrebbe conghietturarsi con qualche fondamento, che il concorso de' sessi serva principalmente a rendere le generazioni più regolate. In un tutto sì ben composto, com'è un uccello, un quadrupede, e l'uomo, e sarebbe stato senza dubbio cosa assai difficile, che la generazione non fosse rimasa di sovente turba-

ta, o alterata, se ella vi si fosse fatta a guisa de' *Tronchi*, o de' *Polipi*. Idifetti, che facilmente sarebbonfi trovati negl'individui, sarebbono potuti passare nel feto, e da questo negli animali, che ne fossero nati. Quindi il disordine sarebbe cresciuto così in ciascuna generazione. Nell'unione de' sessi al contrario, ciò, che v'ha di difettoso in un individuo, può esser riparato da quel, che somministra l'altro individuo, e ciò, che v'ha di soverchio nell'uno, è compensato da quel, che manca nell'altro.

C A P I T O L O VI.

Della nutrizione considerata relativamente alla generazione. Conghiettture sopra la formazione del liquor seminale.

76. Disegno di questo Capitolo.

NOI abbiamo data un'occhiata all'*Economia organica*. La *nutrizione* è uno de' suoi principali effetti. Consideriamone con maggiore attenzione e la maniera, e le conseguenze. Questo esame più ponderato schiarirà forse la materia della generazione.

77. *Della nutrizione in particolare, e delle materie alimentizie.*

La *nutrizione* è quella operazione, per cui il corpo organizzato converte nella sua propria sostanza, o si assimila le materie alimentizie. Queste materie variano secondo la specie del corpo organizzato. Esse si dividono, come i corpi terrestri in *materie fluide*, ed in *materie solide*; in *materie non organizzate*, ed in *materie organizzate*, in *materie fossili*, *vegetabili*, ed *animali*. La Chimica va anche più innanzi, e ci offerisce nella sua *Terra*, nel suo *Sale*, nel suo *Solfo*, nel suo *Spirito*, nella sua *flemma*, gli elementi di tutti i *misti*. Ma questi elementi non sono ne tanto

to semplici, quant'ella li fa, nè le sole *parti costituenti* de' corpi. Avvi d'altre sorte di elementi, cui non sembra aver la Chimica conosciuti; voglio dire que' *Corpicciuoli organici*, a' quali si è dato il nome di *Germi*. Pare, che il nudrimento de' Vegetabili sia un fluido delicatissimo, ma assai eterogeneo. La terra, che questo fluido contien disciolta, è un mescolglio di tre regni. La rugiada, e l'evaporazioni, che s'alzano dalla terra, sono impregnate di particole di questi diversi generi. Nulla vi ha, nè pure gli stessi metalli, che non penetri nell'interno delle Piante. Senza parlare di quelle, delle quali il tronco, o le foglie son parute adornate di vene d'oro, o d'argento, il coltello calamitato ci scopre ne' Cedri più spezie di particole ferugginee. Si trovano negli alimenti degli animali principj simiglianti, o analoghi a quelli, che entrano ne' nudrimenti de' Vegetabili; ma queste provengono da altre combinazioni, da altre misture, e da altre proporzioni.

78. *Differenza tralle materie alimentative delle Piante, e quelle degli Animali, e tralla maniera, con cui l'una, e gli altri ricevono il nudrimento.*

Per lo più le materie alimentative sono meno attenuate, e meno diverse quando entrano nell'interno degli animali di quelchè sieno quando s'introducono ne' Vegetabili. La natura si è incaricata, per così dire, delle prime decomposizioni de' Misti a favore de' Vegetabili. L'alimento è già sommanente preparato, ed assottigliato allorchè arriva alle radici, o alle loro foglie. Gli animali formati sopra altro modello, che non sono le piante, hanno, com'esse, delle radici; ma queste radici sono molto interne, perchè sono situate negl'intestini. L'alimento v'entra subito sotto una forma assai grossolana, o più o meno voluminosa. Egli è tritato, e disciolto nella bocca, e nello stomaco, e quando scende negl'intestini; e si presenta alle piccole radici,

delle quali son quelli guerniti, è già un fluido preparatissimo. Tra gli animali alcuni non prendono se non cibi liquidi, altri non si nutriscono, che di solidi, ed altri vivono egualmente di liquidi, e di solidi. Vi sono ancora degli animali, i di cui alimenti appartengono a un genere di fossili, altri si cibano di sostanze vegetabili, altri vivono di sostanze animali, ed altri, l'appetito de' quali è più esteso, non si limitano ad un sol genere. Il *verme* di terra si nutrice del medesimo fango, che gli serve di ricovero. Coll'ajuto d'istrumenti, la cui struttura fa maravigliare gli stessi osservatori, la *pulce*, e la *zanzara* traggono dalle nostre vene un alimento sugoso, l'*ape*, e la *farfalla* raccolgono da' fiori l'estratto più prezioso. L'*ostrica* apre la sua nicchia, e riceve insieme coll'acqua del mare de' corpuscoli, e degl'insetti di varie spezie. Tal'è ancora il nutrimento dell'enorme *balena*; la sua gola stretta non si apre, che all'acqua del mare, ingojandone una prodigiosa quantità, e dappoichè il suo vasto stomaco ne ha separati i sughi più nutritivi, ne rigetta con forza il superfluo per via di due canali posti sulla sua testa. Il *baco da seta* fa le sue delizie nella foglia del moro. Il seme di canapa, ed il miglio piacciono al *calderino*, ed alla *quaglia*. La *pecora*, il *bue*, il *cavallo*, il *cervio* vanno a cercare nelle praterie la pastura, che è stata loro destinata. L'*avoltojo*, l'*aquila*, la *tigre*, il *lione* chiamati a vivere di rapina, e di carne, portano da per tutto la desolazione, e la morte. Il *pollo*, l'*anitra*, il *gatto*, il *cane* raccolgono gli avanzi delle nostre tavole, e delle nostre cucine, e campano così di vivande assai differenti. L'*uomo*, il più ghiottotra tutti gli animali; richiama a se tutti i prodotti della natura, e forza tutti i climi a soddisfare a' suoi gusti, ed alla sua intemperanza.

79. *Idea della Meccanica della nutrizione. Principj sopra questo soggetto.*

Qual è la maravigliosa meccanica, che converte una zolla di terra in un corpo organizzato? Qual è l'arte, che trasforma il vegetabile in animale, e l'animale in vegetabile? Con quali operazioni superiori a tutte le forze della Chimica trae la vite dalla terra quel suo delizioso licore, ed il *baco da seta* quel suo brillante filo dal celso? Come mai il *time*, e la *gramigna* si cangiano nelle mammelle della *vacca* in un licore gradevole del pari, ed utile? Per qual segreta virtude quest'ammasso confuso di diverse materie si riveste della forma de' nervi, de' muscoli, delle vene, dell'arterie, ec.? Qual forza, qual potenza distriga questo caos, e ne fa uscire un mondo, la cui struttura, ed armonia eccitano le ammirazioni degli Angeli? Non avvi alcuna vera metamorfosi nella natura. Gli elementi sono invariabili. Le stesse particole, che entrano oggi nella composizione di una pianta, entreranno dimani in quella di un animale. Questo passaggio non cangerà punto la loro natura, e non farà altro, che dar loro un'altra disposizione. In quella guisa, poco meno, che lo stesso pezzo di metallo diviene tralle mani dell'artefice un'segno di valore, l'immagine di un eroe, o la misura del tempo. Tal è ancora l'arte di tutte queste composizioni che arricchiscono ogni giorno le società di nuovi beni. Quest'arte raguna delle materie di ogni genere, le unisce, e le combina sotto diverse proporzioni; dalla quale unione, e da' quali rapporti nasce un edificio, un mobile, una stoffa, un medicamento, una tintura ec. Distruggasi questa collegazione, questi rapporti, abbattasi la piramide, le pietre resteranno le medesime; ma non faranno più, che un ammasso di ruine. Sarà egli dunque delle produzioni naturali, come di quelle dell'arte? Di grazia non temiamo in ciò pensando,
di

di sminuire l'eccellenza dell'opere della natura. Imperocchè quantunque sia ella sottoposta a lavorare sempre sul medesimo fondo, lo impiega però con tanto intendimento, che le sue piccole produzioni superano infinitamente tutti gli umani trovati. Uno di que' piccoli battelli degli Indiani che chiamano *Cante* è incomparabilmente meno discosto dalla perfezione di un Vascello di primo ordine, che il più perfetto oriuolo non è dalla macchina organica più semplice. Mentre che Vaucanson costruisce con mano eccellente la sua Anitra artificiale, e che noi mossi da sorpresa, e da stupore ammiriamo questa imitazione sì ardita dell'opere del Creatore, gli Spiriti celesti sorridono, ed altro non veggiono, se non che un fanciullo, che incide un uccello.

80. *Degli Elementi, e delle loro combinazioni.*

Il mondo fisico è composto di elementi di un numero determinato. La loro figura, le loro proporzioni, le loro qualità variano secondo la loro specie. Dall'unione, o dalla combinazione di questi principj risultano i corpi particolari. La natura degli elementi ci è però sconosciuta; perchè la loro estrema piccolezza, la rozzezza de' nostri strumenti, ed i limiti attuali del nostro spirito ci privano di questa cognizione. Tuttociò, che può fare la ragione, dappoichè ci ha persuasa l'esistenza degli elementi, è il somministrarci qualche lieve conghiettura intorno al modo, con cui operano.

81. *Due sorte d'Elementi.*

Noi possiamo verisimilmente supporre, esservi due sorte di elementi; gli *elementi primitivi*, o *inorganici*, e gli *elementi secondarj*, o *organici*. Quelli del primo genere sono corpi semplici, e sommamente omogenei. Un globetto di aria, un globetto d'acqua, son corpi di questa maniera. Gli *elementi secondarj*, o *organici* sono i germi formati dopo l'incominciamento degli atomi inorganici. I germi disse-

differiscono dagli elementi *primitivi*, in questo, che sono composti; ma convengono con essi in quanto che sono, come quelli, invariabili, nè possono perire, finchè restano infecondi, ed entrano nella composizione de' misti.

82. *Della tendenza degli elementi ad unirsi insieme. Riflessioni sopra l'attrazione Newtoniana.*

Gli elementi tendono ad unirsi scambievolmente; e questa disposizione cresce, o scema pel rapporto più, o meno vicino di loro natura, o di loro rispettive qualità. Noi non penetriamo la causa dell'unione scambievole degli elementi; nè sappiamo, perchè un globetto d'acqua ad altro globetto d'acqua si unisca, e perchè il medesimo non s'unisca ad un globetto d'olio. Il dire, che questa unione è il prodotto di una forza essenziale al corpo, che non ha niente di comune coll'impulso, egli è un ricorrere ad una ipotesi egualmente ardita, oscura, ed incerta. Io non chiedo già, che mi si dimostri quel che sia in se stessa questa forza; poichè nè pure la natura dell'impulso ci è meglio conosciuta. Ma domando solamente, che mi si provi, che i fenomeni, che si vogliono per questa via spiegare, non possano essere spiegati altresì per le forze meccaniche a noi note. L'*Attrazione Newtoniana* è un fatto, che siamo forzati ad ammettere; ma siamo noi perciò forzati ad ammettere ancora, che la cagione di questo fatto sia l'Attrazione medesima? E' egli stato ancora dimostrato, che la gravità sia essenziale alla materia? E non potrebbe parere più probabile il contrario? Noi veggiamo ne' corpi tre proprietà essenziali, o primordiali; l'*estensione*, la *solidità*, la *forza d'inerzia*. Noi appelliamo queste tre proprietà *essenziali*, o *primordiali*, perchè elleno costituiscono la natura del corpo, perchè non sono da esso inseparabili, perchè non possono soffrire alcuna sorta di cambiamento,

e per-

e perchè non dipendono da alcuna cagione , che sia fuori del corpo. La *figura*, ed il *moto* dipendono da una causa, ch'è straniera al corpo ; onde queste non sono proprietà essenziali , ma semplici *modi*, i quali però hanno il loro fondamento negli attributi essenziali della materia ; la *figura* nell'estensione, il *moto* nella solidità. La *forza d'inerzia* per quanto sia impropria questa espressione , e qualunque siasi la natura di cotal forza, è tale però, che per essa il corpo persevera nel medesimo stato di quiete , o di moto finchè è lasciato a se stesso. Se l'*Attrazione* fosse essenziale alla materia , ella sarebbe contraria ad un'altra proprietà essenziale , cioè alla forza d'inerzia, lo che sarebbe contraddittorio ; poichè un corpo in quiete si metterebbe di per se stesso in moto alla presenza di un altro corpo nello stesso tempo , che tenderebbe a conservare il suo primiero stato in virtù della forza d'inerzia. Inoltre una proprietà essenziale non è capace di alcun cambiamento , come abbiamo detto ; Perchè dunque l'attrazione si eserciterebb' ella con maggior forza verso il Polo, che verso l'Equatore ? Abbiamo forse noi visto, che i corpi abbiano maggiore solidità nella Groenlandia, che al Perù ? La forza d'inerzia ammette ella alcuna variazione ? Finalmente si è tentato di spiegare meccanicamente l'Attrazione ; e se le spiegazioni, alle quali si è ricorso, non sono esenti da difficoltà , questo prova meno l'insufficienza delle forze meccaniche, che i limiti del nostro spirito. Adottiamo non pertanto il termine di *Attrazione*, come il più proprio ad esprimere il fatto ; e diciamo pure , che gli Elementi s'*attraggono* scambievolmente gli uni con gli altri , e che quei della medesima specie s'*attraggono* più fortemente, che quelli di diversa specie. Vegliamo ora ciò, che dee risultare da questo principio, e da quelli, che abbiamo posti sul principio di questo Articolo.

83. *Idee sulla maniera, con cui gli Elementi entrano nella composizione de' tutti organici.*

Gli Elementi si parsi per tutte le parti della natura, vi danno l'essere a tre generi di composti, cioè, a' fluidi, a' solidi non organizzati, ed a' solidi organizzati. Non è necessario d'indicare quì i caratteri, che distinguono questi tre ordini di Esseri corporali; poichè non si tratta presentemente, se non de' *Corpi organizzati*. A parlare esattamente, gli Elementi non formano i Corpi organizzati; ma e' non fanno altro, che sviluppare ciò, che si opera pel *nutrimento*. L'organizzazione primitiva de' germi è quella, che determina la *disposizione*, che gli Atomi nutritivi deono ricevere per divenire parti del tutto organico. Un solido non organizzato è come un'opera d'*intarsatura*, e come una pezza fatta a rapporto. Un solido poi organizzato è come una stoffa formata dell'intrecciamento di diversi fili. Le *fibre elementari* colle loro *maglie* sono l'*ordito* della stoffa; gli Atomi nutritivi, che s'insinuano in esse maglie, sono la *trama*. Non istrigniamo però di soverchio questa comparazione.

84. *Principj intorno la Meccanica dell'assimilazione.*

Per ben penetrare la meccanica della *nutrizione*, non ritorniamo al germe, che non ci è noto abbastanza; ma prendiamo il corpo organizzato nel suo pieno incremento. E qual è quì l'effetto, che dee produrre la Macchina? Quali sono le potenze, che mette in opera la natura? E' si tratta di separare dagli alimenti le particelle atte di lor natura ad unirsi al corpo organizzato. La figura, la grossezza, e le qualità di queste particelle variano di molto. Il tessuto del corpo organizzato contiene delle varietà analoghe. Quantunque tutte le sue parti non sieno formate, se non di fibre differentemente intrecciate, tutte queste fibre però non hanno originalmente un'eguale consistenza; la configurazione de' pori, o del-

delle maglie non è per tutto la medesima, nè tutte son formate degli stessi elementi. Gli organi della *nutrizione*, e quei della *circolazione* sono le principali potenze, che la natura mette quì in opera. Per l'azione di sì fatte potenze, l'alimento vien convertito in un fluido, che nelle piante ha il nome di *succhio*, e negli animali quello di *sangue*. Questo fluido è molto eterogeneo, o mescolato; e si può considerare come un ammasso di tutti gli elementi, che entrano nella composizione del tutto organico.

85. *Delle secrezioni in generale.*

Se noi seguiamo il corso di questo fluido, noi osserveremo, che la natura lo fa passare per de' vasi, il cui diametro gradatamente sminuisce, ed i quali si dividono, e si suddividono continuamente. Osserveremo ancora, che negli animali molti di tali vasi formano qua, e là (1) tralle loro pieghe, e contrappieghe, e tra loro varj intralciamenti delle masse più, o meno considerabili, nelle quali apparisce un certo liquore, che non rassembra punto quello da' vasi sanguigni portatovi, e ch'è altresì diverso da quello, che altri vasi sanguigni riportano da queste medesime masse a' principali tronchi delle vene.

Da sì fatte generali osservazioni ne nasce la teoria delle *secrezioni*, ch'è una delle più belle parti dell'economia organica. Sembra, che gli organi delle *secrezioni* sieno spezie di *filtri*, i cui diametri sieno stati proporzionati a quelli delle molecole, che deono estrarre. Quindi mentre il sangue percorre rapidamente i vasi più grandi, depone ne' più piccoli le particelle a questi relative. Ma per quanto siasi ingegnosa, e verisimile questa idea, noi forse c'inganneremmo in qualche caso particolare, se l'amet-

tes-

(1) *Della maniera, con cui si fanno le secrezioni delle Ghiande, del Sig. Winslow. Mem. dell' Accademia di Parigi del 1711. pag. 245. ec.*

teffimo ad esclusione di qualunque altra. Noi supponremo dunque eziandio, che molti organi *secretorj* sieno stati impregnati fin dal loro incominciamento, da un liquore simile, o analogo a quello, ch'è deono separare, di manierachè accada di sì fatti organi, come avviene di que' pezzi di drappo, o di tela, che si tuffano in un vaso pieno di diversi liquori, i quali non tirano a se, se non quelli, de' quali erano prima imbevuti. Finalmente il rallentamento del moto de' liquori ne' più piccoli vasi, gli angoli, ed i giri de' vasi medesimi, la specie d'attrazione, che può esservi tralle pareti de' canali, ed i liquori, che vi circolano, possono farli altrettanti principj delle secrezioni.

86. *Conghiettura sulla maniera, con cui gli atomi nutritivi si uniscono al tutto organico.*

Ma come mai i corpuscoli nutritivi si uniscono eglino alle parti, che deono alimentare? Questo è ciò, che noi non abbiamo punto spiegato allorchè posti abbiamo i principj della Teoria dell'incremento. Ci rappresenteremo forse il liquore nutritivo circolante ne' piccoli vasi, come un Ruscello, che depone sulle sue coste le varie materie, di cui è carico? Ci potremmo contentare di questo paragone, se si trattasse solamente di una semplice deposizione; ma quì vi è assai di più. Gli atomi nutritivi non si applicano semplicemente alla superficie delle parti; ma ne penetrano anche la tessitura, e l'estendono per ogni maniera. Il moto di *fistole* per quanto forte si supponga ne' vasi maggiori, non può essere che debolissimo nell'ultime ramificazioni, o sia a cagione del loro allontanamento dal principio della circolazione, o sia a cagione dell'estrema finezza delle loro membrane. Noi siamo dunque ridotti a cercare altrove una cagione più efficace dell'effetto, di cui si parla. Questa cagione farebb'ella per avventura una forza analoga a quella, che solleva i liquori ne' *Tabi Capil-*

pillari, o che fa, che una corda bagnata possa alzare un gran peso nel raccorciarsi? Questa conghietura mi pare una delle più naturali, che possano formarsi in questa materia. Così tutte le parti del corpo organizzato restano nutrite per una specie d'*Imbevimento*, come già quì sopra ho insinuato.

87. *Due principali risultati della nutrizione; il sostentamento delle parti, ed il loro accrescimento per ogni banda.*

Dalla nutrizione risultano due principali effetti; il mantenimento delle parti, ed il loro accrescimento per tutti i versi. L'azione continua de' liquori sopra i vasi, ne quali quelli circolano, il fregamento delle parti solide, l'una contro l'altre, il moto muscolare, il più, o il meno di calore del corpo organizzato, occasionano in tutte le parti una perdita di sostanza, che, se non fosse incessantemente riparata, se ne trarrebbe la distruzione. A ciò rimedia la nutrizione, ella risarcisce i corpuscoli, che si dissipano per mezzo di altri corpuscoli a quelli analoghi.

88. *Della disposizione originale delle fibre a distendersi per tutti i versi. Ragione di tal disposizione.*

La forza, che spigne nelle maglie delle fibre gli atomi nutritivi, produce l'estensione di esse fibre per tutti i versi. La durazione, ed il grado di questa estensione sono relativi alla natura degli elementi, de' quali sono composte le fibre. La maggiore, o minore facilità di tali elementi a strisciare gli uni sopra gli altri, o per esprimermi in altri termini, la loro *duttilità* più, o meno perfetta, rende più, o meno pronto, o più o meno considerabile l'aumento. Le fibre elementari di certi corpi organizzati, avranno, se così piace, una duttilità analoga a quella dell'oro; altri corpi organizzati avranno fibre, la cui duttilità corrisponderà a quella dell'argento; altri saranno composti di fibre, che avranno la sola duttilità del ferro, ec. L'aumento in lungo cessa ordinaria-

men-

mente prima di quello in largo. I fughi, che erano impiegati per l'estensione delle fibre principali, cessano di portarvisi in tanta copia, allor che hanno esse preso tutto il loro accrescimento: il superfluo di questi fughi si dirige apparentemente verso i fili laterali, o intermedj, de' quali procura lo sviluppo.

89. Ragioni della solidità, che acquistano le parti, dappoichè hanno ricevuto tutto il loro aumento, e delle cause naturali della morte.

Il nutrimento, che ricevono le fibre, che hanno già ricevuto tutto il loro aumento, accresce sempre vieppiù la loro solidità. Il battimento continuo de' vasi, e la pressione reciproca delle parti, che tirano a riunire più fibre, o più membrane in una sola fibra, o in una sola membrana; l'aumento dell'attrazione, che risulta dall'aumento delle masse; la diminuzione degli umori, che danno occasione alle parti solide di appressarsi, odì unirsi più intimamente, un clima eccessivamente caldo, o un clima eccessivamente freddo; i nutrimenti secchi, grossi, e viscosi; un genere di vita penosa, o laboriosa, sono altrettante cagioni, che contribuiscono all'induramento delle fibre. L'ultimo termine di tale induramento è l'ultimo termine della vita, I liquori contenuti nell'ultime piegature, o nell'ultime piccole ramificazioni, non vi soggiornano più. Essi sono continuamente riassorbiti per mezzo di piccoli vasi, che li conducono in altri vasi più grandi, donde e' passano di nuovo in quelli della circolazione. Or se questa *riassorbizione* di liquori non si fa più, quelli si corrompono; e questa corruzione è una delle cagioni della morte.

90. Saggio d'applicazione de' principj precedenti allo sviluppo del germe.

Ravviciniamoci ora al nostro proposito. Ciò, che sono gli alimenti grossolani al corpo organizzato nel suo pieno aumento, il fluido seminale lo è al ger-

me dopo la fecondazione: Gli organi infinitamente piccoli di quest'atomo vivente agiscono sopra le Molecole mutate del liquor femminile, come gli organi infinitamente grandi della pianta, o dell'animale sviluppato agiscono sopra le Molecole degli alimenti. Il germe dunque separa dal liquor femminile quelle Molecole che sono atte ad unirsi ad esso. Noi abbiamo supposto, che questo liquore contenesse gli elementi di tutte le parti del corpo organizzato, e siamo stati condotti a tale supposizione da conseguenze naturali. Molti autori l'hanno altresì ammessa; ed una tale conformità di sentimenti è ad essa favorevole. E' stato detto assai unanimamente, che il liquor femminile è un estratto del corpo organizzato. Ma niuno ha intrapreso a spiegare, come si formi questo estratto. Io sono stato lungo tempo senza ardire di portare verso questa parte i miei sguardi, spaventandomi la difficoltà del problema. Ma una conghiettura che mi si è offerta, mi ha alquanto incoraggiato. Io ho pensato, che gli organi della generazione, sieno quegli del maschio, o della femmina, potessero essere stati costrutti con arte sì maravigliosa, ch'è fossero una rappresentazione delle principali viscere dell'animale.

91. Supposizione dell'Autore sopra la struttura degli organi della generazione, e sopra la formazione del liquor femminile. Conseguenze naturali di questa supposizione.

Mi spiego. Ho creduto, che vi siano ne' testicoli de' vasi relativi a quella parte del cervello, che filtra il fluido nervoso; altri, che corrispondano al fe-
gato colla loro funzione, e che separino delle particelle analoghe alla bile; altri, che corrispondano al sistema linfatico, e che separino una materia analoga alla linfa ec. Questa conghiettura un pò ardita, lo confesso, ma non punto assurda, potrebbe somministrare una spiegazione assai felice di alcuni fatti al-

quan-

quanto imbarazzati; per esempio, dalla rassomiglianza de' figliuoli al padre, ed alla madre, o sia rispetto ad alcuni tratti solamente di figura, o sia riguardo al temperamento, ed alle inclinazioni. Si sa, quanto possa influire sopra la costituzione de' solidi la qualità de' fluidi. E nè pure s'ignora, quanto la qualità degli umori abbia d'influenza sopra il temperamento, le inclinazioni del quale altro non sono bene spesso, se non una conseguenza. Io ammetterei quì il concorso de' due liquori nell'atto della generazione; e supporrei, che le Molecole dominanti di quello del maschio, o di quello della femmina, determinino i rapporti più, o meno espressi dell'uno, o dell'altra, colla produzione che dee loro l'origine.

Ma, si dirà forse, come spiegare, per mezzo di questa idea semplicemente, un gobbo, un naso eccessivamente lungo, gli occhi di un certo colore ec.? Io convengo benissimo, non vederli a un tratto la soluzione di queste difficoltà. Ma si sa egli fin dove s'estenda l'azione de' fluidi sopra i solidi, e tutto ciò, che operar possono le diverse distribuzioni, o le varie combinazioni de' primi? Ciò può andare al punto, che i fatti, de' quali si parla, ne risultino necessariamente. Io domando soltanto, se vegga la cosa impossibile.

92. *Riflessioni sopra l'opinione, che ammette, essere il liquor seminale un estratto del tutto organizzato. Maniera di concepirlo.*

Coloro, che hanno detto, essere il liquor seminale un estratto del corpo organizzato, e che hanno stesa questa espressione a tutte le parti solide, non hanno gran pena a trarsi fuori da questa difficoltà. Ma io prego, che mi si dica quel che sia l'estratto di un gobbo, di un naso, di un occhio ec.? Si crederà egli, che i corpuscoli, che si distaccano continuamente da' solidi ne' moti vitali, sieno portati agli organi della generazione, lor serbatojo comune?

La sottigliezza di tal risposta non sarebbe una ragione sufficiente per farmela rigettare.

93. *Perchè i fanciulli non generino.*

Mi si dimanderà ancora perchè i fanciulli non generino? Io rispondo, che degli organi della generazione egli è, come di alcune altre parti, che non si sviluppano, se non ad una certa età. Ma ciò basti su questa idea, ch'io qualificarei quasi di romanzesca. Se però ella piacesse, non mancherebbero peravventura ragioni per sostenerla. Io ripeto, che in un soggetto così oscuro, non si possono formare mai abbastanza delle conghietture; alla ragione appartiene in seguito ad apprezzarle.

94. *Ricerca sopra la disseminazione.*

Del rimanente, in tutto ciò, che ho esposto intorno la generazione, l'ipotesi de' germi sparsa da per tutto, sembra essere l'ipotesi dominante. Non è, ch'io abbia rigettata quella de' germi involuppati gli uni dentro gli altri; io ho bensì sempre riguardate le difficoltà, che si fanno contro questa ipotesi, come Mostri, che superano l'immaginazione, e che al contrario sono vinti, ed atterrati dalla ragione. Ma ho creduto poi dover preferire un sistema, nel quale la ragione, e l'immaginazione s'accomodano del pari. E perchè non compiacere un poco l'immaginazione, quando lo permette la ragione?

C A P I T O L O V I I.

Osservazioni microscopiche sopra i liquori seminali, e sopra le infusioni di diverse spezie. Nuovo sistema sopra la generazione.

95. *Occasione, e disegno di questo Capitolo.*

IO componeva il Capitolo precedente, quando mi è battuto alle mani il secondo Volume dell' *Istoria naturale, generale, e particolare*. La conformità delle
ma-

materie contenute in questo Volume con quelle ; ch'io tratto, la riputazione dell'Autore, la singolarità del sistema, la novità delle scoperte, l'aria di prove, che ostentano, e sopra tutto la diffidenza in cui debbo essere, riguardo alle mie idee, mi avevano a un tratto fatto pensare di rinunziare a tutto quello, che avevo scritto intorno alla generazione. Avendo però in seguito considerato più da vicino, benchè con una occhiata generale, il nuovo sistema, e l'esperienza, sulle quali si procura stabilirlo, ho creduto di poter darne quì un estratto, ed arrischiare nello stesso tempo di lasciar sussistere le mie conghietture. Ho pensato, che i miei Lettori desidererebbono scegliere, paragonare, e combinare.

96. *Previso delle Osservazioni del Sig. di Buffon.*

Prima sperienza sullo sperma umano.

Eccomi dunque a dare un ragguaglio preciso delle nuove scoperte microscopiche sopra i liquori seminali, e sopra le infusioni di diverse spezie. Passerò poi alle idee particolari, che son nate da queste scoperte.

Prima sperienza. Una gocciola di sperma di un uomo morto di fresco, e mescolata con un poco d'acqua chiara, essendo stata messa nel fuoco di un eccellente microscopio, vi si viddero subito de' filamenti assai grossi, che si stendeano in rami, ed in branche, dove si aggomitolavano, e si trammischiavano. Egli no erano agitati da un moto di *ondolazione*. Molti si gonfiarono, e da questi gonfiamenti uscirono de' globetti, o parti ovali, che tosto restarono attaccati a' filamenti per un piccolo filetto, che si allungava appoco appoco, e si distaccò dal grosso filamento col suo globo. Prendendo questo liquore appoco appoco della fluidità, disparvero i filamenti, ed i piccoli corpi restarono sospesi a' loro filetti. Aveano la maggior parte un moto di *oscillazione*, ed inoltre un libramento verticale, che sembrava indicare, essere questi

piccoli corpi rotondi. Due ore appresso, divenuto il liquore anche più fluido, i piccoli globetti si movevano più liberamente, si raccorciavano i loro filetti, il moto d'*oscillazione* sminuì, e crebbe quello progressivo. Nel termine poi di 5. o 6. ore i globetti si spacciarono del tutto da' loro filetti; si mossero per innanzi con una gran prestezza; la maggior parte erano ovali, ed alcuni aveano le due estremità gonfiate. Essendo già scorse dodici ore, il liquore depose una spezie di materia gelatinosa biancastra, e quella che galleggiava, era chiara come l'acqua, ma viscosa, e l'attività de' piccoli corpi cresceva per ogni verso. Ventiquattr'ore dopo, la materia densa era molto cresciuta. I corpi in moto, in ciò che rimaneva di liquore chiaro, erano in piccol numero, ed insensibilmente perdeano tutto il loro movimento. Questa è la serie dell'esperienze fatte sopra questa prima gocciola di *sperma*. Elle sembrano provare, che que' filetti non appartengono niente a' corpi moventisi; ch'è non ne sono nè code, nè membri, e che quanto più il filetto è lungo, tanto più il suo globetto è imbarazzato nel suo moto.

97. *Seconda esperienza sopra lo sperma umano.*

Seconda esperienza. Un'altra gocciola di *seme*, che non era stata punto mescolata coll'acqua, essendo stata osservata col Microscopio, parve, che il liquore essendo divenuto limpido nel termine di dieci, o undici ore, i globetti spogliati de' filetti uscissero in forma di una certa mucillaggine, o di una ciocca di filamenti, e passassero rapidamente ad una parte del *Campo* del Microscopio alla parte opposta, a guisa di corrente. Sminuendosi di tanto in tanto la sorgente, donde quelli partivano, il liquore finalmente si seccò, e divenne come un punto nero nel suo mezzo. I globetti moventisi, che per lo seccamento si riunirono, e che perdettero della loro grandezza, formavano attorno una reticella, o piuttosto

tolto una tela di ragno; e nello stesso tempo, che scemavano di volume, crescevano di peso specifico, il che li faceva cadere a fondo del liquore, senza conservare alcun movimento.

98. *Terza esperienza, sopra lo sperma del Cane.*

Terza esperienza. Nel seme del Cane, si sono veduti de' corpi mobili simiglianti a quelli dell'uomo, con de' filetti della stessa grandezza; e solamente non si sono veduti alcuni filamenti. Il moto de' globetti a coda, che era verticale, era più gagliardo, ma non tanto rapido. Il quarto giorno, non vi era, che un piccolissimo numero di questi globetti, mentre che ve n'erano assai, che non aveano punto di coda. Il liquore depose un sedimento composto di globetti senza moto, e di code staccate.

99. *Quarta esperienza, sopra lo sperma del Cane.*

Quarta esperienza. Il seme di un Cane dopo poco aperto, mostrò una gran quantità di piccolissimi globetti senza moto. I testicoli di questo medesimo Cane essendo stati messi in infusione, vi si vide tre giorni appresso una gran copia di corpi mobili di figura ovale, senza filetti, simili nel resto a' primi, moventisi per ogni parte; alcuni cangianti di figura, o si allungavano o si raccorciavano, o si gonfiavano nell'estremità. Si vide, sino al ventesimo giorno, che si muoveano con maggior rapidità che mai, ma di una estrema piccolezza. Allora si formò una specie di pellicola sulla superficie dell'acqua. Questa pellicola pareva composta degl' involuppi di questi piccoli corpi. L'acqua non avea avuta alcuna comunicazione coll'aria esteriore.

100. *Quinta esperienza, sopra lo sperma del Coniglio.*

Quinta esperienza. Dopo aver fatti aprire cinque Conigli, senza avervi trovato alcun liquore seminale, il sesto ne somministrò in abbondanza. E esso si sciolse lentamente, e per gradi in filamenti, ed in grossi globetti, attaccati gli uni agli altri, ma senza

distinto movimento. Quindi essendosi liquefatto, si disseccò. Mescolato coll'acqua, non si potè stemperare. Avendo fatta un'infusione del liquore del Coniglio, vi si osservarono i medesimi grossi globetti, ma in piccol numero, e separati gli uni dagli altri, ed i cui moti erano sì lenti, che appena erano sensibili. Questi globetti qualche ora appresso scemarono di volume, e crebbe il loro moto intorno al proprio centro. Nel termine di 24. ore i globetti apparvero in assai maggior numero. Essi erano scemati in grossezza a proporzione. Questa diminuzione di volume crebbe di giorno in giorno, di maniera che nell'ottavo eransi renduti quasi insensibili. Finalmente essi sparirono interamente, ed un poco prima aveano cessato di muoversi.

101. *Sesta sperienza, sullo sperma del Coniglio.*

Sesta sperienza. Il liquore femminile del Coniglio nell'istante, che l'ebbe somministrato alla femmina, parve più fluido, e diè de' fenomeni diversi. Vi si videro de' globetti in moto, e de' filamenti senza moto; de' globetti a fili, somiglianti a quelli dell'uomo, ma più corti, e che traversavano il campo del microscopio, in forma di corrente. Resta nondimeno qualche dubbio intorno all'esistenza di queste code, o filetti, che potrebbero anche non essere altro, che tratti formati nel liquore dalla rapidità del moto di questi globetti.

102. *Settima sperienza, sopra lo sperma del Montone.*

Settima sperienza. Il liquore femminile del Montone produce un numero infinito di corpi, che si muovevano per ogni parte, e ch'erano di figura lunga. Il liquore essendo stato stemperato con dell'acqua calda, per impedire, ch'è non si coagulasse, i piccoli corpi vi conservarono il lor moto, e prodigioso n'era il loro numero, ed erano senza coda.

103. *Ottava sperienza , sopra lo sperma delle femmine.*

Ottava sperienza. Le stesse sperienze furono fatte sul liquor femminile delle femmine . Si trovò questo liquore in certi corpi glandulosi simili a piccoli capezzoli , che erano in uno de' testicoli , situati nell'estremità delle corna della matrice di una *Cagna* . Si distinsero ben presto i piccoli corpi moventisi , provveduti di code , o di filetti , e che rassembravano del tutto a quelli del *Cane* . Vi si videro altresì molti globetti , che si sforzavano di sbrigarfi dalla mucilaggine , che li circondava , e che portavano appresso di se de' filetti . Questo liquore della femmina è tanto fluido , come quello del maschio . Nel termine di 4. o 5. ore e' fece una deposizione , donde scaturì un torrente di globetti , che sembravano attivissimi , e pareva , che volessero sbrogliarsi del loro inviluppo mucilagginoso , e delle loro code .

104. *Nona esperienza , sopra la mescolanza de' due spermi.*

Nona sperienza. La mescolanza de' due liquori di un *Cane* , e di una *Cagna* non diè niente di nuovo , essendo il liquore , ed i corpi moventisi sempre i medesimi , e del tutto simili .

105. *Decima sperienza , sopra i Testicoli della Vacca.*

Decima sperienza. Si ricercò in seguito ne' testicoli della *Vacca* il liquore , di cui si tratta . Vi si trovò , non in vescichette linfatiche situate nella superficie di essi testicoli , le quali anzi non contenevano , che un liquore trasparente , e che non mostrava niente di moto ; ma in certi corpi glandulosi grossi , e rossi , come una ciriefa . Vi si osservarono de' globetti mobili , ma assai piccoli ed oscuri , senz' apparenza di code . o di filetti . Gli uni aveano un moto progressivo assai lento , gli altri erano immobili .

106. *Undecima sperienza, sul medesimo soggetto.*

Undecima sperienza. I testicoli di due *Vacche* furono così messi in infusione nell'acqua pura, e racchiusi diligentemente in un boccale. Nel termine di sei giorni, vi si scopre una quantità innumerabile di globetti mobili di una estrema piccolezza, assai attivi, giranti sul loro centro, e per tutte le parti; e disparvero del tutto dopo tre giorni.

107. *Dodicesima sperienza, sopra l'acqua dell'Ostrica, e sopra la gelatina del Vitello.*

Dodicesima sperienza. Nell'acqua dell'*Ostrica*, e nella *gelatina* del *Vitello* arrostito, essendo state poste all'esperienza nella medesima guisa, vi si scoprirono a capo di alcuni giorni de' piccoli corpi, gli uni ovali, gli altri sferici, simili a pesci notanti, ma sprovvisti di code, e di membri. Essi erano assai distinti, e divennero di giorno in giorno più piccoli.

108. *Tredicesima sperienza, sopra le infusioni de' granelli del Garofano, e del Pepe.*

Tredicesima sperienza. Si esaminarono ancora le infusioni de' granelli di alcune piante, e particolarmente del *Garofano*, e del *Pepe*. L'infusione del *Garofano* offerì una grandissima copia di globetti, il cui moto era sommamente sensibile, e si conservò per tre settimane, a capo delle quali la piccolezza de' globetti si aumentò fino a segno di renderli affatto invisibili. L'acqua del *Pepe* bollita, e quella ancora, che non avea punto bollito, presentarono il medesimo spettacolo, ma più tardi.

109. *Quattordicesima sperienza, sopra il discioglimento di una polvere pietrosa coll'acqua forte.*

Quattordicesima sperienza. Una fermentazione di polvere di *Pietra* con una goccia di *acqua forte*, non produsse niente di simile. Di maniera che avvi luogo a dubitare, che quel che si chiamava
fer-

fermentazione, non fosse altro, che l'effetto di queste parti di animali, e di vegetabili.

110. *Quindicesima speranza, sopra i latti de' Pesci, e particolarmente sopra quelli del Calamajo.*

Quindicesima speranza. I Latti di differenti spezie di Pesci vivi, nulla dierono di più rimarchevole di ciò, che dato avea l'infusione del Garofano. Non fu però così de' latti del Calamajo. Vi si scoprirono delle particolarità notabili, e che non sono ancora state osservate in alcun'altra spezie o di Pianta, o di Animale; benchè siavi luogo a credere, ch'esse non sieno solamente proprie del Calamajo. Il liquore lattiginoso di questo Pesce, racchiude delle piccole macchine di una struttura assai composta, e di cui non è così facile il dare un'idea ben chiara. Questi sono piccoli ordigni chiusi in un doppio stuccio, (o guaina) trasparente, cartilaginoso, ed elastico. L'estremità superiore dello stuccio esterno è montata da una testa rotonda, e contornata in guisa, che copre un'apertura destinata a lasciare uscire le parti racchiuse nell'interno dello stuccio. Queste parti sono una Vite, un Pistone, un Bariletto, ed una sostanza spugnosa. La Vite occupa l'alto dello stuccio, al quale ella s'attiene per due legamenti. Il Pistone, ed il bariletto sono situati nel mezzo di questo stuccio. La sostanza spugnosa ne occupa il basso. Un umore viscoso circonda queste piccole macchine; e queste non lavorano, se non quando sono da quello sbarazzate. Se non vengano ritirate, e se si umetti la testa dello stuccio, si determineranno ad agire, e si osserverà il loro moto assai distintamente. Si vedrà la Vite montare lentamente verso la cima dello stuccio. I suoi giri della spirale per l'innanzi poco serrati, si chiuderanno sempre più. Il Pistone, il Bariletto posto immediatamente sotto, e la sostanza spugnosa s'avvanzeranno pel medesimo verso. La testa dello stuccio si disporrà allora a lasciare libero il passo
a tut-

a tutte queste parti, e queste bentosto si lanceranno. Il *Pistone*, ed il *Bariletto* si separeranno in istante l'uno dall'altro, ed il *liquor seminale* uscirà dall'interno di quest'ultime sotto figura di una materia sierosa, nella quale ondeggeranno molti globetti opachi, senza alcun segno di vita.

III. *Riflessioni sopra la bellezza di sì fatte osservazioni microscopiche.*

Belle sono le sperienze, ch'io fin qui ho descritte. Parrebbe, ch'elle ci portassero sino a' confini più rimoti della creazione sensibile, se la ragione non ci persuadesse ben tosto, che il più piccolo globetto visibile del liquore femminile, è il principio di un altro universo, cui l'infinita piccolezza delle sue parti mette fuor della portata de' nostri migliori microscopj. Noi ammiriamo que' globi immensi, che girano maestosamente sopra le nostre teste, noi studiamo con diligenza le curve, che e' descrivono; noi calcoliamo il loro corso; ricerchiamo la loro vera figura; noi misuriamo la loro grandezza; noi osserviamo le loro fasi; machi farà quel fisico, che tenterà queste diverse operazioni sopra que' globi infinitamente piccoli, che girano ne' liquori seminali? Chi ci disegnerà le curve infinitamente diverse, ch'essi descrivono? Chi ci assegnerà le leggi de' loro moti, e delle loro rivoluzioni? Chi penetrerà le loro vere figure, e la ragione di tutte le loro apparenze? Chi penetrerà questa notte profonda; e chi esaminerà questo abisso, nel quale va a perdersi la natura? Quale Intelligenza mai può paragonare a un colpo d'occhio, la sfera di *Saturno*, e quella del globetto, che nuota nel liquor seminale di un *Lendine*? Questa intelligenza non abita certamente in terra, ma il Cielo bensì è la sua stanza. Ella conosce il numero delle stelle fisse, e quello de' mondi, che esse illuminano. Ella sa, quante volte il più piccolo globetto del liquore è contenuto nel globo enorme del Sole.

112. *Il preciso del nuovo sistema. Molecole organiche comuni a' vegetabili, ed agli animali.*

Alla spiegazione che ho data dell'ultime sperienze, che sono state fatte intorno alla generazione, io aggiugnerò un leggiero schizzo del nuovo sistema, che quelle pajono stabilire. Secondo questo sistema avvi nella natura una materia comune a' vegetabili, ed agli animali, composta di *Particole organiche*, vive, primitive, incorruttibili, e sempre attive. Il moto di queste particole può esser fermato dalle molecole più grosse de' misti; ma dappoichè elle giungono a distrigarsi, producono colla loro scambievole unione le diverse spezie di esseri organizzati, che nel mondo figurano. Questa materia sparsa da per tutto serve alla nutrizione, ed allo sviluppamento di tutto ciò, che vive, o vegeta.

113. *Che il soprappiù delle Molecole organiche è mandato ad un serbatojo comune, e quale sia questo serbatojo.*

Il soprappiù di ciò, ch'è necessario a produrre questo effetto è mandato da tutte le parti del corpo in un serbatojo comune, dove si forma in liquore. Gli organi della generazione sono questo serbatojo.

114. *Liquore seminale: Modello interiore:*

Globetti mobili.

Il liquore seminale contiene tutte le molecole analoghe al corpo dell'animale, o del vegetabile, e secondochè esso trova una convenevole matrice, produce un piccolo essere del tutto simile al *modello interiore*, di cui fanno parte le molecole. Ma quando esse non trovano matrice conveniente, il liquore produce quegli esseri organizzati, che sono que' corpi mobili, e vegetanti, che si veggiono ne' liquori seminali degli animali, e nelle infusioni vegetabili, od animali. Tutte le sostanze organizzate racchiudono dunque una gran quantità di questa materia produttrice, come si vede per mezzo delle infusioni di ogni

materia. Ella vi comparisce subito sotto la forma di corpi mobili, tanto grossi, quanto sono quelli de' liquori feminali; ma che a misura, che cresce la decomposizione, sminuiscòno essi di grossezza, e acquistano maggior moto, e finalmente divengono impercettibili, quando la materia che è in infusione ha terminato di corrompersi. Quindi segue, che la marcia delle piaghe è composta di queste piccole parti organiche, che sono in grandissimo moto.

115. *Origine de' Vermi nel corpo umano, secondo il nuovo sistema.*

Questa materia produttrice trovandosi ragunata in qualche parte dell'animale, da cui ella non può scappare, vi forma degli esseri viventi, quali sono la *Tenia*, gli *Ascaridi*, e tutti i Vermi, che sono nelle vene, quelli che si traggono dalle piaghe, o che si trovano nelle carni corrotte, nella marcia ec.

116. *Vegetazione filamentosa.*

Le molecole, o corpi mobili, di cui si tratta, sono tutti sviluppati ne' liquori feminali, e vi si manifestano molto prontamente. In tutte le sostanze vegetabili, ed animali, la materia produttrice apparisce sotto sembianza di una Vegetazione, per viadi certi filamenti, che crescono, e si estendono; e per mezzo di certi gonfiamenti all'estremità di questi filamenti, che venendo a scoppiare, danno il passo ad una infinità di corpi già messi in moto. Tale è il *Feto*, che nel primo tempo non fa altro, che vegetare.

117. *Della nutrizione, dello sviluppo, e della riproduzione, secondo il nuovo sistema.*

Così questa materia organica, animata, passa universalmente alla *nutrizione*, allo *sviluppo*, ed alla *riproduzione* di tutte le sostanze vegetabili, ed animali. Primo alla *nutrizione*, per un'intima penetrazione di questa materia in tutte le parti del corpo dell'animale, o del vegetabile. Secondo allo *sviluppo* in quanto che questa penetrazione tro-

va delle parti ancora assai *duttili* per gonfiarsi , ed estendersi; il che non è , che una spezie di nutrizione. Terzo alla *riproduzione* per la sovrabbondanza di questa stessa materia, che è spinta per ogni parte del corpo dell'animale , o del vegetabile , e che essendo destinata a nudrire questa medesima parte , è ad essa per conseguenza perfettamente analoga . La *nutrizione* , lo *sviluppiamento* , e la *formazione* di un nuovo essere organizzato sono il prodotto di una *forza* sconosciuta, che a guisa di quella della *gravità* , penetra tutta la massa , ma che nulla ha di comune colle *forze meccaniche* . La legge fondamentale di questa forza è, che le molecole organiche , che hanno fra loro maggior relazione , si uniscono più strettamente. Così nel commercio di due individui , il liquore , che somministra il maschio , si mescola con quello , che somministra la femmina , e questi due liquori non ne formano , che un solo . Le molecole analoghe , o corrispondenti di un tal liquore tendono ad appressarsi , e ad unirsi in virtù de' loro rapporti . E come queste molecole sono state tramandate da diverse parti di ciascuno individuo , dove si sono , per così dire , modellate , così elle conservano nel liquore femminile una disposizione a rappresentare queste medesime parti . Esse formano dunque nella matrice alcuni tutti particolari , donde risulta il tutto generale , ovvero *l'embrione* . I corpi organizzati , le cui parti tutte sono formate di particole organiche , che hanno in piccolo la medesima forma esterna , ed interna , come il corpo grande , sono quelli , la cui produzione è la più facile , e la più abbondante . Questi sono altresì i corpi più semplici . Il Polpo è formato della ripetizione di più particole organiche che sono in piccolo veri Polpi . Quindi è presso a poco , che una massa di *sal marino* è formata dalla ripetizione de' cubi di diverse grandezze . I corpi più composti , e perciò anche più perfetti , hanno molte parti *dis-*
simi-

similari, e pochissime delle *similari*; donde viene, che essi riproducono meno facilmente, e meno abbondantemente. Il corpo organizzato riceve per la nutrizione delle molecole organiche, o atte ad unirsi ad esso, e delle molecole informi, o che non sono atte ad unirsigli. Esso separa, o rigetta queste, e incorpora, o ritiene quelle prime. Ma ne ritiene tante meno, quante meno ne abbisogna di ritenere, o quanto più è avanzato nel suo aumento. Allora il superfluo di queste molecole è mandato agli organi della generazione, come ad un ripostiglio comune, per servire alla propagazione della specie.

118. *Sorgenti de' principali fenomeni della generazione, secondo il nuovo sistema. Origine del Feto.*

Il numero, il moto, e le proporzioni relative delle molecole organiche sono la principale sorgente delle diverse varietà, o de' diversi fenomeni, che somministra la generazione. Nell'unione de' sessi, se le molecole, che ci somministra il maschio sorpassano in numero, ed in attività quelle, che dà la femmina, l'embrione, che ne proviene è un maschio, e così reciprocamente. Quindi la simiglianza più, o meno espressa de' figliuoli al Padre, o alla Madre. Quindi i rapporti più, o meno vicini de' bastardi agl'individui, che sono concorsi alla loro formazione. Se nasce un sedicesimo più di maschi, che di femmine, ciò accade, perchè le femmine essendo comunemente più piccole, più deboli, e mangiando meno che i maschi, le molecole organiche, ch'esse somministrano sono in minor numero.

119. *Perchè i piccoli animali sieno più fecondi, che i grandi, i Pesci di scaglia, che gli animali pelosi.*

I grandi animali sono meno fecondi, che i piccoli; la *Balena*, e l'*Elefante* ec. sono meno fecondi dell'*Aringa*, del *Topo* ec. La ragione apparentemente si è, perchè vi bisogna maggior pascolo per mantenere un corpo grande, che per nutrirne un piccolo;

lo; e perchè, salva proporzione, avvi ne' grandi animali molto meno di nutrimento superfluo, che possa divenire seme, che non è ne' piccoli animali. Questi sono dotati di organi più fini, e così estraggono minori particole *brute*, e più particole organiche. L'*Ape*, che non si nutrisce, se non del sugo più delicato de' fiori, toglie più particole organiche, che il *Cavallo*, che si nutrisce dell'erbe più grossolane. I *Pesci* coperti di *scaglia* moltiplicano incomparabilmente più, che i *Quadrupedi* coperti di *pelo*. Questo viene forse, perchè le *scaglie* sminuiscono più, che i *peli* l'evacuazione, che si fa de' sughi nutritivi per la traspirazione; e perchè la soprabbondanza delle molecole organiche, che n' è una conseguenza, favorisce la moltiplicazione.

120. *Osservazioni sopra questo particolare, del sistema del Sig. de Buffon.*

Questi sono i principali tratti, co' quali mi sono sforzato di caratterizzare il nuovo sistema sopra la generazione. Ma già sento, che questo punto di veduta non gli è favorevole. Questi diversi tratti non formano un tutto molto collegato; nè molto armonico, nè così facile a concepirsi. Io prego dunque que' miei lettori, che vorranno farsene un'idea più giusta, a consultare l'opera medesima. E' saranno bene compensati dalla lunghezza di tal lettura per la leggiadria dello stile, e per le molte cose interessanti, che vi si trovano sparse.

121. *Conseguenze generali di questo sistema.*

Dall'esposto di questo sistema si vede, che i corpi organizzati non esistono originalmente in piccolo incerti germi; ma che sono formati dalla unione di un numero determinato di *particole organiche, viventi attive, indestruttibili*. Queste particole non sono in se medesime nè *vegetabili*, nè *animali*; ma elle sono atte a comporre de' *vegetabili*, e degli *animali*. Esse sono i materiali destinati alla costruzione di questi

diversi edifizj. La mano invisibile, che mette questi materiali in opera, è una forza segreta, che, come quella della gravità, penetra le masse, ma non agisce punto per *impulsione*, come le forze meccaniche. Secondo i luoghi, e le circostanze, nelle quali questa forza esercita la sua azione, ella produce esseri differenti; nella *matrice*, ell'è un *embrione*; negl'*intestini*, ell'è un *tenia*; nella *pelle* di un *polipo*, ell'è un *polipo*; nella *scorza* di un *albero*, ell'è un *ramo*, ed un albero in piccolo. Le stesse particole organiche, che formano l'essere organizzato somministrano la sua *nutrizione*, ed il suo *aumento*. Portate a tutte le sue parti elle vi si distribuiscono, e vi si modellano in una maniera relativa alla forma di queste medesime parti. Divenute soprabbondanti, e mandate agli organi della generazione, come ad un serbatojo generale, queste particole vi conservano un'attitudine a rappresentare in piccolo le parti, dalle quali provengono. Ma questa rappresentazione non può farsi, se non quando le particole organiche si trovano collocate in un luogo convenevole, e questo luogo è la *matrice*. Quivi le particole destinate a formare gli organi proprij dell'uno de' sessi sono le prime ad unirsi; questi organi sono, per così dire, il centro, o la base di tutto l'edifizio. L'altre particole destinate a rappresentare le parti comuni a' due sessi, vengono in conseguenza a distribuirsi secondo i loro *rapporti*, e secondo la forza, che in loro agisce. Tal'è generalmente l'origine di tutti i corpi organizzati. La loro decomposizione ci lascia concepire gli elementi organici, che li compongono. Essi manifestansi nelle *infusioni* sotto la forma di *globetti mobili*, la cui grandezza sminuisce a misura, che la decomposizione cresce.

CAPITOLO VIII.

Esame del nuovo sistema; comparazione di questo sistema con quello de' Germi.

122. *Principali sorgenti delle obbiezioni, che si possono fare contro il sistema delle molecole organiche.*

MOLTE sarebbero le riflessioni da farsi intorno a questo sistema. Le particole organiche viventi, attive, comuni a' vegetabili, ed agli animali, e che pure non sono nè vegetabile, nè animale; una forza, che nulla ha di simile all'*impulsione*; un modello esteriore, ed interiore, dove le particole organiche vengono a modellarfi, e donde sono tramandate ad un ripostiglio comune, per rappresentare in seguito questo modello in piccolo; rapporti in virtù de' quali queste particole si uniscono per fare un tutto organico; tutte queste sono certe supposizioni, alle quali non è tanto facile il familiarizzarsi. Contuttociò io non insisterò più su questo; poichè son queste peravventura piuttosto difficoltà, che vere obbiezioni. Mi contenterò di richiamare alla mente de' miei leggitori lo stupendo apparato di *fibre*, di *membrane*, di *vasi*, di *ligamenti*, di *tendini*, di *muscoli*, di *nervi*, di *vene*, di *arterie ec.* che entrano nella composizione del corpo di un animale. Li pregherò di considerare attentamente la struttura, i rapporti, e l'azione di tutte le parti. Io domanderò loro in seguito, s'essi concepiscono, che un tutto così composto, possa essere formato per lo semplice concorso di molecole mutate, o dirette, secondo certe leggi a noi sconosciute. Li pregherò a volermi dire, s'essi non provino la difficoltà, nella quale siamo di ammettere; che questa macchina maravigliosa è stata da principio disegnata in piccolo dalla medesima

mano, che ha steso il piano dell'universo. Per me io confesso ingenuamente, ch'io non ho mai creduto, che la cosa possa essere altramente. Allorchè ho voluto tentare di formare un corpo organizzato senza il soccorso di un germe primitivo, io mi son trovato sempre sì malcontento degli sforzi di mia immaginazione, che ho benissimo compreso, essere l'intrapresa una cosa assolutamente superiore alle sue forze.

123. *Comparazione abbreviata del nuovo sistema col sistema degli Antichi, e con quello delle nature plastiche.*

Gli Antichi, che esser non poteano tanto buoni Filosofi, quanto noi, credeano, che gl'insetti nascessero dalla corruzione. Essi supponevano, che le molecole della carne putrida di un Toro, odì un' Asino, venendo ad unirsi insieme producessero un Ape, uno scarafaggio ec. Noi ci siamo assai burlati di questa Fisica; ma che cosa le manca frattanto per parere meno grossolana? Una forma più sistematica. Bisognava organizzare queste molecole, renderle viventi, ed attive; bisognava farle andare con regola, e con certe leggi. Alcuni Filosofi più illuminati, e più profondi hanno aggiunta alla materia un' anima, o una virtù plastica, incaricata d'organizzarla. Hanno creduto, che i vermi del corpo umano, e quelli, che hanno trovati nell'interno delle piante, fossero dovuti a questa virtù. Onde questi Filosofi erano molto vicini alla forza produttrice del nuovo sistema.

124. *Obbiezioni contro il sistema delle molecole organiche.*

Ma se si volesse penetrare più a fondo il nuovo sistema, si potrebbe domandare, Primo. Come le particole organiche supposte *inalterabili*, possano essere *modellate*? Secondo. Come queste particole essendo tramandate da tutte le parti, che hanno acquistato il loro perfetto accrescimento, e che non vi sono state mai ammesse, vi abbiano contuttociò pre-

prese delle forme proprie a rappresentare in piccolo queste stesse parti? Terzo. Come gl'individui, che nascono dalla congiunzione di altri due individui di specie, o di forme essenzialmente diverse, abbiano organi, che non si trovano nè nel Padre, nè nella Madre? Tal'è per esempio, il caso de' *bastardi tralle api*. Quarto. Come un maschio, o una femmina, o tutti e due insieme, mutilati in qualche parte essenziale, ed unica, generino animali, a' quali nulla manca?

125. *Risutazione delle conseguenze, che i Partigiani dell' Epigenesi traggono dalle osservazioni del Malpighi sopra il Pollastro e di quelle d' Arvejo sopra le Cerve.*

Mi si opporranno senza dubbio le osservazioni intorno all' ingrandimento del *Pulcino* dentro l'uovo, e quelle sopra la generazione delle *Cerve*, per le quali parrebbe, che le parti di un corpo organizzato sieno formate l'une dopo l'altre. Nel *Pulcino* per esempio, osservato nel corso del primo giorno dell' *incubazione*, il cuore sembra esteriore al corpo dell'animale, e di una forma assai diversa da quella, che avrà poi. Ma la fievolezza di tale obbiezione si fa ben sentire agevolmente. Si vuol giudicare del tempo, nel quale le parti di un corpo organizzato hanno incominciato ad esistere, colla misura di quello, in cui hanno principiato a divenir sensibili. Non si considera punto, che la quiete, la piccolezza, e la trasparenza di alcuna di tali parti possono renderle invisibili, quantunque elle realmente esistano.

126. *Che il nuovo sistema è ingegnoso, ma meno probabile di quello de' Germi.*

Del resto io accordo, che non si riguardi il nuovo sistema sopra la generazione, come assurdo. Le vie della natura mi sono troppo poco conosciute, per ardire di pronunciare sopra i mezzi, ch'ella ha giudicati a proposito di scerre. Io trovo questo siste-

ma ingegnoso; ma sembrami soltanto, che l'altro, che stabilisce, che i corpi organizzati sieno esistiti originalmente in piccolo ne' germi, e che la *generazione* altro non sia, se non che il principio dello sviluppo di questi germi sia un sistema più probabile, più facile a intendersi, e soggetto a minori difficoltà, o inconvenienti.

127. *Osservazioni sopra l'Incastro; maniera di giudicare della sua possibilità.*

Io mi sono già spiegato; nè prenderò partito tra l'ipotesi, che spande i germi da per tutto, e quella che gl'incastra gli uni dentro gli altri. Queste due ipotesi hanno ciascuna la loro probabilità; ma non bisogna supporre un incastramento in infinito, perchè ciò sarebbe assurdo. La divisibilità della materia in infinito, colla quale si pretenderebbe sostenere questo incastro, è una verità geometrica, e un error fisico. Ogni corpo è necessariamente finito; tutte le sue parti sono necessariamente determinate; ma questa determinazione ci è sconosciuta. Noi ignoriamo assolutamente quali sieno gli ultimi termini della divisione della materia; e questa stessa ignoranza dee impedirci il riguardare come impossibile l'inviluppamento de' germi l'uno dentro l'altro. Noi abbiamo solamente ad aprir gli occhi, ed a girare i nostri sguardi intorno a noi, per vedere, che la materia è stata prodigiosamente divisa. La scala degli esseri corporali è la scala di questa divisione. Quante gran volte la *polvere della muffa* è contenuta nel *cedro*, il *tarlo* nell'*Elefante*, la *Pulce d'acqua* nella *Balena*, un *grano di sabbia* nel globo della Terra, un globetto di luce nel Sole? si prova, che un'oncia d'*Oro* può essere tanto suddivisa per arte umana, che formi un filo di 80. e fino a 100. leghe di lunghezza; ci si scoprono col microscopio degli animali, de' quali più migliaia insieme non agguagliano la grossezza del più piccolo grano di polvere; si son fatte cento osserva-

zioni del medesimo genere, e poi si tratterà d'assurdo la teoria degl'inviluppi? V'è anche di più, che si osserva, per così dire, a occhio questo invilupamento. Si scopre in una cipolla di *giacinto* fino alla quarta generazione; e ciò che v'ha di assai rimarchevole, si è, che le parti del fiore, son quelle, che si distinguono meglio nella terza, e nella quarta generazione; ed il volume di queste parti pare incomparabilmente più grande di quello di tutte l'altre prese insieme. Noi giudichiamo della materia unicamente per le relazioni più, o meno prossime, che ha col nostro corpo. Schifiamo di servirci di questa misura. Uomini, il cui taglio non eccedesse quello di quegli animalletti, che nuotano nelle infusioni, concepirebbono peravventura più facilmente che noi l'incastro, ch'è in quistione; poichè e' farebbono più vicini a questa regione degl'infinitamente piccoli.

128. *I tutti organizzati, considerati nell'ipotesi dell'Incastramento.*

Per me amo meglio il tener dietro il più, che per me si possa, a' confini della creazione. Mi piace il considerare questo magnifico seguito di esseri organizzati, contenuti come tanti piccoli mondi, gli uni dentro gl'altri. Li veggio allontanarsi da me a gradi a gradi, impiccolirsi secondo certe proporzioni, e finalmente perdersi in una notte impenetrabile. Io gusto una segreta soddisfazione nel contemplare in una *Ghianda* il germe, donde nascerà, a capo di qualche secolo, la *Quercia* maestosa, all'ombra della quale gli uccelli dell'aria, e le bestie del campo anderanno a sollazzarsi. Ho anche più di piacere nello scoprire nel seno d'Emilia il germe dell'Eroe, che fonderà dopo alcune migliaia d'anni un grande Impero, o sivero quello di un Filosofo, che scoprirà allora al Mondo la cagione della *gravità*, il mistero della generazione, e la meccanica del nostro essere.

129. *I tutti organizzati , considerati nell' ipotesi della disseminazione .*

L'ipotesi de' Germi sparsi per tutte le parti della natura , non mi offerisce uno spettacolo meno interessante , benchè di un gusto affatto diverso . Ciascun corpo organizzato mi si presenta sotto l'immagine di una piccola terra , dove io concepisco in compendio tutte le spezie delle piante , e degli animali , che si offeriscono in grande sulla superficie del nostro Globo . Una *Quercia* mi pare composta di *piante* , d'*insetti* , di *conchiglie* , di *rettili* , di *pesci* , d'*uccelli* , di *quadrupedi* , ed anche d'*uomini* . Io veggio ascendere dalle radici della *Quercia* , insieme co' luoghi destinati al suo nudrimento , delle legioni innumerabili di germi . Li veggio circolare ne' diversi vasi , e quindi fermarsi nella densità delle loro membrane per aumentarle per tutti i versi . Gli osservo disporsi gli uni accanto gli altri , o intralciarsi gli uni con gli altri , e formare così de' piccoli edifizj , che richiamano alla mia mente quegli strani monumenti che altre volte furono innalzati dalla superstizione Americana in onore de' suoi Dei , e che non erano costrutti , se non se di teste d'animali da essa loro sacrificati . I venti , le piogge , il calore , il freddo ec. venendo a percuotere di mano in mano sulla *Quercia* , trionfano finalmente della sua forza , e del suo vigore : veggio crollare il bastimento , e ridursi in un mucchio di polvere . I piccioli esseri organici , che entrano nella sua composizione , superiori a tutti questi affalti , son posti allora in libertà , e si spandono per tutte le parti . Io continuo a seguirli , e li veggio rientrare ben tosto in altri composti organici , e successivamente diventare *mosche* , *lumache* , *serpente* , *carpio* , *pesce* , *orina* , *usignuolo* , *cavallo* , ec. Che dirò io ? L'aria , l'acqua , la terra non mi sembrano , che un ammasso di germi , ed un vasto tutto organico . Preso da stupore alla vista di questa perpetua

cir-

circolazione di germi , e di queste immense ricchezze , che sono state messe in serbo in tutti i corpi , io mi fo a contemplare con delizia questa maravigliosa economia. Veggio ammassarsi i secoli, gli uni sopra gli altri, accumularsi le generazioni come i flutti del mare, senza che il numero de'germi impiegati a perfezionarle, scemi sensibilmente la massa organica da essi composta. L'ultimo punto di vista, sotto il quale io vengo a rappresentare il sistema de' germi, parrebbe, che lo ravvicinasse assai al sistema delle *Molecole organiche*, s' io non avessi già difinito ciò , ch' io intendo per germi , e se non avessi indicata la maniera, con cui si può concepire, che entrino nella composizione de'corpi.

130. *Ricerche sopra la natura de' Globetti mobili. Illusioni, ed errori da temersi nelle osservazioni di sì fatti corpi. Vicissitudine delle opinioni umane; sforzi della ragione, e suoi sbagli.*

Ma che s'ha egli a pensare di que'globetti mobili, che si scoprono ne' liquori feminali, e nelle infusioni de'vegetabili, e degli animali d'ogni spezie? Non è facile la decisione di questa difficoltà. Ella dipende da una cognizione esatta della natura di taliglobetti; e questa cognizione noi non siamo così vicini ad acquistare. Posti in una distanza sì grande di questi piccoli corpi, provveduti di strumenti tanto imperfetti, come sono anche i nostri Microscopj, come attenderemo noi a qualche cosa di preciso su questo soggetto? Può quì cadere errore per molti versi; e le vie della verità non sono numerose. Moti più, o meno forti, più, o meno diversi, più o meno sostenuti dal fluido, nel quale nuotano questi globetti; una evaporazione più, o meno abbondante, più o meno accelerata di questo fluido; una decomposizione più o meno pronta, più o meno graduale delle particole; un' aria più o meno pura, più o meno attiva; un' illusione d' Ottica più, o meno difficile

a conoscersi, o a prevenirsi, e che fo io altro? Un fluido attivissimo, che penetrasse la materia seminale, o quella dell'infusione, ed i moti del quale fossero rappresentati per quelli de'globetti; tutto ciò potrebbe sedurci, e farci prendere per realtà l'apparenza. Que' primi che osservarono gli *animali spermatici* si persuasero bentosto della verità di loro esistenza, nè ebbero difficoltà di persuaderla anche a'curiosi. Ci hanno descritti i moti di questi animali come diversissimi, e del tutto spontanei. Ce gli hanno dipinti nuotanti nelle goccioline del liquore, come i pesci nell'Oceano. Ce gli hanno fatti vedere nel loro rapido corso in aria di scansarsi scambievolmente con destrezza, di rivoltarsi con ordine, e con precauzione, innalzarsi alla superficie del liquore, e di tuffarsi quindi con impeto nel loro seno. Ci hanno rappresentata la loro figura, come simile a quella de' *vermi*; ed hanno loro data una grossa testa, ed una lunga coda. Finalmente sono giunti sino a penetrare la spezie di metamorfosi, che dovrebbero subire questi vermi, per divenire individui tali, qual'è quello, nel liquore del quale vengono osservati. Ma in oggi tutti questi fatti sono sospetti, od equivoci, e l'edificio, ch'era stato eretto su questi fatti, egli è come un Palazzo incantato. Gli *animali spermatici* son divenuti semplici globetti, senza parte veruna distinta. La lunga coda, ch'è stata data a questi animali, non è altro, se non che l'avanzo di un inviluppo, da cui il globetto procura sbrigarfi, o un solco, ch'egli delinea nel liquore, per l'empito del suo moto. Finalmente questi globetti non deono soffrire alcuna metamorfosi; ma possono unirsi senza certi rapporti, e così formare diverse spezie di corpi organizzati. Questa è la vicissitudine delle opinioni degli uomini. Queste le rivoluzioni delle conghietture, e de' sistemi. Che spettacolo curioso, ed istruttivo! Che memorie interessanti per l'istoria dello spirito umano!

no! Avida la ragione di conoscere, si sforza di penetrare sino all'origine delle cose. Ella vede de' fatti; ella gli studia; ella sa farne nascere de' nuovi, ma la cagione di questi fatti è a lei tuttora sconosciuta, e questa cagione occulta è ciò, che picca più che mai la sua curiosità. Inquieta, ardente, attiva, non può fermarsi ne' semplici effetti. Ella vuole vedere più oltre. Ella si volge per tutte le parti, si agita, si commove, passa, e ripassa più volte davanti al medesimo oggetto. L'ago calamitato non si ferma, finchè non abbia riscontrato il polo; ma l'ago stesso calamitato spesso volte declina; e quante volte declina altresì la ragione nella ricerca del vero? Guardiamo però, di non tormentarla troppo ne' suoi movimenti. La sua attività potrebbe riceverne degli attacchi molesti. E' meglio, che la ragione qualche volta s'inganni nel ricercare il vero, che se ella fosse meno ardente nel ricercarlo. Non rinunziamo dunque allo spirito di sistema; coltiviamolo anzi, sino a un certo segno. Questo è bene spesso un ottimo occhiale, che ci ajuta a scoprire oggetti assai lontani. Mai vetri di questi occhiali sono talora difettosi, o mal disposti; poichè gli uni accrescono prodigiosamente la grandezza degli oggetti; altri la sminuiscono eccessivamente. Gli uni cangiano le figure, altri alterano i colori, altri mutano la situazione; e ve ne sono finalmente di quelli, che moltiplicano il numero degli oggetti. Voi, Ottici, vi conoscete per mezzo de' vetri. E voi, o Filosofi, perchè non correggete l'illusione? I globetti, de' quali si parla potrebbero bene non essere animali. Imperocchè si sa, che vi sono molte materie, le cui particole consistenti mostrano una figura sferica. Si conoscono i globetti degli *stami*; si conoscono anche quelli del *sangue*, e quelli del *grasso*. I globetti de' liquori seminali, e quelli delle infusioni sono forse del medesimo genere, o di un genere analogo. I moti intestini del

liquore , uniti ad altre cagioni , da me indicate nell'articolo precedente , posson dare a questi globetti un'aria di vita; e se questi globetti scemano di mano in mano di grossezza, aumentando di numero, egli è, perchè la decomposizione della materia cresce ad ogni stante. Se esistesse nella natura un fluido organico, un fluido destinato ad operare la nutrizione , e lo sviluppamento de'corpi organizzati; se l'azione de'vasi si limitasse principalmente ad estrarre questo fluido dalle materie alimentizie, quasi come lo strofinamento estrae la materia dell'*elettricità* da'corpi *elettrici*, potrebbe supporfi , che i globetti, di cui parliamo , fossero le parti costituenti di questo fluido, di cui la porzione più sottile, o più agile componesse i liquori seminali. Potrebbe anche conghietturarsi, che visia una forte attrazione tra questo fluido, e le diverse specie de'corpi organizzati. Una simigliante attrazione potrebbe però essere ammessa anche tra'germi , e tra questi ed i corpi organizzati. In tale supposizione i globetti, de'quali noi ricerchiamo la natura , non farebbono se non una commettitura di germi legati gli uni agli altri , cui un fluido attivissimo tenderebbe continuamente a disunire. Quindi si avrebbe la diminuzione graduale delle piccole masse ch'essi compongono.

131. *Vista del mondo fisico nella supposizione, che i globetti mobili sieno veri animali.*

Ma se questi globetti sono veri animali, come può ragionevolmente conghietturarsi, qual magnificenza nel piano della creazione terrestre! qual grandezza! qual profusione! qual compiacenza nell'organizzare la materia, e nel moltiplicare gli esseri sensibili! Noi veggiamo gli animali sparsi sopra tutta la superficie della Terra, in tutta l'estensione delle acque, e fino nel vasto contorno dell'Atmosfera. La nostra memoria resta oppressa da'nomi di tutte le specie conosciu-

sciute ; la nostra immaginazione è sgomentata alla vista del numero innumerabile degl'individui , che forniscono certe spezie d'insetti , o di pesci . Pure , (come il *fosterremo* ?) ciò non è realmente , che una piccola parte ; ma che dico io ? non è , che un infinitamente piccolo del Regno animale . Il *tarlo* , come l'*Elefante* , il *Tonchio* , come lo *Struzzo* , il *Verme* dell'aceto come la *Balena* , non sono che un composto d'animali ; tutti i loro liquori ne brullicano ; tutti i loro vasi ne sono seminati . Ma ciò non è ancor tutto . I vegetabili medesimi , e sino alle loro parti più piccole non sono che un composto di animali . Dal *Fungo* sino all'*Olmo* ; dal *Muschio* sino all'*Abeze* ; dalla *Canna* sino alla *Quercia* , tutto è pieno di animalletti , e di esseri sensibili . Quindi è , che il Supremo Architetto ha portata l'opera sua sino al più alto grado di perfezione ch'ella potesse ricevere . La sua sapienza ha rivestita la materia di un numero pressochè infinito di *modificazioni* , delle quali il *mondo fisico* n'è la somma . Tralle modificazioni , che noi osserviamo quì giù , la principale , la più composta , la più perfetta , e quella , a cui tutte l'altre si rapportano , è l'*organizzazione* . Ma tralle diverse spezie di organizzazioni , quella , da cui risulta l'*animale* , tiene il primo luogo . Ella è dunque il genere delle modificazioni , che è stato il più moltiplicato , o il più diversificato ; l'*animale* è il vincolo , il centro , ed il fine di tutte le parti della natura .

132. *Conghietture , e riflessioni sopra la natura di questi animalletti . Osservazioni sopra le nostre idee della economia animale .*

Ma se i globetti de' liquori seminali , e quelli delle infusioni son veri animali , qual è la loro natura ? qual è la loro maniera di nascere , di nutrirsi , di crescere , di moltiplicare ? Io farò una osservazione generale sopra tutte queste quistioni . Le nostre idee
dell'

dell'economia animale si sono subito da principio assai ristrette; nè si sono estese, se non lentamente, e per gradi, come tutte l'altre nostre cognizioni. Avanti che fosse stata osservata la moltiplicazione degli Insetti per *incisione*, e quella senza accoppiamento, si dicea, che l'animale si propagava per mezzo degli uovi, o di piccoli viventi, e che questo era sempre preceduto dal concorso di due individui di diversi sessi. Questa divisione di animali farebbe ora difettosissima, poichè lascerebbe indietro un grandissimo numero di spezie, che appartengono incontrastabilmente a questa classe di esseri organizzati. Impariamo dunque da ciò a non limitare la natura, ed a concepire idee più alte di sua immensa varietà. Il *polipo* è forse meno lontano dalla *scimia*, che non è dagli animali che noi cerchiamo di conoscere. In una parola noi non sappiamo ove cominci l'animale; ma sappiamo solamente dove finisce, e che l'uomo è il termine più sollevato di questa magnifica gradazione. Chi potrebbe provare, non esservi degli animali che si nutrissero per tutti i versi del loro corpo, come a un dipresso si crede farsi la nutrizione de' *cristallini*? Chi potrebbe assicurare, che non esistessero animali di una piccolezza quasi infinita, di figura sferica o ellittica, senz'alcun membro, senz'alcuna parte esteriore, i di cui sensi tutti interiori si limitano unicamente a scoprire ciò, che passa al di dentro dell'animale, e niente affatto a ciò ch'è di fuori? Chi potrebbe dimostrare, che questi animali non gustassero tanto piacere nel sentire ciò, che passa nel loro interno quanto ne provano gli altri animali nel vedere quello, che passa dintorno a loro? Chi sa, se il semplice moto de' liquori, al quale è stata attaccata la vita di questi animaletti, non procuri loro delle sensazioni così vive, come son quelle, che procura agli altri animali l'impressione degli oggetti esteriori?

133. *Gli animalletti de' liquori ec. paragonati ai Polipi.*

Preferiamo frattanto quelle conghietture , che hanno qualche fondamento nell'osservazione , o nella esperienza. Paragoniamo gli animalletti , che sono in quistione , a' *Polipi* , ed agli altri insetti , che si moltiplicano per *incisione* . Diciamo , ch'è s' *innestino* naturalmente gli uni con gli altri , e che formino così de' globetti più , o meno sensibili , e forse anche de' filamenti più , o meno considerabili . Supponiamo ancora , ch'essi si propaghino , o per una naturale divisione , simile , o analoga a quella de' *Polipi fatti a mazzi* (1) , ovvero rompendosi , o dividendosi con un'estrema facilità , come le piccole *anguille* d'acqua dolce (2) . Noi spiegheremo così , molto felicemente i principali fenomeni , che ci offeriscono i globetti , in particolare quello della loro diminuzione di grossezza , e della loro aumentazione di numero .

Noi possiamo ancora conghietturare , che questi piccoli animali dimagrino , o si riserrino , allorchè sono esposti per qualche tempo all'aria , o che il liquore , nel quale nuotano , incomincia ad alterarsi . Finalmente questi animali si muovono , ed i loro moti sono varj , e rapidissimi . Or come eseguiscono egliino tutti questi moti ? Noi veggiamo a buon conto , che i moti , co' quali s'innalzano , o si tuffano nel liquore , possono dipendere principalmente dalla aumentazione , o dalla diminuzione del volume del loro corpo , come a un dipresso ne' pesci . Riguardo poi agli altri moti , questi appartengono senza dubbio ad una meccanica interiore , che ci è sconosciuta . Può essere ancora , che si facciano per
via

(1) *Memorie sopra i Polipi fatti a mazzetti* , del Sig. Trembley . 1747 .

(2) *Trattato dell' Insetologia* , Seconda Parte .

via di organi esterni, cui l'estrema loro piccolezza non ci permetta distinguere.

134. *Quel che possa credersi divenire gli animaletti dello sperma, dappoichè questo è stato riassorbito.*

Il liquore femminile dopo essere stato più, o meno ne' vasi che lo contenevano è riassorbito da altri vasi che lo portano a diverse parti, colle quali s'incorpora. Or che divengon eglino allora gli animaletti, di cui questo liquore è popolato? Io rispondo; non essere assurdo l'ammettere, che questi animali continuino ad esistere anche in quel nuovo stato. Essi rassomiglieranno alla *Galinfetta*, che dopo aver corso per qualche tempo per ogni banda, si fissa sopra un tronco, o sopra un ramo, dove passa il restante della vita sua nella più perfetta immobilità, e tanto bene confusa colla pianta stessa che si prenderebbe per una *Galla*, o per un'escrescenza di questa pianta (1). Perchè rinunzieremo noi al piacere di prolungare l'esistenza degli esseri sensibili? Gli animaletti de' quali ragioniamo, incollati alle pareti di un vaso sieroso, o sanguigno, vi godranno di tutte le dolcezze congiunte con questa loro esistenza. Essi vi rappresenteranno le *Ortiche del Mare* fissate allo scoglio di uno stretto.

135. *Di ciò, che debba pensarsi dell'apparenza degli animaletti nelle materie bollite. Nota importante, od estratti di lettere del Sig. de Reaumur, che portano, che i globetti mobili sono veri animali.*

Riguardo all'apparenza di questi animaletti nelle materie, che hanno bollito, o che sono state esposte a un grado di calore, al quale non concepiamo, che nessuno animale possa vivere, la difficoltà, che forma questa apparenza, non ci dee per molto imbarazzare, poichè non ha altro fondamento, che
l'igno-

(1) *Memorie per servire all'istoria degl'Insetti.* Tom. 3. Mem. prima.

l'ignoranza, nella quale siamo del grado di calore, che certi animali sono capaci di sopportare. Dall'altro canto non è certo e sicuro, che sì fatti animali fossero nella materia dell'infusione. Forse abitavano l'aria racchiusa nel boccale e sono da quest'aria passati nella materia dell'infusione. Forse vi ha una circolazione perpetua di questi animali dell'aria ne' corpi organizzati, e da' corpi organizzati nell'aria (1).

136. *Spiegazione del Mulo nell'ipotesi dell'Autore, supponendo, che il germe sia somministrato dal maschio.*

Se si paragona il sistema de' germi con quello delle

(1) Dappoichè ho scritto questo, il Sig. Trembley mi ha comunicata una lettera, ch'ei avea ricevuta dal Sig. de Reaumur, che non permette punto il dubitare, che i *globetti mobili* non sieno veri animali. Ecco l'estratto di questa lettera.

Il mio oggetto era di verificare l'osservazioni, che sono state il fondamento d'idee sì strane sopra la generazione degli animali. Ho molto studiate le diverse infusioni, ed ho riconosciuto non solamente, che queste pretese particole organiche sono veri animali: ma ancora che questi piccoli animali sono ordini di generazioni consimili, che si succedono; che è falsissimo, che le generazioni sieno d'animali sempre di minori in minori, come l'anno avanzato gli Autori del nuovo sistema; che tutto va quì all'ordinaria; che i piccoli divengono grandi secondo il loro ordine.

In una delle sue Lettere il Sig. de Reaumur mi suggerisce così: *Che egli avea ripetute le sue osservazioni sopra gl'insetti dell'infusioni, che le avea esaminare colla maggior diligenza per dell'ore intere, e che avea riconosciuto ciò, che ne avea imposto a coloro, che gli hanno presi per semplici globetti mobili.*

Sarebbe da desiderare, che l'Illustre Autore dell'*Istoria naturale, generale, e particolare* intraprendesse a rifare le sue proprie osservazioni, ed a penetrare di più questa materia interessante. Egli ha tanta sagacità, che strana cosa sarebbe, che gli sfuggisse dagli occhi il vero. Ma certo, che non gli sfuggirà, se vuole obbliare, almeno a tempo, le sue *Molecole organiche*, i suoi *Modelli*, e tutto l'arredo di un sistema, che al suo genio secondo è piaciuto l'inventare, e che forse un giorno farà dalla sua ragione, divenuta severa, abbandonato.

le *molecole organiche*, io credo, che ognuno si sentirà più portato ad abbracciare il primo, che il secondo. Ma credo altresì, che si troverà, essere anche quello soggetto a gran difficoltà, cui non ho io disciolte in un modo soddisfacente. Voglio dire principalmente di quelle, che si tirano della generazione del *Mulo*, o di quell'animale, che nasce dall'accoppiamento di un *asino* con una *cavalla*. Nella spiegazione, ch'io ho arrischiata di questo fatto (1) ho supposto, che il germe si contenesse nella femmina; e che il liquore femminile del maschio contenesse gli elementi relativi alle diverse parti di questo germe, ed atti a operarne la nutrizione, e lo sviluppo. Ho pensato, che il *cavallo* disegnato in miniatura nell'ovaje della cavalla, venisse trasformato in mulo per l'impressione più, o meno forte del liquore dell'*asino* sopra alcune delle sue parti. Ho conghietturato, che le molecole elementari destinate a procurare la nutrizione, e lo sviluppo delle orecchie, fossero più abbondanti, e più attive nel seme dell'*asino*, che non sono in quello del *cavallo*; e che le Molecole destinate a procurare la nutrizione, e lo sviluppo della coda, fossero al contrario più abbondanti, e più attive nel seme del *cavallo*, che in quelle dell'*asino*. Quindi ho tentato di render ragione delle lunghe orecchie del *mulo*, e della sua coda poco fornita di crini. Mi sono limitato a questi due caratteri, che m'hanno servito di esempi. Ma se si considera il *mulo* con attenzione, c'arrà essere piuttosto un *asino* in grande, che un Cavallo viziato. La sua testa, il suo collo, il corso, la groppa, le gambe sembreranno accostarsi più assai all'*asino*, che al *cavallo*. Non parrà, che abbia altro di questo, se non la grandezza, il colore, ed il pelo. Or non si concepisce troppo, in che maniera sì grandi cangiamenti,

co-

(1) Vedi il Cap. III. art. 40.

come son questi , de' quali si tratta ; abbiamo potuto essere prodotti per la semplice azione del fluido seminale . Bisogna convenire della difficoltà ; anzi ella riceverebbe senza dubbio un nuovo grado di forza , se si venisse ad un esame più profondo delle parti , e se si estendesse tal esame fino all' interno . Ma senza decidere frattanto intorno alla quistione , se i cangiamenti , di cui si parla , possano essere eseguiti per mezzo del liquore femminile , prendiamo l' inverso della prima supposizione . Invece di far somministrare il germe dalla femmina , facciamolo somministrare dal maschio . Tutto diverrà allora più facile . I caratteri , pe' quali il *mulo* si accosta più al *cavallo* , che all' *asino* , non attenendo punto alla forma delle parti essenziali , supporrebbero de' cangiamenti meno considerabili , meno difficili , di quelli , cui supporrebbero i caratteri , pe' quali il *mulo* s' accosta più all' *asino* , che al *cavallo* . La grandezza , il colore , ed il pelame son cose , che dipendono solamente da alcune circostanze , bene spesso assai leggiere . La matrice della *cavalla* più vasta , e più imbevuta de' sughi , che quella dell' *asina* , ha permesso al feto di stendersi più per tutti i versi , che fatto non avrebbe nella sua matrice naturale . La qualità del sangue , o del fluido nutritivo della madre , può agevolmente cangiare il colore , ed il pelame dell' embrione . Nella stessa guisa ragioniamo del *bastardo* , che nasce dell' unione del *gallo* coll' *anitra* femmina ; e le difficoltà , che ci hanno fatto tanta pena , si ridurranno principalmente ad alcuni cambiamenti nelle proporzioni esterne del corpo , e nella forma delle piume .

137. *Invito a fare delle nuove sperienze sopra gli animali bastardi , per ischiarire la materia della generazione .*

Noi siamo dunque più che mai sollecitati a fare delle nuove sperienze intorno alla generazione degli animali *bastardi* . Certamente elle son quelle , che

possono spandere più luce d'ogni altra cosa sopra questo soggetto. Stendiamole, se si può, a individui di generi, ed anche di classi diverse. Questo è il mezzo più sicuro di rendere i risultati decisivi, e di strappare dalla natura il suo segreto. Se dall'accoppiamento del *coniglio* colla *gallina* nascesse un *bastardo*, noi già ci saremmo assai avanzati.

138. *Osservazioni sopra gli effetti dell'accoppiamento tra individui di spezie molto distanti.*

Ma vi è luogo da credere, che di queste sorte di congiunzioni sia come di quegli innesti singolari, che si praticano tra spezie di diverse classi. Il lor ramo innestato gitta alcune foglie, e poi perisce. La grande sproporzione, che è tra i fughi, che riceve dal *soggetto*, e quelli, che gli convengono, e tra il tempo, in cui li riceve, e quello, in cui li richiede, sono la causa naturale della pronta sua morte. Se la mescolanza del liquore del *coniglio* con quello della *gallina* giugnasse a fare sviluppare il germe da quello somministrato, questo sviluppamento cesserebbe senza dubbio ben presto, e forse avantichè potessimo esser certi, che avesse incominciato. I fluidi alimentizj della *gallina* differiscono apparentemente troppo da quelli del *coniglio femmina* per condurre a bene una tal produzione. Di più, le matrici di questi due animali non differiscono meno senza dubbio de' loro fluidi.

139. *Che il numero delle spezie può essersi accresciuto da congiunzioni fortuite.*

Non si può dubitare, che le spezie, che esistevano al principio del mondo non fossero meno numerose di quelle, che esistono ora. Le diversità, e la moltitudine delle congiunzioni, e fors'anche la diversità de' climi, e de' nutrimenti, hanno fatto nascere delle nuove spezie, o de' nuovi individui intermedj. Questi individui essendosi altresì uniti tra loro, le mescolanze si sono moltiplicate, e nel mol-

tipli-

tiplicarsi son divenute meno sensibili. Il *pero* tralle *piante*, la *gallina* tra' *volatili*, il *cane* tra' *quadrupedi* ci danno esempli visibili di questa verità. E che non avremmo forse da dir nulla intorno a ciò delle varietà, che si osservano tra gli uomini, usciti originalmente da due individui?

140. *Riflessioni sopra la grandezza degli oggetti, che ci offerisce la materia della generazione.*

Io lascio al fine la materia della generazione (1); materia infinitamente interessante, e la cui bellezza, e ardisco anche dire la grandezza, potrà rendere scusabili i minuti racconti, ne' quali sono entrato, e l'arditezza delle conghietture, alle quali sono ricorso. La natura è certamente ammirabile nella conservazione degli individui; ma lo è sopra tutto nella conservazione delle specie. Tutti gli organi, de' quali ha provvisti gli esseri organizzati, tutte le proprietà, di cui gli ha dotati, tutte le facoltà, delle quali gli ha arricchiti, tendono per ultimo a questo gran fine. Le diverse maniere, onde le piante, e gli animali si perpetuano, sono le differenti macchine, che mantengono le brillanti decorazioni del mondo organico. I secoli si trasmettono gli uni agli altri questo magnifico spettacolo, e se lo trasmettono tale, quale l'hanno ricevuto. Niun cangiamento, niuna alterazione segue; ma tutto è un' identità perfetta. Vittoriose degli elementi, de' tempi, e del sepolcro, la specie si conservano, ed il termine della loro durata ci è sconosciuto.

CA-

(1) Questo scritto sopra la *generazione* faceva parte di un' Opera più grande. Vedi la Prefazione.

CAPITOLO IX.

Nuove scoperte sopra la formazione del Pulcino nell' uovo . Conseguenze di tali scoperte . Comparazione delle sperienze dell' Ervejo sopra la generazione delle Cerve , con quelle sopra la formazione del Pulcino .

141. *Introduzione . Scoperte del Signor De Haller sopra il Pulcino .*

T Ali erano , ha già intorno a dodici anni (1) , le mie meditazioni sopra la formazione de' corpi organizzati . Nulla ho cangiato dall' esposizione , che ne feci allora , e si va solo giudicando del loro accordo con delle nuove scoperte , delle quali non ho penetrato , se non la possibilità . Io dicea nel principio del Capitolo III. (2) che un giorno farebbesi strappato dalla natura il suo segreto . Uno de' suoi più cari favoriti , il Sig. De Haller l' ha interrogata dopo poco , come ella richiedeva di esserlo , ed ha ottenuto delle risposte , che ampliano i confini delle nostre cognizioni . Dall' interiore di un uovo di Gallina , ella gli ha renduti i suoi oracoli ; ed egli gli ha trasmessi alla posterità in un dotto scritto , che ha per titolo *Memorie sopra la formazione del cuore nel Pulcino , sopra il forame , sopra la struttura del giallo , e sopra lo sviluppamento* (3) L' illustre Autore ha posti dopo le sue osservazioni de' *Corollarj misti* (4) , che ne sono come i risultati . Io prenderò da questi Corollarj le verità le più

(1) Scrivevo ciò nel principio del Settembre del 1750.

(2) Vedi l' Art. 17.

(3) A Lusanna presso Michele Bousquet , in 12. Mem. I. II.

(4) Mem. II. pag. 172. e segg. Sez. XIII.

più importanti , e le più atte a sminuire l'ombra del mio soggetto.

142. *Primo fatto sopra il Pulcino , che dimostra , che il germe appartiene unicamente alla femmina . Conseguenza , che se ne può tirare riguardo al granello .*

Primo fatto . La membrana , che riveste interiormente il giallo dell'uovo , è una continuazione di quella , che ricopre l'intestino sottile del Pulcino . Ella è continuata collo stomaco , colla laringe , colla bocca , colla pelle , coll'epiderme . La membrana esterna del giallo è uno spandimento della membrana esterna dell'intestino ; ella è legata al mesenterio , ed al peritoneo . Il giallo ha dell'arterie , e delle vene mesenteriche del feto . Il sangue , che circola nel giallo riceve dal cuore il principio del suo movimento . Il giallo è dunque una parte essenziale del Pulcino : ma il giallo esiste nell'uovo , che non è stato fecondato ; dunque il Pulcino esiste nell'uovo prima della fecondazione . L'analogia , che si osserva tra i vegetabili , e gli animali , e della quale tratterò un giorno , non permette punto il dubitare , che non sia così delle granella , come dell'uovo ; cioè , che non contengano anch'esse tutte le parti essenziali della pianta .

143. *Secondo fatto . Stato di fluidità delle parti dell'embrione , allorchè incomincia a svilupparsi . Nuova prova dell'esistenza degli spiriti animali . Come tutte le parti acquistino appoco appoco della consistenza . Conformità co' vegetabili .*

Secondo fatto . Le parti solide del Pulcino da principio son fluide . Questo fluido appoco appoco si condensa , e diviene una gelatina . L'ossa medesime passano successivamente per questo stato di fluidità , e di gelatina . Il settimo giorno dell'incubazione , la cartilagine è ancora gelatinosa (1) . Il Cervello l'otta-

(1) Osservazioni del Sig. de Haller sopra l'ossa . Lusanna in 12. 1758. pag. 177. e 178.

vo giorno non è altro, che un'acqua trasparente, e senza dubbio organizzata. Contuttociò il feto governa già le sue membra; nuova prova, ed assai sensibile dell'esistenza degli spiriti animali; poichè come supporre delle corde elastiche in un'acqua trasparente? Gli elementi si accostano a formare i solidi, principalmente per l'evaporazione insensibile delle parti acquose. I vasi divenuti più larghi ammettono delle molecole gommose, albuminose, viscosi, che si attraggono di più. Quanto più cresce la prossimità degli elementi, tanto più di forze acquista l'attrazione. Il fluido organizzato è così condotto per gradi alla mucosità, e diviene membrana, cartilagine, osso per gradazioni impercettibili, senza mescolanza di alcuna parte novella. Il Sig. de Reaumur ha provato, che se si previene per mezzo d'incrostature l'evaporazione del superfluo, si conserva il feto nell'uovo, e si prolunga ad arbitrio la vita degli insetti. L'ho già notato di sopra, alla pagina 36. La medesima cosa si osserva nelle piante. Le loro parti lignose non mostrano da principio, se non una specie di mucosità; in seguito divengono erbacee, e finalmente acquistano appoco appoco la consistenza di legno.

144. *Terzo fatto. Per quali cagioni, e con qual ordine tutte le parti dell'embrione divengano visibili, d'invisibili, che erano per l'avanti. Osservazione sopra l'uovo della pecora.*

Terzo fatto. L'approssimazione graduale degli elementi, sminuisce di mano in mano la trasparenza delle parti; e questa è una delle cagioni, che ce le rende visibili d'invisibili ch'erano per l'innanzi. Alla fine del secondo giorno dell'incubazione si distingue benissimo il battimento del cuore. Gli accrescimenti del piccolo animale non sono mai tanto rapidi, quanto in questi primi giorni. Il cuore avea dunque spinto il sangue prima, che si potesse essere conosciuto. La trasparenza del viscere lo involava alla vista, ed

era

era troppo debole per innalzare l'amnio. Solamente il sesto giorno il polmone è visibile. Allora egli ha dieci centesimi di pollice di lunghezza. Con quattro di questi centesimi sarebbe stato visibile, se non fosse stato trasparente. Il fegato è anche più grande allorchè incomincia ad apparire. Se dunque non è visibile più presto, egli è unicamente a cagione della sua trasparenza. Dalla trasparenza mucosa alla bianchezza non v'è, che un grado, e la semplice evaporazione basta per produrlo. Nell'animale vivo il grasso è diafano, il contatto dell'aria lo densa, e lo rende bianco. Il bianco è dunque il primo colore dell'animale; e la trasparenza mucosa pare, che costituisca il suo primo stato. L'esperienza numerose dell'Autore sopra i quadrupedi, e sopra gli uccelli, contestano queste verità. Durante i primi giorni, che seguono la fecondazione, l'uovo di una pecora pare non racchiudere, che una specie di linfa. Egli è ancora gelatinoso il diciassettesimo giorno. Dopo questo termine si distingue assai bene il feto invilupato nelle sue membrane. La sua lunghezza è intorno a tre linee. Egli ha dunque fatto un accrescimento considerabile sotto la forma di fluido, e consecutivamente sotto quella di gelatina; ma la sua trasparenza non permetteva di conoscerlo (1).

145. *Quarto fatto. Nascita de' colori, e de' sapori. Osservazione sopra un passo del Sig. De Haller intorno alla cagione de' colori ne' vegetabili.*

Quarto fatto. I vasi dilatati sempre più per l'impulsione del cuore ammettono delle particelle più grosse, più eterogenee, e perciò anche più colorite, che le particole diafane. Di quì i varj colori, che ornano successivamente l'animale. Il calore naturale,

(1) Sig. De Haller Ist. dell'Accad. Reale delle Scienze, An. 1753. pag. 134. 135. in 4.

rale, e quello del clima sembrano anch'essi contri-
buirvi. Il nostro Autore dice in questa occasione ,
che *ne' vegetabili, solamente il calore è quello che gli
colora* (1). Ma mi pare, che le mie sperienze sopra
lo *smagrimento* provino, che questa colorazione dipen-
de meno dal calore, che dalla luce. Io rimando in-
torno a questo agli Articoli 79. e 113. del mio libro
sopra *l'uso delle foglie nelle piante*. I colori precedo-
no i sapori. La bile è verde prima di essere amara.
Le fibre della vista hanno più di sensibilità, che
quelle del gusto; ovvero le particole, che toccano
il gusto, differiscono da quelle, che toccano la vi-
sta, e si sviluppano più tardi.

146. *Quinto fatto. Che le parti dell'embrione si
rivestono successivamente di nuove forme, e di nuove posi-
ture, che aiutano coll' opacità a farle conoscere. Ordine
di questi cangiamenti, e loro cagioni meccaniche. Che il
Pulcino è originalmente un animale a due corpi, e come.*

Quinto fatto. A misura, che l'embrione si svilup-
pa, le sue parti si rivestono di nuove forme, e di
nuove situazioni, e questi cangiamenti concorrono
coll' opacità a far vedere ciascuna parte. Il primo
giorno il feto rassembra quasi un girino. La sua testa
è grossa, e la spina dorsale, ch'è molto gracile, pa-
re comporgli una piccola coda, o una corta appendi-
ce. Escono finalmente da questa piccola coda e da
questo filo quasi invisibile delle membra, e delle
viscere, e la testa ne diviene all'opposito un' appen-
dice. Durante il primo giorno dell' incubazione gl'
intestini del Pulcino sono invisibili; ma allora e' so-
no provveduti di un' enorme appendice, che si affo-
miglia al piccolo animale per mezzo di un canale di
comunicazione. Il giallo è quest' appendice, situata
così fuori del corpo del Pulcino. Al fine dell' incu-
ba-

bazione, e sopra tutto dopo la nascita, tutto quì comparisce sotto una nuova faccia. Gl'intestini divenuti grandi, il canale di comunicazione scancellato, il giallo sparito, che non v'è più nulla di fuori del corpo del Pulcino, che a lui appartenga. Così il giallo, e gl'intestini stanno all'esterno del Pulcino quasi fino al fine dell'incubazione; da questi primi tempi dunque il Pulcino pare un animale a due corpi. La testa, il tronco, e l'estremità compongono l'uno di questi corpi; il giallo, e le sue dipendenze ne compongono l'altro. Ma alla fine dell'incubazione la membrana ombilicale si smugne, il giallo, e gl'intestini sono rispinti nel corpo del Pulcino per l'irritabilità, che acquistano i muscoli del basso ventre; ed il piccolo animale non ha più, che un sol corpo. Per una consimile meccanica il cuore cangia di sito, e si mostra sotto la sua vera forma. Esso non comparisce da principio, se non sotto quella di un mezzo anello staccato dalle vertebre, e situato in qualche maniera fuori del petto. Prendendo di giorno in giorno più di consistenza, la tunica cellulare ritira tutte le parti del cuore l'una verso l'altre, e le accosta alle vertebre. Finalmente sono cause a queste analoghe quelle, che ripiegando appoco appoco il feto sopra se stesso, cangiano la sua situazione diritta in una positura opposta.

147. *Sesto fatto. Che le viscere tuttora fluide adempiscono già le loro funzioni. Osservazione sopra la maniera, con cui si operano le secrezioni.*

Sesto fatto. Lo stato di fluidità, nel quale sono da principio tutti gli organi, non le impedisce punto di fare le loro funzioni essenziali. Essi digeriscono, preparano, e filtrano gli umori, come faranno poi durante tutta la vita del Pulcino. I reni ancora invisibili separano già l'orina. Per render ragione delle secrezioni (1), ho unita alla gradazione de vasi
l'ipo-

l'ipotesi assai seguitata dell' imbibizione originale delle glandule . Le osservazioni sopra il Pulcino provano la falsità di questa ipotesi . Esse c' insegnano , che i medesimi vasi filtrano in diversi tempi degli umori , che pajono diversi . Nel Pulcino di nove giorni la bile è fluida , trasparente , e senza amarezza . E' una pura linfa diversissima dalla bile dell' animale adulto . Lo stesso è del liquore seminale , che da principio nell' infante è una semplice sierosità .

148. *Conseguenza importante di questi fatti sopra la prima origine del germe .*

Ecco de' fatti , che noi dobbiamo allo studio , ed alla sagacità di un eccellente Fisico , e somministrano una solida base a' nostri ragionamenti . Non si tratta più al presente di discutere la quistione , che da sì lungo tempo ha divisi gli Anatomisti sopra la prima origine del germe . Noi abbiamo nell' esposizione del *primo fatto* delle prove incontrastabili , che esso appartenga alla femmina . Da questa esposizione risulta , che il giallo è una parte essenziale del Pulcino . Or il giallo esiste nell' uova non fecondate ; dunque il Pulcino esiste nell' uovo prima della fecondazione . Noi abbiamo dunque fondamento di tirare da questo fatto questa conseguenza importante , che le ovaje di tutte le femmine contengono originalmente degli embrioni preformati , che non aspettano per incominciare a svilupparsi , se non il concorso di certe cause .

149. *Che le ovaje de' vivipari contengono de' veri uovi . Nuova prova tratta dal Gorgoglione viviparo in un tempo , ed oviparo in un altro .*

L' Anatomia ci produce delle ovaje nelle femmine *vivipare* . Si possono riguardare le *vescichette* , che le compongono , come vere uova . Un grand' Anatomico avea provata già da gran tempo l' esistenza
di

di queste uova (1): ed era giunto a distinguere il feto in una vescichetta attaccata ancora all'ovaja. Il gorgoglione ci dà quì un nuovo lume. Io ho dimostrato (2), che questo insetto singolare è viviparo nell'estate, ed oviparo nell'autunno. I gorgoglioni che nascono vivi, erano dunque racchiusi in uovi.

150. *Simiglianza, e dissimiglianza de' vivipari, e degli ovipari. Analogie del vegetabile, e dell'animale.*

Quindi i parti de' vivipari nascono nel ventre della lor madre; quelli degli ovipari dopo esserne usciti fuori. Questi ultimi prendono nell'uovo, durante l'incubazione, un accrescimento proporzionale a quello, che gli altri prendono nella matrice. La maggior parte de' vegetabili sono nello stesso tempo ovipari, e vivipari. Il granello è analogo all'uovo, la gemma alla vescichetta. L'embrione s'impianta nella matrice; la piccola pianta nascosa nella gemma si unisce al Tronco.

151. *Che il granello, e l'uovo, la gemma, e la vescichetta racchiudono originalmente un embrione, cui rende invisibile la sua trasparenza. Passo del Sig. de Haller che finisce di dimostrarlo.*

Il granello, e l'uovo, la gemma, e la vescichetta racchiudono dunque un germe, renduto invisibile dalla sua piccolezza, e dalla sua trasparenza. Si è dimostrato, che il giallo è una continuazione degl'intestini del Pulcino, lo è ancora, perchè il Pulcino sia esistito nell'uovo prima della fecondazione. (Primo fatto.) Le uova, che non sono fecondate, hanno un giallo, che non differisce punto da quello, che si trova nell'uova fecondate. Il Sig. de Haller

fa

(1) Sig. Littre, Mem. dell' Accad. delle Scienze. An. 1701. pag. 109. in 4.

(2) *Trattato dell' Insetologia* 1. part. Off. VIII. IX. XIX.

fa sentire l'assurdità, che sarebbe il supporre, che il giallo somministrato dalla gallina si fosse innestato col germe somministrato dal gallo. „ Il giallo „ dic'egli (1), ha de'vasi, delle arterie, e delle „ vene. Senza le arterie il suo liquore non fareb- „ be nato, senza le vene non avrebbe avuta circola- „ zione, e non si fanno supporre arterie senza ve- „ ne. Ma queste arterie del giallo, e queste vene „ nascono unicamente dall'arterie, e dalle vene „ mesenteriche del feto. La cagione del moto del „ sangue del giallo vien dunque dal feto: il ter- „ mine della riassorbizione del giallo è altresì nel „ feto, il giallo n'è dunque una parte, e non ha „ potuto esistere senza esso. “ Questa risposta fa egualmente contro la supposizione, che si vorrebbe fare, che il germe somministrato dal maschio s'innesti colle parti della vescichetta destinata a nutrirlo, ed a farlo crescere. Senza dubbio la vescichetta è dotata di una organizzazione analoga a quella dell'uovo, e relativa al medesimo fine.

152. *Falsità dell'opinione, che vuole, che il germe risieda originalmente nel liquore apprestato dal maschio.*

I liquori seminali non son dunque vescichette, che portino il germe nel granello, o nell'uovo, come nell'alloggiamento preparato per riceverlo. E' d'uopo omai rinunziare a un'opinione, che non ha altro in favor suo, se non che de' nomi celebri. La scoperta della preesistenza del Pulcino alla fecondazione dell'uovo, ci riconduce alla conghiettura che ho esposto nel Capitolo III. (2) sopra l'uso di questi liquori.

153. *Quan-*

(1) *Osservazioni sopra il Pulcino* ec. pag. 188. ec. Mem. II.

(2) Si consultino gli Articoli 39. 40. 41. 42. e 43. Io spiegherò davantaggio questa mia ipotesi alla fine di quest'Opera, ed applicandola a nuovi casi, ne farò meglio vedere la probabilità.

153. *Quanto possa contribuire la scoperta del Sig. De Haller a dar del lume sopra il mistero della generazione. Sagacità, che prova nel suo Autore. Arte di vedere.*

Questa scoperta è uno de' gran passi, che ha fatti la Fisica de' corpi organizzati a' nostri dì. Si attendeva la decisione della quistione, dalle sperienze moltiplicate, che sarebbono state tentate sopra i *bastardumi*: nè si è punto dubitato, che la sola ispezione di un uovo di gallina bastar potesse a deciderla. Tutto il Mondo sapeva, che gli uovi, che non sono stati fecondati hanno un giallo; ma niuno prima del Sig. De Haller, aveva conosciuti i rapporti, che legano questo fatto sì cognito alla gran quistione dell'origine del germe. Così anche il Nevvton s'innalzò dalla contemplazione di una bolla di sapone alla teoria della luce. L'arte di vedere è l'arte di conoscere i rapporti, e tutto s'incatena agli occhi del genio.

154. *Ricapitolazione de' fatti sopra il Pulcino, ed osservazioni sopra questi fatti. Che lo stato della fluidità non è altro, che un'apparenza.*

Il germe apparisce da principio fluido, ed è trasparente; appoco appoco perde della sua trasparenza, e diviene gelatinoso; finalmente egli mostra delle parti solide. (II. III. IV. Fatto.) C'inganneremo, se pensassimo, che il germe è originalmente un vero fluido. I fluidi non sono organizzati; il germe lo è, e lo è stato fin dal suo incominciamento. Allorchè ci si offerisce sotto l'apparenza ingannevole di un fluido, egli ha de' vasi, e questi vasi fanno le loro funzioni essenziali. (VI. Fatto.) Essi sono dunque solidi; ma la loro estrema delicatezza pare, che gli appressi alla fluidità. L'impulsione de' liquidi dilatando sempre più i vasi, questi vengono ad ammettere delle particole sempre più eterogenee. La trasparenza si altera; a questa succede la bian-

bianchezza, ed alla bianchezza i colori. (*IV. Fatto.*) Finchè le viscere rimangono immobili, e trasparenti, essi sono invisibili, benchè abbiano di già acquistata una grandezza molto superiore a quella, che potrebbe renderli percettibili. (*III. Fatto.*) La forma, e la situazione concorrono colla quiete, e colla trasparenza ad ingannare l'osservatore preoccupato, o poco attento. Si ha difficoltà a riconoscere il Pulcino sotto la forma di un piccolo filetto biancastro, immobile, steso in linea dritta, e terminato da una escrescenza. Mal si conosce il cuore sotto quella di un anello mezzo circolare, posto apparentemente fuori del petto. (*V. Fatto.*)

155. *Riflessioni sopra lo spirito del sistema. Come il Sig. De Haller è tornato dall'Epigenesi all'Evoluzione.*

Fin quì ho ricapitolati i fatti. Il nostro Autore ne deduce una conseguenza generale a favore dell'evoluzione, o dello *svilupamento*. Ciò, ch'è dice (1) in questa materia torna per appunto con quello, ch'io dicea nel Capitolo VIII. art. 125. al quale rimando il mio leggitore. Ei giudicherà, ch'io non abbia dovuto restar soppresso dalle osservazioni del Sig. De Haller, e della conseguenza giudiziosa, ch'ei ne tira. Lo spirito del sistema infanta alcune volte delle teorie, ch'è si sforza in seguito di confermare con esperienze. Il nostro secolo somministra degli esempli celebri, che provano troppo bene, che questo spirito non è molto felice a concepire la natura, perchè non bisogna diffidare assai delle esperienze medesime, per le quali pretende consultarla, Se s'ignorasse fino a qual punto il Sig. De Haller sia eccellente nell'arte di osservare, non si dubiterebbe, ch'egli si fosse lasciato da lei imporre, quando si

sa-

(1) *Osservazione sopra il Pulcino ec.* pag. 178. 186. Mem. II.

sapesse, che avanti le sue osservazioni sopra le uova, ei non inclinava punto all'evoluzione. Io non ho alcun sistema intorno alla generazione, mi scrivea egli un dì; *disingannato dell'evoluzione, io veggio sempre più una materia semplice, e viscosa costruirsi, e figurarsi appoco appoco*. E' stata dunque la sola speranza, e non già punto gl'interessi di un sistema amato, che ha portato il nostro dotto Fisico ad abbracciare finalmente un'idea, ch'io non ho mai potuto deporre. Ho sempre pensato, che un vischio, che sembrava organizzarsi, fosse già organizzato. Non mi è mai potuto entrare in mente, che le parti di una pianta, odi un animale, si formassero successivamente. Quanto più facevo riflessione sopra una tal formazione, tanto più sentivo l'insufficienza de' mezzi meccanici, celebrati con tanta compiacenza da diversi Autori. Io insisteva intorno a ciò presso il Sig. De Haller, allorchè ne ricevetti questa risposta. *Io sono molto del vostro sentimento intorno al glutine organico. Un sale sciolto nell'acqua mantiene de' cubi invisibili. Sarebbe un gran salto, se il piccolo animale divenuto visibile, coll'aiuto dello spirito di vino il diciottesimo giorno, e già tutto formato, fosse stato fluido il dì avanti. Egli esisteva dunque intorno al medesimo tempo, ma la sua trasparenza ce lo toglieva alla vista*. Le osservazioni sopra i progressi del Pulcino nell'uovo hanno finito di convincere il Sig. De Haller, della probabilità dell'evoluzione. Bisogna ascoltare lui medesimo ne' suoi *Corollari misti* (1). „ Io ho dato „ abbastanza a divedere nelle mie opere, ch'io „ inclinava all'*Epigenesi*, e che la riguardava come „ il sentimento più conforme alla speranza. Ma „ queste materie sono sì difficili, e le mie spe-
„ rien-

(1) *Memorie sul Pulcino*, cc. pag. 172.
TOM. I.

„ rienze sopra l' uovo sono sì numerose , ch' io
 „ proposi con minor ripugnanza l' opinione con-
 „ traria , che incomincia a parermi la più probabi-
 „ le. Il pulcino mi ha somministrate delle ragioni
 „ in favore dello sviluppo , ch' io credo do-
 „ vere offerire al giudizio del leggitore “. Il no-
 „ stro Autore si spiega anche più chiaramente nel
 „ Paragrafo seguente (1), che forma la sua conclu-
 „ sione. „ Io credo aver detto abbastanza , per fare
 „ intendere le ragioni , che mi traggono all' evo-
 „ luzione . E' mi pare cosa probabilissima , che le
 „ parti essenziali del feto si trovino fatte in ogni
 „ tempo ; non certamente tali , quali appariscono
 „ nell' animale adulto ; elle son disposte in manie-
 „ ra , che certe cause belle e preparate , solleciti-
 „ tando l' accrescimento di alcune di queste parti ,
 „ impedendo quello di altre , cangiando le situa-
 „ zioni , rendendo visibili gli organi una volta dia-
 „ fani , dando consistenza a' fluidi , ed alla mucco-
 „ sità , formano alla fine un' animale assai differen-
 „ te dall' embrione , e nel quale non v' ha perciò
 „ alcuna parte , che non sia stata essenzialmente
 „ nell' embrione . Così io spiego lo sviluppo .

*156. Risultati generali delle osservazioni del Sig.
 De Haller sopra il Pulcino .*

Tutte le osservazioni del Sig. De Haller con-
 corrono dunque a stabilire ; primo che il germe
 preesiste alla fecondazione . Secondo , che tutte le
 sue parti essenziali sono coesistite nel medesimo
 tempo . Terzo , che lo sviluppo dell' una sem-
 bra precedere quello dell' altra . Quarto , che la lo-
 ro consistenza , le loro proporzioni relative , la loro
 situazione soffrono appoco appoco grandissimi cam-
 biamenti .

157. *Parallelo di queste osservazioni con quelle d'Arvejo sopra la generazione delle Cerve, esposte dall'Autore della Venere Fisica.*

I Partigiani della produzione meccanica, e successiva del feto, apportano in lor favore le belle sperienze d'Arvejo sopra la generazione delle Cerve, e le oppongono con gran fiducia al sistema dello sviluppo. Niuno le ha esposte con maggior arte, quanto l'Autore della *Venere Fisica*, quell'Opera ingegnosa, ma la cui maniera poco Filosofica è spesso più atta a eccitare delle sensazioni, che delle percezioni. Io trascriverò quì il preciso, che questo Autore ci dà, delle scoperte d'Arvejo, e lo paragonerò col preciso, che ci ha dato di quella del Sig. De Haller. Non temerà l'Autore della *Venere fisica* d'avere infievolite le sperienze del Fisico Inglese; poichè egli era troppo impegnato a trovarvi delle prove dirette dall'*Epigenesi*. „ Alcu- „ ni (1) filetti delicati, dice, stesi da una parte „ all'altra della matrice formavano una spezie di „ reticella simile alle tele di ragno, ed insinuandosi „ tralle rughe della membrana interna della „ matrice, s'intrecciavano attorno le caruncule, „ presso a poco come si vede la *Pia-madre* seguita, „ ed abbracciare il contorno del cervello. Questa „ rete formò ben presto un sacco, o borsa, il „ di fuori della quale era intonacato di una materia fetida; il di dentro liscio e pulito, conteneva „ un liquore simile al bianco dell'uovo, nel quale „ nuotava un altro involuppo sferico ripieno di un „ liquore più chiaro, e cristallino. In questo liquore „ io appresi un nuovo prodigio. Questo non fu già „ un animale del tutto organizzato, come dovrebbe „ aspettarsi da' sistemi precedenti; ma fu il principio di un animale, un *punto* vivente (2), pri-

G 2

„ ma

(1) *Venere Fisica* Cap. VIII. Edizione del 1745. in 2. parti.

(2) *Punctum saliens*!

„ ma che alcuna delle altre parti fosse formata ;
 „ Vedeasi nel liquore cristallino saltare , e battere ,
 „ traendo il suo accrescimento da una vena , che
 „ si perde nel liquore , ove egli nuota ; tuttavia
 „ batteva allora , che esposto a' raggi del Sole , Ar-
 „ vejo lo fe vedere al Re . Le parti del corpo
 „ vengono ben tosto ad unirvisi ; ma con diverso
 „ ordine , ed in diversi tempi . Questo non è da
 „ principio , se non una *macilagine* divisa in due
 „ piccole masse , delle quali una formava la testa ,
 „ e l'altra il tronco . Verso la fine di Novembre
 „ il feto è formato ; tutta questa opera maraviglio-
 „ sa , allorchè pare una volta incominciata , si com-
 „ pie assai prontamente . Otto giorni dopo la pri-
 „ ma comparsa del punto vivente , l'animale è tal-
 „ mente inoltrato , che si può distinguere il suo
 „ sesso . Ma oltracciò quest' opera non si fa , che
 „ per parti ; e quelle di dentro son formate prima
 „ di quelle di fuori ; le viscere , e gl'intestini son
 „ formati prima d'essere coperti del *torace* , e dell'
 „ *abdome* ; e queste ultime parti destinate a met-
 „ ter l'altre al coperto , non pajono aggiunte , che
 „ come un tetto all'edifizio “ .

L'Autore termina il racconto di queste sperien-
 ze con alcune riflessioni da lui rappresentate come
 risultati , e che vuole opporre senza affettazione a'
 diversi sistemi , de' quali medita la rovina . „ Ecco ,
 „ dice , (1) quali furono le osservazioni d'Arvejo .
 „ Esse pajono tanto poco compatibili col sistema
 „ degli uovi , e con quello degli animali sperma-
 „ tici , che s' io le avessi riportate prima d'avere
 „ esposti questi sistemi , avrei temuto , che elle non
 „ pervenissero troppo contro quelli , e non impe-
 „ differo di ascoltarli con molta attenzione . In ve-
 „ ce di veder crescere l'animale per l'*intussuscezio-*

„ ne di una nuova materia come dovrebbe segui-
 „ re, s' e' fosse formato nell' uovo della femmina,
 „ o se fosse il piccolo verme, che nuota nel seme
 „ del maschio; questo è anzi un animale, che si
 „ forma per l'*juxtaposizione* di nuove parti. Arvejo
 „ vede subito formarsi il sacco, che lo dee conte-
 „ nere; e questo sacco, invece d' essere la mem-
 „ brana di un uovo, che fosse per dilatarsi, si fa
 „ sotto i suoi occhi, come una tela, di cui egli
 „ osserva i progressi. Questi non sono da princi-
 „ pio, se non che filetti tesi da un lato all' altro
 „ della matrice; i quali filetti si moltiplicano, si
 „ restringono, e formano finalmente una vera mem-
 „ brana. La formazione di questo sacco è una ma-
 „ raviglia, che dee accostumare all' altre. Arvejo
 „ non parla della formazione del sacco interno, di
 „ cui senza dubbio non è stato testimonio; ma ha
 „ veduto l' animale, che vi nuota, formarsi. Que-
 „ sto non è da principio, se non un punto, ma
 „ un punto, che ha vita, e attorno del quale tut-
 „ te l' arte parti venendo a disporsi formano ben
 „ presto un animale (1) “.

Dopo avere impugnato il sistema degli uovi, e quello degli animalculi, l' Autore dalla *Venere Fisica* passa all' esposizione del suo proprio sistema, e conchiude (2), *essere il solo, che possa sussistere colle osservazioni d' Arvejo*. Questa conclusione non è tanto favorevole al nostro Autore, quanto egli la presume, e lo riconoscerebbe forse ora, se la morte non l' avesse tolto alla Repubblica delle lettere, di cui egli era un grande ornamento. Lungi però, che le sperienze d' Arvejo favoriscano lo strano sistema della *Venere Fisica*, egli è facile anzi il com-
 pren-

(1) Gullielmo Arvejo *De Cervarum, & Damarum coitu Exercit. LXVI.*

(2) Cap. XVII. nel fine.

prende , ch' elle hanno una gran conformità con quelle del Signor De Haller intorno alla formazione del Pulcino . Arvejo avea molto visto , ma a traverso di una nuvola ; le nuove scoperte ci ajutano a rompere questa nuvola , e a disfrigare il vero dalle esperienze di questo grand'uomo .

158. *Osservazione dell' Autore sopra il Punto vivente . Profeguimento del Parallelo .*

Questo punto vivente , *Punctum saliens* , di cui l' Autore della *Venere Fisica* parla , come di un prodigio , e che fa ravvisare come il primo principio di un animale , che si forma per *justaposizione* , questo punto , dico , il Sig. De Haller l' ha molto osservato nel Pulcino . Io stesso l' ho osservato un' infinità di volte , sono già molti anni . Io mi fermava con piacere a contemplarne i movimenti , sempre sì pronti , sì regolati , sì costanti . Io l' ho visto così distintamente nel germe della Quaglia , come in quello del Pulcino . I forni , che ha inventati il Sig. De Reaumur (1) mettono a portata di godere in ogni tempo di uno spettacolo tanto atto a interessare la curiosità di un Fisico , e gli promettono di seguire a suo genio lo sviluppo del germe in uccelli di tutte le spezie . E nè pure sa di mestiere grande abilità nell' arte di osservare , per iscoprire questo Punto vivente ; altro non bisogna , che occhi , e un lume benchè sia poco favorevole . Aristotile l' avea conosciuto il primo : Arvejo stesso l' avea altresì osservato , e dopo lui altri molti Autori (2) . Il *Punto vivente* , dice l' Autore della

Ve-

(1) *Art de faire eclorre , & d' elever en toute saison des Oiseaux domestiques de toutes especes , &c.* Paris 1751. vol. 2.

(2) *Memorie del Sig. De Haller sopra il Pulcino . Estossio .* di de' fatti . Pag. 4. e segg.

Venere Fisica, traeva il suo accrescimento da una vena, che si perdea nel liquore, nel quale nuotava. Non si possono quì non conoscere i rapporti, che legano questa vena a' vasi, pe' quali il germe del Pulcino riceve il suo nudrimento. Le parti del corpo, è sempre il nostro Autore che parla, venivano ben presto a congiungersi al Punto vivente; ma con diverso ordine, e in diversi tempi. Non era da principio, che una mucillaggine divisa in due piccole masse, delle quali una formava la testa, e l'altra il tronco. Così pure il Pulcino comparisce da principio; egli è mucillagginoso, e diviso parimente in due piccole masse, di cui l'una forma la testa, e l'altra il tronco. (*V. Fatto.*) Ma queste parti non vanno ad unirsi al Punto vivente; ed è facile il riconoscere, che elle coesistono sin dal principio con esse. Tutta quest' opera maravigliosa, continua l' Autore, allorchè una volta pare incominciata, si compie assai prontamente. Otto giorni dopo la prima comparsa del Punto vivente, l' animale è molto inoltrato. Ma oltracciò quest' opera non si fa, che per parti; e quelle di dentro son formate prima di quelle di fuori, le viscere, e gl' intestini son formati prima d' essere coperti del torace, e dell' Addome ec. Gli aumenti del Pulcino non sono mai più rapidi, che dentro i primi giorni. Le sue viscere sembrano similmente formarfi successivamente, e prima delle parti destinate a ricoprirle. Il cuore si mostra il primo sotto la forma di un Punto vivente; ed è molto visibile sulla fine del secondo giorno. (*III. Fatto.*) Attorno di questo Punto si veggono nascere successivamente tutte le viscere. Il fegato è quello, la cui formazione pare, che si compia più presto; si scopre il quarto giorno. Lo stomaco, il polmone, i reni, si mostrano consecutivamente il quinto, ed il sesto giorno. Finalmente gl' intestini appariscono il settimo giorno; la

vescichetta del fiele l'ottavo (1). Gl' integumenti non sembrano ancora esistere. Se l'Autore della *Venere Fisica*, sempre prevenuto dell'*Epigenesi*, avesse dovuto esporre questi fenomeni, egli ne avrebbe senza dubbio delineata una tavola perfettamente simile a quella, che egli ci ha delineata dell' esperienze d' Arvejo. Questo stesso pertanto serve di prova incontestabile, che queste non sono, se non semplici frasi, e pure apparenze, e che tutte le parti del Pulcino coesistono nello stesso tempo. Dacchè un viscere diviene visibile, si vede tutto intero. Non si vede formarsi per un aggregato di molecole, e crescere per *justaposizione*. Il polmone non è visibile, se non allora, che ha aggiunti dieci centesimi di lunghezza; egli è dimostrato, che avrebbe potuto vederli con quattro soli di questi centesimi. (*III. Fatto.*) S' e' non si vedeva, egli era dunque unicamente a cagione della sua trasparenza; poichè egli non ha potuto acquistare tutto a un tratto dieci centesimi di lunghezza. I reni non son visibili, se non il sesto giorno, e nondimeno e' somministrano di già l' orina a una *allantoide* considerabile, dopo il fine del terzo dì (2). Certe membrane di una finezza, e di una trasparenza perfetta, condensandosi appoco appoco, formano finalmente gl' intestini (3), che, per valermi de' termini dell'Autore della *Venere Fisica*, non sembrano aggiunti, se non come un tetto all' edificio. Io trarrò più oltre questo parallelo tralle osservazioni d' Arvejo, e quelle del Sig. De Haller. I tratti di rassomiglianza, che fin quì ho raccolti, sono i più elevati, e bastano al mio fine.

C A-

(1) *Memorie sul Pulcino*, sez. VIII. IX. X. Corollarj misti pag. 176. 177.

(2) *Memorie sopra il Pulcino* sez. X. Corollarj misti pag. 192.

(3) *Corollarj misti* pag. 175.

CAPITOLO X.

Osservazioni sopra le metamorfosi, sopra l'evoluzione, e sopra l'aumento.

159. *Uniformità colla quale i quadrupedi, e gli uccelli si sviluppano. Cambiamenti del Pulcino paragonati alle metamorfosi degli insetti.*

I Quadrupedi, siccome gli uccelli, giungono dunque allo stato di perfezione, per mezzo di un'evoluzione, i gradi della quale sono più, o meno sensibili. Alcuni organi, che non esistevano a' nostri sguardi, esistevano rispetto all'embrione, e soddisfacevano alle loro funzioni essenziali, ed il termine della loro apparizione è quello, che per isbaglio si è preso per lo cominciamento di loro esistenza. I cambiamenti, che soffre il Pulcino nell'uovo possono essere paragonati alle metamorfosi degli insetti. Sotto la sua prima forma il Pulcino pare non differir meno dal Pulcino più perfetto, che il bruco dalla farfalla. Ma la farfalla, come il Pulcino, giungono allo stato di loro perfezione per mezzo di un'evoluzione, di cui i Malpighi (1), i Syvammerdam (2), i Reaumur (3) ci hanno svelati i gradi.

160. *Apparenze ingannevoli nelle metamorfosi degli insetti. Riflessioni su questa materia. La Farfalla esisteva già nel Bruco, e come.*

Non è di mestieri al bruco, se non qualche instante per apparire a' nostri occhi sotto la forma di
cri-

(1) *Dissert. Epist. de Bomb.*

(2) *Histor. Insect. Gen. Bib. Nat.*

(3) *Mem. pour servir à l'Hist. des Insect.* Tom. I. Mem. III. e XIV.

crisalide, e si fa che la crisalide non è che la stessa farfalla fasciata. L'insetto pare dunque passare subitamente dallo stato di bruco a quello di farfalla. Prima che noi fossimo avvisati di sospettare, che tutti i segreti della natura non erano racchiusi negli antichi, si riguardava il subito cangiamento del bruco in farfalla, come una vera metamorfosi, di cui poca era la pena a spiegare il comento. Uomini che ricevevano senza scrupolo le generazioni *equivocche*, poteano essi non ammettere le metamorfosi? Ma finalmente il tempo è venuto, nel quale i naturalisti si sono accorti, che aveano occhi per osservare, e dita per tagliare. Si è dunque osservato, e tagliato, e sono disperse le metamorfosi. Si è andato a cercare le farfalle nel bruco medesimo, e siamo giunti a scoprirvele. La sua tromba, le sue corna, le sue ale erano involuppate, attorcicchiate, e piegate con tale arte, che elle non occupavano che un piccolissimo spazio sotto i due primi anelli del bruco. Nelle prime sei gambe di questo erano incastrate le sei gambe della farfalla. Ma ciò non è ancor tutto; siamo giunti a scoprire le uova della farfalla nel bruco, molto tempo avanti la trasformazione (1).

161. *Conseguenza intorno alla preesistenza originale della farfalla. Il bruco paragonato a un uovo.*

Tutte le parti esteriori, ed interiori della farfalla, che si sono scoperte nel bruco, vi aveano già acquistata una grandezza considerabile; elle esistevano dunque per l'innanzi, e si scoprirebbero senza dubbio nel bruco nascente, se l'arte umana potesse tanto oltre arrivare. Quel ch'è l'uomo al Pulcino, è dunque alla farfalla il bruco. Questo raguna, digerisce, e distribuisce i sughi destinati a procurare lo sviluppo di quella. Le viscere del bruco sono spezie di laboratorio, ove si fanno queste preparazioni.

(1) *Mém. pour servir à l'Histoire des Ins.* Tom. I. pag. 359. in 4.

162. Fatti, che provano, che i vegetabili seguitano, come gli animali, la legge dell'evoluzione.

La stessa evoluzione che conduce gli animali alla perfezione propria della loro specie, vi conduce anche tutti i vegetabili. Si ritrovano disegnati a miniatura ne' granelli, e nelle gemme. I fiori del pero che noi veggiamo aprirsi nella Primavera, erano già visibili nell'anno precedente. La sagacità di alcuni osservatori ha aperta questa notte, e sorprende la natura occupata a preparare da lungi gli acini (1). Si va anche più in alto nella formazione delle Piante a cipolla. Il nocciolo del *mandorlo* racchiude originalmente una sostanza ghiajosa, analoga al giallo dell'uovo formontata da una vescichetta piena di un liquore trasparente, analogo al bianco, e che sono l'una, e l'altra destinate a nudrire l'embrione nascoso nel frutto (2). Egli trae questo nutrimento per via di piccoli vasetti, che si veggono in seguito ramificarsi nell'intiere de' lobi, e che possono essere paragonati a' vasi *ombilicali* del Pulcino. Io son giunto a renderli assai visibili per mezzo d'iniezioni colorate (3). L'Embrione offerisce due parti assai distinte, la *piumetta*, e la *radicetta*. La prima contiene gli elementi del tronco, e de' rami; la seconda quelli della radice, e delle sue ramificazioni. La *radicetta* fora ben presto la terra, per trarvi de' nudrimenti assai forti, e l'iniezioni mi hanno anche fatto conoscere, che nella sua estremità, terminata a punta, si trovano gli organi, che

suc-

(1) *La Physique des Arbres*, del Duhamel, Lib. 3. artic. 1. pag. 203. pr. part. in 4. Paris 2. parties 1758.

(2) *Physiq. des Arbres*, Lib. 3. art. 8. pr. part. Lib. 4. cap. 1. pag. 3. 2. part.

(3) *Recherches sur l'usage des feuilles dans les Plantes &c.* pag. 256.

fucchiano questi nudrimenti, e li fanno passare nel corpo della pianta (1). Questi organi sono alla pianta quel ch'è la bocca all'animale. Le parti dell'Embrione disposte nel grano, o nella gemma, vi hanno delle forme, ed una disposizione, che differiscono molto da quelle, che poi avranno dopo essersi sviluppate; ma esse non racchiudono meno, dopo l'incominciamento, tutto ciò ch'è essenziale alla specie.

163. *Che l'impulsione del cuore è la principale potenza, che operi lo sviluppamento nell'animale. Osservazioni sopra i cangiamenti del colore del sangue, e sopra l'ossificazione.*

I corpi organizzati dunque crescono per mezzo dello sviluppamento delle loro parti per ogni verso, ed a misura ch'esse si sviluppano, le loro forme, e la loro situazione primitiva soffrono delle mutazioni più, o meno considerabili, e più, o meno rapide. (V. Fatto). La principale potenza, che pare operare questo sviluppamento negli animali, è l'impulsione del cuore. Animato nella concezione per l'influsso del liquore femminile, si dilata, e in un subito contraendosi, caccia il fluido ne' vasi. Questo fluido, che sarà poi vero sangue, non è ancora, se non un liquore trasparente, e quasi senza colore. Ben presto perde la sua trasparenza, e diviene giallo, e a capo di tre giorni, di un rosso assai vivo (2). L'impulsione del sangue contro le membrane, le distende sempre più. Da questa estensione risultano il prolungamento, e l'allargamento de' principali tronchi, e lo sviluppo successivo di tutti i rami. I fughi nutritivi penetrando nello stesso tempo nelle maglie degli orditi aumentano la massa.

(1) *Recherches sur l'usage de feuilles* ec. pag. 250. e 251.

(2) De Haller *Memoir. II. sur le Poulet*, sect. IV. pag. 35. e segg.

fa. (Cap. II.) Gli elementi si avvicinano, e la loro scambievole attrazione cresce in ragione di loro approssimazione, e del contatto. (II. Fatto). L'ossificazione non incomincia, se non allorchè i vasi divenuti più larghi ammettono de' globetti rossi. Il battimento continuo delle arterie, che serpeggiano tralle lame ossee, tende a indurire queste lame. La terra, che i rossi globetti seco trasportano, e la cui proporzione di giorno in giorno cresce, contribuisce altresì alla durezza, ed alla fragilità delle parti ossee (1). La pulsazione delle arterie, che serpeggiano tralle parti molli, può concorrere parimente ad accrescere la consistenza di queste parti. Tutti questi effetti dipendono nell'ultima cagione dalla forza del cuore, e questa dipende altresì dal calore. Ne' feti deboli, o mal covati, il sangue rimane più lungo tempo giallo; l'ossificazione incomincia più tardi, e lo sviluppo è più lento (2).

164. *Esempio notabile dell'evoluzione nella membrana ombilicale del Pulcino.*

La membrana ombilicale somministra un esempio dell'aumento, che può applicarsi a tutte le parti del corpo. Questa membrana non è da principio, se non una spezie di *Parenchyma*, o una polpa molle. La forza del cuore vi fa nascere per gradi delle tracce reticulari. Queste tracce non sono nel principio, se non punti; ma ben presto esse divengono linee. Queste linee si colorano appoco appoco, e finalmente divengono arterie, e vene divise in piccolissimi angoli. Questi angoli ingrandiscono; si formano delle superficie bianche tra' vasi; queste si dilatano in

(1) *Memoires sur la formation des Os*, par Mr. De Haller, pag. 252. e segg. a Lusanna presso Bousquet, in 12. 1758.

(2) *Mem. II. sur la formation du Poulet*, pag. 35. e segg. 262.

fenfibilmente, quasi come si dilatano gli spazi compresi tra' nervi di una Pianta (1). „ Si retroceda, „ dice il Sig. de Haller, colla considerazione de' can- „ giamenti successivi di questa membrana ombilica- „ le, e si resterà facilmente convinto, che ella è „ sempre esistita co' suoi vasi, che ella è stata ri- „ piegata sopra se medesima, che l'impulsione del „ sangue ha prolungate l'Arterie, e aggomitolate „ queste pieghe, che ella ha allontanati i vasi gli „ uni dagli altri, e ha data alla membrana la sua „ larghezza, la sua lunghezza, le sue superficie „ bianche, la medesima solidità “.

165. *Solidi dell'embrione ripiegati originalmente sopra se stessi; esempio preso dalle gambe, e dall'ale della farfalla.*

Sembra dunque, che i solidi dell'embrione sieno ripiegati originalmente sopra se stessi, e che l'impulsione del sangue tenda continuamente a spiegarli. Si scopre a occhio questo ripiegamento nelle gambe della farfalla mentre sono ancora incastrate, e come concentrate in quelle del bruco incomparabilmente più corte. E par di vedere un ordigno fatto ad *anello*, e caricato sopra di un peso. Ben presto l'impulsione degli umori sviluppa queste gambe, e ne scancella le pieghe (2). Lo stesso accade a un certo dipresso alle ali. Prima della nascita della farfalla, esse sono assai dense, ed hanno poca estensione. Sembrano essere ripiegate sopra loro stesse a guisa di piccolo sacco. Immediatamente dopo la nascita, l'impulsione de' liquidi, ajutata da certi moti, le spiega, ed esse perdono nella densità ciò, che acquistano in estensione (3).

166.

(1) *Corroliaires mêlès* pag. 173. e segg.

(2) *Memoires pour servir à l'Histoire des Insects*, Tom. I. pag. 365. e 366.

(3) *Ibid.* pag. 614. e segg.

166. *Dell' aumentazione della massa de' solidi per l' incorporazione delle materie alimentizie. Iniezioni colorate atte a dar de' lumi su questa incorporazione.*

Ma se il meccanismo organico si riducesse a questa semplice evoluzione, i corpi organici non acquisterebbono maggior massa nello svilupparsi. Avverrebbe di tutti i solidi come dell' ali della farfalla. L' aumentazione della massa che acquistano nel crescere, vien loro di fuori. Ella è il prodotto dell' associazione di un numero infinito di molecole diverse che assimila loro la nutrizione. Noi ignoriamo, ed ignoreremo per lungo tempo il segreto di questa assimilazione. Noi veggiamo in generale, ch' ella può dipendere dall' appropriazione del calibro de' vasi alla grossezza, e fors' anche alla figura delle molecole, che essi debbono ammettere, o separare per un certo fine. E par chiaro, che la natura faccia passare la materia alimentizia per una serie di vasi, i diametri de' quali s' impiccoliscono sempre più e la introduce finalmente nelle maglie, o nella tessitura cellulare de' solidi. L' incorporazione della *robbia* nella tessitura cellulare degli ossi (1), e quella delle materie colorifere nella tessitura delle piante che s' injectano (2), danno una lieve idea dell' associazione delle materie alimentizie. L' arterie non si nutrono di quel medesimo sangue, che distribuiscono per tutto; esse hanno de' piccoli vasi, che apportano alle loro tuniche il nutrimento che hanno separato dal sangue. Io ho già toccato dell' aumento nel Cap. II. Ho trattato nel Cap. VI. della nutrizione considerata relativamente alla generazione; io rimando il mio leggitore a questi due Capitoli.

167.

(1) *Memoires sur la formation des Os*, par M. De Haller, pag. 257.

(2) *Recherches sur l'usage des feuilles dans les Plantes*, Art. XC. *Physique des Arbres*, Lib. V. Cap. II. Art. VII.

167. *Della traspirazione insensibile , che si fa nel tempo , che l'embrione si sviluppa . Idea de' mezzi di abbreviare , o di prolungare ad arbitrio la vita all'embrione . Del principio vitale nell' animale . Conseguenze .*

Mentre che il feto si sviluppa nell'uovo, traspira; imperocchè il guscio duro, e crostaceo, sotto del quale è racchiuso, ha de' pori preparati, per lasciar passare la materia della traspirazione insensibile. L'inviluppo crostaceo delle crisalidi ha i suoi pori, e per lo stesso fine. Alcune sperienze curiose, che io ho appena finora indicate, ci hanno insegnato, che accelerando la traspirazione insensibile, si abbrevia, o si prolunga quasi ad arbitrio la durazione della vita delle farfalle, e di più altre spezie d'insetti. Si vede abbastanza, ch'io voglio parlare delle sperienze, le quali il Sig. De Reaumur ha minutamente descritte nella prima Memoria del secondo Volume della sua bella Istoria degl'Insetti. Per divenire farfalla, qualunque spezie di crisalide dee perdere per la traspirazione insensibile intorno alla diciottesima parte del suo peso. Questa quantità varia in diversi subietti. La materia della traspirazione è un liquore limpidissimo. Mentre questa materia sta racchiusa nell'interno dell'animale, ella separa in qualche guisa gli elementi, s'oppone alla loro unione, e ritarda così l'aumento, e l'induramento. Dunque si accelererà l'uno, e l'altro, o ch'è lo stesso, si abbrevierà la vita dell'insetto, se si tiene in un lungo caldo, per esempio, in una stufa, o in un forno da Pulcini. Quivi, un giorno sarà per l'Insetto ciò, che farebbe stato per esso nell'ordine naturale, una settimana, od anche un mese. Seguirà il contrario, se si racchiuda la crisalide in un luogo freddo, com'è una cava, o una ghiacciaja, ovvero se si ricopra di una vernice impenetrabile all'acqua. Nissuno di questi metodi nuocerà all'Insetto. Negli uovi vestiti anche di grasso, od i vernice, il germe si conserva per ben lun-

lungo tempo, e quest' uova sono, dopo mesi, ed anni, nello stato medesimo di uova fresche. La lunga vita de' pesci, e di alcuni popoli del Nord, ha probabilmente per cagione principale la diminuzione della traspirazione insensibile, sempre eccessiva negli abitanti de' climi caldi. Così la vita nella macchina animale non è altro propriamente, se non se il seguito de' movimenti del cuore, e de' vasi. Il principio vitale sembra essere nell' *Irritabilità*, quella proprietà della fibra muscolare, di cui dobbiamo la cognizione alle profonde ricerche del Sig. De Haller (1). Il cuore è il muscolo, che possiede questa proprietà nel grado più eminente. Egli è un effetto di sua natura il contrarsi, che fa, al solo tocco del sangue, o sia, che appartenga tuttora all'animale, o che se ne trovi già separato. Nel contrarsi, egli spreme del sangue fuori della sua cavità, e lo caccia ne' vasi, tuttora ripiegati sopra se stessi. L'impulsione del liquido gli spiega, e la durazione di questa evoluzione, è la durazione dell'aumento. Questo sminuisce a proporzione, che cresce la resistenza. Cessa poi allorchè è cresciuto a segno di annientare l'effetto della forza espansiva. I solidi induriti non sono più *duttili*. Ciò si vede chiaro nell'ossa, e meglio ancora ne' vermini, ch'io ho moltiplicati per *incisione* (2). Il pezzo non si estende mai; ma si sviluppano nuovi anelli nell'estremità. L'aumento dunque si misura per lo spazio scorso, e pel tempo impiegato nello scorrerlo. L'insetto, cui non son bisognati, se non pochi giorni, per giugnere al suo perfetto accrescimento, è vissuto tanto, quanto l'insetto della medesima specie, che non è giunto a questoterminè, se non a capo di più mesi, o di più anni (3).

Tom. I.

H

Qua-

(1) *Dissertation sur l'irritabilité. Mem. sur le mouvement du Cœur*, a Lussina in 12.

(2) *Traité d'Insectologie Seconde Partie Observat. VII.*

(3) *Memoires pour servir a l'Histoire des Insects*, T. 2. Mem. 2.

Qualunque composti sieno le macchine organiche , il loro sviluppo è suscettibile di una certa latitudine , di cui le circostanze , o l'arte possono o riserrare , o estendere i limiti . Le ruote , che misurano la vita organica precipitano , o ritardano le loro rivoluzioni ; ma la somma degli effetti è sempre la stessa .

168. *Ricerche intorno alla potenza , che opera lo sviluppo nel vegetabile . Sperienza dell' Autore sopra la prestezza del moto del sugo , e sopra le iniezioni colorate .*

Noi nulla veggiamo ne' vegetabili , che tenga luogo del cuore , dell'arterie . I moti sì notabili de' loro steli , delle loro foglie , de' loro fiori , de' loro acini , delle loro trachee (1) sembrano dipendere da tutt' altra cagione , che dall'irritabilità , e questo carattere più penetrato servirebbe forse a distinguere l'animale dal vegetabile . Frattanto il sugo , ch'è il sangue delle piante , vi si muove con una forza capace d'innalzare il mercurio a più pollici , e che equivale qualche volta a tutto il peso dell'atmosfera , ed anche lo sopravanza . Io ho potuto giudicare a occhio della rapidità del sugo nelle piante , che io ho imbevute di liquori colorati . Ho veduto il liquore scorrere sotto i miei occhi un' estensione di un pollice e mezzo in mezz'ora (2) . Il Sig. Ales nella sua maravigliosa *statica de' vegetabili* ha ottimamente provato , che le foglie sono i principali organi della traspirazione . Egli le ha riguardate come le potenze , che innalzano il sugo . Ma la forza prodigiosa delle *lagrime* della vite ci dimostra , che non sono le foglie le sole potenze , che la natura mette quì in opera (3) . Le iniezioni mi hanno con-

fer-

(1) *Recherches sur l'usage des sevelles dans les plantes* Mem. 2. & 5. *Physique des Arbres* lib. 4. cap. 6.

(2) *Rech. sur l'usage des sevelles* . pag. 259.

(3) *Physique des Arbres* , lib. 5. art. 4.

fermata la stessa verità ; poichè la materia colorante si è innalzata assai alto su rami sprovveduti di foglie, ed in una stagione assai fredda. Ma dall'altro canto , non l'ho veduta mai sollevarsi nelle piante tagliate , e di larghi pori. Il sugo non s'introduce dunque nelle piante, come l'acqua nella spugna; il suo moto dipende da una meccanica, che ci è tuttora sconosciuta, e cui ci potrebbero scoprire nuove sperienze. L'elaterio della trachea, che eccita quello dell'aria, influisce senza dubbio su questo moto, ma si dura fatica a concepire la loro azione nella densità di un legno molto duro.

169. *Effetti generali della Potenza vitale nelle Piante . Esposizione abbreviata dalla maniera , onde crescono gli Alberi . Parallelo di questo crescimento con quello degli ossi.*

Qualunque siasi la potenza, che presiede al moto del sugo, egli è certo, che ella esiste, e che produce nel vegetabile i medesimi effetti essenziali, che produce nell'animale la forza del cuore. Questa è la potenza, che spigne il sugo ne' tubi ripiegati, o concentrati, che gli spiega e stende per ogni verso le lame infinitamente delicate, che essi compongono colla loro unione. Queste lame sono tanti piccoli conj inseriti gli uni dentro gli altri, e di cui il numero è indefinito. I più esterni contengono i rudimenti della scorza; i più interni, quelli del legno. Tutti quanti nel germe sono una semplice spezie di gelatina; questo è lo stato, sotto del quale si mostra l'animale i primi giorni. (II. e III. Fatto:) Essi divengono erbacei a gradi; e questo stato corrisponde a quello, che riveste la cartilagine, quando cessa di essere membranosa, o piuttosto muccosa. Finalmente i conj interiori s'indurano appoco appoco, acquistano successivamente la consistenza della scorza, e quella del legno; e la cartilagine è quella, che acquista alla fine la consistenza

dell'osso. Il cono più interno s'indurisce il primo; e cessa di crescere. L'aumento continua in quello, che immediatamente l'involge. Le lamine, che sono i rudimenti della vera scorza non si convertono in legno; perchè questo ha una organizzazione, che è tutta sua proprietà; i suoi tubi sono più fini, più ferrati, ed ha delle trachee, che mancano a quella. Ma le lamine, che contengono gli elementi del legno passano per lo stato di sostanza corticale; de' piani legnosi sembrano staccarsi dalla scorza per applicarsi al legno. Dalla densità delle lamine risulta l'aumento in grossezza, e dal loro prolungamento risulta l'aumento in altezza. Questo cessa prima di quello. L'indurimento comincia sempre alla base de'conj; le sommità sono ancora *duttili*; il corpo dell'osso è quello, che si ossifica il primo; in seguito l'estremità, e le epifisi. La radice non cresce, che nella sua estremità. Io non parlo quì, che degli Alberi (1). Nell'estremità del tenero tronco, che ha somministrata la *piumula*, apparisce nell'autunno un bottone. Questo bottone contiene il germe di un nuovo tronco. S'apre nella primavera. Il piccolo tronco n' esce fuori ancora erbaceo, si stende per ogni verso, e s'indurisce altresì anch'esso, come il primo. Un bottone apparisce similmente nella sua estremità, che dà l'essere a un altro gambo. L'albero si forma così annualmente di un seguito di gambi, o di piccoli alberi, impianati l'uno sopra l'altro. Nell'erbe *annuali* un solo stelo si sviluppa, che prende appoco appoco l'aumento, e la consistenza propria della sua specie. Nell'erbe *vivaci* escono bottoni dalla base, o dalle radici dell'antico stelo. L'aumento de' vegetabili può essere accelerato, o ritardato, come

(1) *Physique des Arbres*, lib. 4. cap. 3.

me quello degli animali . I vegetabili traspirano , e s'induriscono tanto più presto , quanto è più accelerata o più abbondante la loro traspirazione . Per la ragione de' contrarj , quanto più una pianta trae di nudrimento , tanto più il suo induramento è lento ; ella prosegue dunque a crescere per più lungo tempo . Coll'ajuto di certe precauzioni , o di certe circostanze , il germe vive per un tempo molto più lungo nel granello , come l' embrione nell' uovo . Bisogna leggere nell' eccellente opera del Sig. Du Hamel , le descrizioni interessanti , e tanto dottamente esposte , delle quali io ho finora delineato lo sbizzo . Tutto vi concorre a stabilire l'evoluzione .

170. *Elementi della Teoria dell' Autore sopra la meccanica dell' aumento .*

Tutte le parti di un corpo organizzato hanno a crescere , e finchè elle crescono , continuano ad acquistarsi delle funzioni , che sono loro proprie . L'attitudine a compierle dipende dalla loro struttura . La struttura delle parti non cangia dunque essenzialmente per tutta la durata dell' aumento . Intanto esse crescono di massa , e questa aumentazione proviene dall' incorporazione delle molecole , che assomiglia la nutrizione . La meccanica di ciascuna parte è dunque tale , che distribuisce , e ordina le molecole alimentizie in un rapporto diretto alla sua struttura . Questa struttura è essenzialmente la medesima nel germe , che nell' animale sviluppato . Il Pulcino lo dimostra . Le molecole alimentizie non formano dunque niente ; ma esse ajutano allo sviluppo di ciò , ch'è già formato , e ne aumentano la massa . Lo sviluppo , e l' *intussuscezione* seguono così la legge della costituzione primordiale delle parti . Questa costituzione deriva per ultima cagione della natura , dalla disposizione , e generalmente da tutte le determinazioni degli elementi

proprij di ciascuna spezie de'organi , e quello , ch'io dico degli organi , posso dire delle fibre , di cui sono composti . Sono dunque gli elementi delle parti del germe , che determinano sino dal principio , l'unione , e la disposizione de'nuovi elementi , che associa loro la nutrizione . Sono anche questi elementi , che determinano il grado dell' accrescimento , della consistenza , o induramento , che può acquistare ciascuna parte . (*Cap. II. e VI.*) Oltre a questi principj generali , io non veggio che tenebre più , o meno dense . Del resto nello sviluppare altronde questa spezie di Teoria , io tenterò di mostrare , come un tutto organnizzato , giunto al suo perfetto aumento , sia un composto delle sue parti originali , o *elementari* , e delle materie , che ha loro associate la nutrizione , di sorta che se si potessero estrarre queste materie dal tutto , questo si concentrerebbe , per così dire , in un punto , e si ridurrebbe così al suo stato primitivo di *germe* . Lo stesso è , a un certo dipresso , che estraendo da un osso la materia *cretacea* , ch'è il principio della sua durezza , si riduce al suo stato primitivo di cartilagine , o di membrana .

CAPITOLO XI.

Che l'Osservazioni sopra la formazione del pulcino finiscono di distruggere il sistema delle molecole organiche. Fatti, che concernono i Granelli, le Gemme, egualmentechè gl'Innesti, e l'Incisioni, o vegetabili, o animali, e la moltiplicazione per germogli, e quella per divisione naturale.

171. *Che tutti i fatti esposti nel Capitolo precedente, stabiliscono l'evoluzione come una legge della natura.*

FIN quì ho posto sotto gli occhj de' miei leggitori molti fatti interessanti, che sembrano unirsi per fare dell'evoluzione una legge generale del sistema organico. Questa legge suppone manifestamente la preeesistenza de' germi; nulla può svilupparsi, che non sia già stato preformato. L'animale vegeta, come la pianta. Ma l'evoluzione non esclude per se stessa l'epigenesi. L'animale formato per giustapposizione del concorso delle due semenze, soffrirebbe conseguentemente la legge dello sviluppo. Bisognava dunque dimostrare, che l'animale esista nell'uovo indipendentemente dal concorso de' sessi; e questo è ciò, che le osservazioni del Signor De Haller hanno posto in una piena evidenza.

172. *Che non v'è dunque alcuna vera generazione nella natura.*

Io son dunque ricondotto più fortemente, che mai, al gran principio, donde son partito nell'incominciare quest'Opera; cioè, che non v'è nella natura alcuna vera generazione; mache, noi appelliamo impropriamente generazione il principio di uno sviluppo, che ci rende visibile ciò, che prima non potevamo discernere. I reni allora ca-

sembrano generati, quando cadono sotto i nostri sensi; ma essi separano frattanto l'orina allorchè non dubitavamo nè pur per ombra della loro esistenza: (VI. Fatto.) Ciò, che si verifica di un organo, si verifica anche dell'animale, che risulta dall'unione di tutti gli organi. Non giudichiamo dunque del tempo, nel quale gli esseri organizzati hanno incominciato ad esistere, da quello, nel quale hanno incominciato a divenirci visibili, e non ristrigniamo la natura negli stretti limiti de' nostri sensi, e de' nostri strumenti.

173. *Opposizione delle scoperte sopra il Pulcino co' sistemi, che le hanno precedute.*

I Fisici che hanno creduto non esservi alcun germe negli uovi infecundi, hanno presa un'idea favorita, per la regola delle cose. Essi vedeano degli animaletti nella semenza de' maschi, e ne concludevano, che questi animaletti erano destinati a introdursi negli uovi, e a divenirvi il principio della generazione. Coloro, che hanno rigettati gli uovi, e ritenuti gli animaletti, hanno voluto, che vi abbia nella matrice un luogo assegnato, nel quale si fissassero, e si sviluppassero. L'esame di un uovo di gallina è bastato per rovesciare queste famose ipotesi, sostenute da valentuomini con tanto calore.

174. *Riflessioni sopra gli antichi in occasione di loro opinione sopra la mescolanza de' due semi. Di alcune opinioni moderne poco filosofiche intorno all'origine degli esseri organizzati.*

Gli antichi pensavano, che il feto risultasse dalla mescolanza de' due semi, e questa idea viene naturale alla mente, che non vi è pena a fare loro un merito. L'Autore della *Venere Fisica*, che si è compiaciuto di rieccitare questa opinione, loda pertanto in questa materia gli Antichi. Allora, dic'

„ egli,

„ egli , (1) che noi crediamo , che gli Antichi non
„ sieno stati in tale , o tale opinione , se non per-
„ chè non erano stati tanto lontani , come noi , do-
„ vremmo forse piuttosto pensare , che ciò sia av-
„ venuto , perchè erano anzi stati più lontani ; e
„ perchè alcune sperienze , che noi non abbiamo
„ ancor fatte , aveano loro fatta sentire l'insufficien-
„ za de' sistemi , de' quali noi ci contentiamo . “
Io ammetterò , se si vuole , che gli Antichi abbia-
no veduto tutto ciò , che veder poteano . La natura
avea fatti loro degli occhi tanto buoni , come a noi ,
ma non gli avea armati di un vetro . Essi discerneva-
no il *punto saltellante* , ma non ne poteano distingue-
re le *fasi* . Hanno voluto fare a forza di genio ciò ,
che i moderni hanno eseguito a forza di metodo , e
d'istrumenti . Gli antichi sono stati lontani , ma sa-
rebbero stati anche più lontani , se , senza avere i
nostri strumenti , avessero avuto solamente i nostri
metodi , e questi metodi son quelli , che più distin-
guono il nostro secolo . Gli errori dell'antichità non
hanno da recarci maraviglia , essendo essi l'appanag-
gio della primogenitura . Ma quel , che dee farci stu-
pire , si è il vedere de' Fisici , che in un secolo sì
illuminato , com'è il nostro , abbiano ripresi questi
errori , e che spieghino tutta la forza del loro genio
per persuaderci , che si formi un animale , come un
cristallo , e che un ammasso di farina si converta in
anguille . Si sono richiamate le qualità *occulte* , che
avea bandite dalla Fisica la buona Filosofia . Si è ri-
corso agl' *istinti* , alle *forze di rapporto* , alle *affinità*
chimiche (2) , alle *molecole organiche* , che non sono
né vegetabile , né animale , ma che colla loro unio-
ne formano e 'l vegetabile , e l'animale (3) .

(1) Cap. XVI. pag. 97.

(2) *Vedere Fisica* Cap. 17. 18. 19.(3) *Storia naturale* , generale , e particolare ec. Tom. 2.

175. *Annotazioni sopra l'esposizione, che dà l'Autore al sistema del Sig. De Buffon, e sopra un passo della Venere Fisica.*

Molti leggitori mi riprenderanno senza dubbio di essermi troppo steso intorno al sistema del Sig. di Buffon. Essi pretenderanno, che certi sogni, che ne pure sono filosofici, non meritassero, che uno vi si fermasse sopra. Io non cercherò di giustificarmi di questa riprensione; ma confesserò, aver io creduto, dovere qualche cosa alla celebrità del sognatore, ed alla singolarità de' suoi sogni. Io gli ho dunque esposti con tutta la chiarezza, di cui erano capaci, e non ne ho fatto poi un esame in forma. Mi sono solo limitato a indicare alcuni fatti, che mi sono paruti evidentemente contrarj all'ipotesi dell'Illustre Autore. Tale è quello, che ci offerisce il *bastardo* presso l'api. Se il feto risulta dal concorso delle molecole organiche, che racchiudono le due semenze; se queste molecole sono disegnate nelle diverse parti, che compongono il corpo del maschio, e quello della femmina; se finalmente esse acquistano con ciò la capacità di rappresentare in piccolo il feto, perchè l'*ape operatrice* ha ella organi, che non si trovano nell'*ape regina*, nè nel *calabrone*? Perchè anche l'*ape regina*, ed i *calabroni* hann'organi, che non si trovano nell'*ape artefice*? L'Autore della *Venere Fisica* fa una riflessione giudiziosa, che riceve quì un'applicazione assai naturale. „ Io domando, „ dic' egli (1), perdono a' Fisici moderni, se non „ posso ammettere i sistemi, che hanno ingegnosa- „ mente immaginati. Imperocchè non son di quel- „ li, che credono, che si faccia profittare la fisica, „ attaccandosi ad un sistema, malgrado qualunque „ fenomeno, che gli sia evidentemente incompara- „ bile;

„bile; ed i quali avendo osservato qualche passo ,
„dove segue necessariamente la ruina dell'edifi-
„zio, finiscono nondimeno di costruirlo, e l'abita-
„no con tanta sicurezza, come se fosse il più soli-
„do. “ Io dimando anche dal canto mio perdono
a' partigiani degli *instinti*, e delle *molecole organi-*
che, se non posso ammettere il loro sistema, e se
non ardisco d'alloggiarmi in un edificio ruinoso,
che essi abitano nondimeno con tanta sicurezza, come
se fosse il più solido.

176. *Che le osservazioni del Signor De Reaumur
sopra i globetti mobili provano la loro origine, e
la falsità delle opinioni contrarie.*

Que' globetti mobili (1) che si scoprono nelle in-
fusioni vegetabili, o animali, ed in particolare nel-
la semenza di diverse spezie d'animali; que' globet-
ti, che il Sig. De Buffon ama di rappresentarci, co-
me tanti nuovi ordini di esseri organizzati, che
non appartengono propriamente nè alla classe de' ve-
getabili, nè a quella degli animali, e che pure for-
mano e i vegetabili, e gli animali; que' globetti, io
dico, de' quali ho ricercata la natura nel Capitolo
VIII., e un grande osservatore gli ha poi studiati con
tutta l'attenzione, che esigevano. Egli ha conosciuto
ciò, che ne avea imposto a' Signori Needham, e
De Buffon. Egli si è assicurato, che quelli sono ve-
ri animali, che hanno ordini di generazione consimili,
che si succedono; che è falsissimo, che queste genera-
zioni sieno di animali sempre più piccoli, come l'hanno
avanzato gli Autori del nuovo sistema; e che tutto quì
va all'ordinaria, che i piccoli divengano grandi, se-
condo il loro giro. Questo è quello, che si è potuto
vedere nella nota, che ho posta al fine dell' Articolo
135. L'Autorità del Sig. Di Reaumur è quì di un peso
trop-

(1) Vedi il Cap. VII.

troppo grande , perchè possa indebolirsi. I piccoli animali erano il suo dominio, e niuno ha posseduta in più alto grado l'arte di ben condursi nella ricerca delle verità fisiche , quanto questo illustre Accademico. Riguardo alla maniera , colla quale son prodotti questi animaletti nelle infusioni , potrebb'egli un Filosofo risolversi ad ammettere , che provengano dalla trasformazione della materia medesima dell'infusione in animaletti? Una tal fisica offenderebbe la ragione del pari, e l'esperienza. Ciò sarebbe un rinnovare le generazioni *equivocche*, delle quali è tanto comprovata la falsità. Di vero non v'è, che uno strano amore al paradosso, che possa portare a spacciare seriamente tali favole, e mi dispiace, che la posterità le abbia a rinfacciare al nostro secolo. Non è egli più ragionevole il pensare, che l'uova di questi animalcoli, o gli animalcoli stessi esistessero nella materia dell'infusione? ovvero, che sieno passati dall'aria in questa materia? Tutto ciò, che noi conosciamo di più certo intorno alla generazione degli insetti, ci sollecita ad abbracciare questo sentimento, e per rinunziarvi, non vi vorrebbe meno di una rigorosa dimostrazione della verità del sentimento opposto.

177. *Che le scoperte del Sig. De Haller intorno al Pulcino distruggono da capo a piè l'edifizio innalzato del Sig. di Buffon, e come.*

Ma quando le molecole organiche avessero tutta l'esistenza, che è piaciuto al Sig. Di Buffon, di loro accordare, non ne avrebbe egli guadagnato niente di più. L'osservazioni intorno al *pulcino* finiscono di ruinare da capo a piè tutto il suo edifizio. Dacchè è dimostrato, che il pulcino esiste nell'uovo prima della fecondazione, (*I. Fatto*,) resta anche provato, ch'è non trae la sua origine dalle molecole organiche, che racchiude il seme del gallo. Ma egli nè pure la può trarre dalle molecole organiche della gallina; imperocchè nel sistema del nostro Autore,

come

come potrebbe questa somministrare le parti proprie del maschio? Del resto quanto ho detto delle *molecole organiche*, non mi è stato già ispirato dal desiderio di criticare il Sig. Di Buffon. I critici non sono mai flati del mio gusto. Io venero questo grande scrittore; ma rispetto anche più la verità.

178. *Rifutazione del sentimento del Sig. Needham sopra l'origine del germe nel granello, e sopra la maniera, colla quale è fecondato esso granello.*

Noi dobbiamo alla sagacità del Signor Needham delle scoperte interessanti intorno alla fecondazione de' vegetabili, e dalle quali questo osservatore hatirata una conseguenza, che mi pare arrischiata. È d'uopo, ch'io trascriva quì le sue proprie parole (1). „ Il seme non contiene, prima d'esser fecon-
„ dato, se non la pianta in miniatura, come alcu-
„ ni Autori hanno creduto, ma la polvere del fio-
„ re è quella, che racchiude il primo germe, o
„ gemma della nuova pianta; questo germe per is-
„ vilupparsi, e per crescere, non ha bisogno, se
„ nondel fugo, ch'è trova preparato nell'ovaja. Im-
„ perocchè se si riflette sopra le conseguenze di una
„ osservazione, che già è stata fatta da diversi Natu-
„ ralisti, ne pure co' migliori microscopj si scuopre cos'
„ alcuna nel granello di una pianta, finattantochè le
„ sommità degli stami si sieno sgravati della loro
„ polvere, e fino a quel tempo esso granello è af-
„ fatto voto, ne vi si vede cos'alcuna fuori della sua
„ pelle, o del suo inviluppo esteriore; ma dappoichè
„ egli è stato impregnato dalla polvere, vi si scorge
„ un vero granello, o una piccola macchia verda-
„ stra, che nuota in un limpido liquore ec. “ Il
Sig. Needham ammette, come si è veduto, non es-
servi germe nel granello, che non è fecondato. Vuole,
le,

(1) *Nuove scoperte fatte col Microscopio*, pag. 89. 90.

le, che sia la polvere degli stami, che l'introduce nel granello. Questa ipotesi nulla ha d'assurdo, e ritorna precisamente in quella, che Andry, ed altri Autori hanno adottata per ispiegare la generazione per via di animalculi. Ma su che mai riposa l'asserzione del Sig. Needham? Unicamente su questo, *che co' migliori microscopj nulla si scopre nel granello di una pianta, sinattantochè le sommità degli stami si sieno sgravati della loro polvere.* Chi non vede, che questa maniera di ragionare non è esatta, e che questo è un argomentare dall'invisibilità alla non esistenza? Coll'ajuto de' migliori microscopj si discopre forse il germe nell'uovo, non ancora fecondato? E pure non abbiamo noi prove dirette, che veramente vi esiste? (*I. Fatto.*) Io l'ho già notato; la grande analogia, che si osserva tralle piante, e gli animali, e che si manifesta ogni dì con nuovi tratti, non lascia luogo a dubitare, che non sia quì lo stesso del granello, come dell'uovo, e che si debba esser permesso il crederlo, finchè non ci si producono delle prove dirette del contrario. La piccolezza, e la trasparenza delle parti del germe possono metterle fuori della portata de' vetri più eccellenti. L'azione della polvere si sviluppa, e sminuisce la loro trasparenza. Esse incominciano così a divenir visibili; e quindi questa *piccola macchia verdastrea, che nuota in un limpido liquore*, e che non si distingue, se non dopo l'impregnazione.

179. *Che la scoperta intorno all'origine del Pulcino conduce per analogia a quella di tutti gli esseri organizzati.*

Quando siamo assicurati, che il Pulcino esiste in piccolissima forma nell'uovo prima della fecondazione; quando si è osservata la maniera, onde le sue parti si sviluppano dopo la fecondazione, e le differenti fasi, sotto le quali esse successivamente si mostrano, può legittimamente inferirsene, che è

lo stesso di tutte le produzioni organiche, cioè che elle sono tutte originalmente racchiuse in piccolo in certi involuppi. Ed a questo stato primitivo si è dato il nome di *germe*. Così allorchè noi veggiamo un ramo formarsi sopra la scorza di un albero, un polpo sopra la pelle di un altro polpo, noi possiamo concludere, che il ramo era racchiuso in piccolo sotto la scorza dell'albero, il piccolo polpo sotto la pelle del Polpo-madre.

180. *Origine de' rami negli alberi. Le Gemme.*

Un ramo nascente è un albero in miniatura. Questo piccolissimo albero è da principio situato in un bottone, o gemma. Egli è ricoperto all'esterno da più ordini di scaglie poste in nascofo, sotto le quali si scoprono diverse membrane più, o meno dense. Tutte le parti dell'albero sono ripiegate con molta arte, e non compariscono, che come rudimenti, o stozzi.

181. *Origine della Plantula. Il granello. Comparazione del granello coll'uovo. Differenza del Granello, e della Gemma, o bottone. La Barbatella.*

Non avvi minor arte nella maniera, onde la piccola pianta è situata nel cuore del granello: ma questa ha delle parti, che non ha la gemma. Il granello è un uovo, nel quale un embrione prender dee i suoi primi accrescimenti. Quest'uovo è covato nella terra. L'embrione, ch'egli racchiude, non può trarre alcun nutrimento dalla pianta, che l'ha prodotto, e da cui (attualmente separato; ma la natura ha posti in serbo nel granello i nutrimenti destinati a' suoi primi aumenti. Alcuni vasi (1) analoghi a' vasi ombilicali del Pulcino traggono i suoi nutrimenti, eli portano nell'embrione. Questa) una spezie di latte, di cui da principio) abbeverato.

Dive-

(1) Vedi il Cap. precedente num. 162.

Divenuto poi più forte , va di per se a succhiare dalla terra un alimento più grosso , o più sostanziale . Il bottone all'opposto non contiene alcuno alimento ; la piccola pianta , ch'e' gitta se ne può bensì procacciare . Ella sta attaccata all'albero , e trova sotto la scorza de' nudrimenti preparati . Si può nondimeno staccare da questi alimenti , poichè ella ha preso un certo ingrossamento . Si distacca dal tronco , e se ne fa una *Barbatella* , che posta in terra , vi gitta le sue radici , e diviene un albero .

182. *Esperienza curiosa per iscoprire l'uso de' Lobi nel granello.*

Si può similmente staccare la *plantula* dal latte , che succhia nel granello . Ciò si ottiene togliendo dirittamente i due tronchi de' vasi , che la tengono attaccata ai lobi . Io ho ideata questa sperienza delicata , per assicurarmi dell'uso de' Lobi , e mi è riuscita molte volte . Ma le piante , che avevo così private del lor latte , son rimase per tutta la lor vita piante in miniatura , di una singolare piccolezza , e delle quali un Botanico mal conosciuta avrebbe la spezie . Queste miniature hanno gittate nondimeno delle foglie , e de' fiori , e questa curiosa sperienza mi ha fatto conoscere , quanto sieno utili i lobi a' primi aumenti dell'embrione (1) .

183. *L'Innesto. Idea della maniera , colla quale si unisce al subbjetto. Esperienza contraria all'opinione , che ammette quì una spezie di Filtro per separare i sughi.*

Se in vece di piantare in terra la *barbatella* , s' inferisce nel tronco di un'albero , questo farà un *innesto* , che s'unirà a esso albero , come un ramo naturale . Cotale unione non farà effetto di una nuova
pro-

(1) *Recherches sur l'usage des sevelles dans les plantes , Article LXXXIX.*

produzione; ma i vasi dell'*innesto*, ed i vasi dell'albero, che non si farebbono mai sviluppati, senza il soccorso dell'operazione, si svilupperanno, ed abboccandosi gli uni con gli altri per diversi punti, formeranno un'infinità d'intrecciature. Essi da principio si mostreranno sotto la forma di una sostanza gelatinosa, poi erbacea, ed alla fine corticale, e legnosa (1). Intorno all'incisione nascerà un cordone, e ricoprirà la piaga. Si è creduto, che questo cordone fosse una ghianda *vegetabile*, destinata a separare dall'albero i sughi necessarj all'innesto. Questa idea ingegnosa mi pare poco conforme coll'esperienza. Ho fatto dare dell'inchiostro a un ceppo di vite, che portava dell'uve *violette*, e sopra il quale si era *innestato* un ramo, che era appartenuto ad un ceppo, che dava dell'uve *bianche*. Io ho vista la materia colorante passare senza alterazione sensibile dal *subbietto* nell'*innesto*, ed elevarsi per le *fibre legnose* sino alle cime di esso innesto.

184. *Innesti naturali, origini di diverse mostruosità.*

Diverse parti di piante s'innestano naturalmente l'une coll'altre per *avvicinamento* mentre sono ancora racchiuse nella gemma, e questa sorta d'innesto dà l'essere a certe *mostruosità* molto varie. Ora sono due frutti, che si attaccano l'uno all'altro, e ne formano un sol tutto organico. Ora sono due foglie, o più fogliucce della medesima foglia, che si uniscono insieme, per comporne una sola. Può vederfi una quantità d'esempj di questi mostri nella quarta Memoria del mio libro *sopra l'uso delle foglie*.

185. *Polipi, che si moltiplicano per germoglio, e come.*

Un piccolissimo *bottone* apparisce sul corpo di un polpo *fatto a branche*. Questo bottone ingrossa, e si

sten-

(1) *Physique des Arbres*, Liv. IV. Art. VI.
TOM. I.

stende. Eſſo non contiene già un polpo ; ma egli ſteſſo è un polpo in piccolo. Egli è unito alla ſua madre, come un *germoglio* lo è alla ſua pianta. La comparazione è eſatta. Il cibo, che prende il polipo naſcente, paſſa alla ſua madre, e ſe queſto cibo è colorito, ne tigne anche quella. L'alimento, che prende la madre, paſſa ſimilmente al ſuo rampollo, e lo coloriſce. Il corpo de' polipi è aſſai ſemplice, è formato a guiſa di cannello. All'eſtremità del cannello, onde è formato il polipo naſcente, v'è un buco, che ſ'apre nello ſtomaco della madre ; e per queſto buco di comunicazione ſi è, che gli alimenti paſſano reciprocamente dall'uno nell'altra. Il tenero polipo creſce, ed allorchè ha preſo un certo aumento, il buco di comunicazione appoco appoco ſi chiude. Il polpo ſi ſtacca finalmente dalla madre ; ed ecco la ſtrana maniera, onde i polipi a *branche in forma di corni* ſi moltiplicano naturalmente per *germoglio* (1).

186. *Rampolli de' vegetabili. Moltiplicazione della Lenticchia acquatica, per germoglio, che imita quella de' polpi.*

Un gran numero di piante gittano de' *rampolli* ; ma non ſi ſeparano già di per ſe ſteſſi dalla pianta, e ſolone poſſono eſſere ſeparati per arte, e moltiplicare così la ſpezie. Ma vi è pure una pianta aſſai comune, i rampolli della quale ſi ſtaccano naturalmente, per propagare la ſpezie. Tale è la *lenticchia acquatica*, che copre le acque ſtagnanti di un tappeto verde. Una foglia di queſta pianta ondeggia ſull'acqua. Dalla ſua ſuperficie inferiore parte un ſiletto terminato da un piccolo gonfio, che può riguardarſi
come

(1) *Memoires pour ſervir à l'Histoire d'un genre de Polyptes d'eau douce, à bras en forme de Cornes*, par Mr. Trembley troiſieme Memoire. Edition in 4. Leide, chez les Freres Verbeeck 1744. Edition in 8. Paris chez Durand, 1744. 2. Vol. Tom. 2. pag. 7. 8. & 9.

come la radice. Altre foglie si sviluppano intorno alla prima, e se ne staccano di poi col loro filetto (1).

187. *Polipi carichi in un tempo medesimo di più generazioni di polipi.*

Molti *bottoni* appariscono tutti in una volta sopra il polipo, e non v'ha quasi punto del suo corpo, donde non ne possano uscire. Questi sono altrettanti polipi nascenti, che crescono sopra un tronco comune. Mentre questi si sviluppano, gittano anch' essi de' bottoni, cioè altri piccoli polipi, che similmente ne gittano altri dal canto loro. Questi sono rami, che producono altri rami, e questi, altri ramicelli. Molte generazioni restano così attaccate l'une all'altre, e tutte alla madre polpo. Questo non rassomiglia male ad un piccolo albero assai folto. L'alimento, che prende uno de' polpi, si comunica ben presto a tutti gli altri. Finalmente il piccolo albero si discioglie nelle sue branche, e ne' suoi rami; i teneri polpi si staccano dalla lor madre, e vanno a dar l'essere a nuove serie di generazioni, o a nuovi alberi *genealogici* (2).

188. *Polipi a faggio. Origine di alcune produzioni marine, che sono state prese per piante.*

Diverse specie di polpi *di mare* sono situati nella loro nascita in certi faggi di materia crostacea. Questi polpi moltiplicano, come quelli *d'acqua dolce per germoglio*. I faggi sono piantati l'uno sopra l'altro, e imitano la forma, ed il semblante di una pianta. Queste sono *polpaje* che sono state prese per bellissime *piante marine* da alcuni valenti Botanici, che amavano di trovare da per tutto de' vegetabili. La celebre scoperta de' *fiore* di corallo non

(1) Ibid. Edit. in 8. Tom. 2. pag. 116. e segg.

(2) Ibid. Tom. 2. Edit. in 8. pag. 56. e 57.

non era altro, che quella di una specie di polipi, de' quali il *corallo* n'era il faggio (1).

189. *Polpi moltiplicati dalla barbatella per sezione, e come.*

Alla proprietà di moltiplicare per germoglio, i polpi uniscono ancora quella di poter essere moltiplicati, come le piante *da barbatella*. Un polpo tagliato trasversalmente, o longitudinalmente in due, o in più parti, non muore già, ma ciascuna parte diviene in poco tempo un polpo compiuto. Questa sorta di fecondità è così grande in questi insetti, che un piccolissimo pezzo della Pelle di un polpo può divenire un animale perfetto. Questa sì notabile produzione ha luogo egualmente ne' polpi teneri, che si dividono mentre sono ancora attaccati alla loro madre, e se si taglia la stessa madre nel tempo, che ella produce de' figliuoli, ricupererà in brevissimo tempo, le parti, che le si faranno tolte. Un semplice tronco dà alla luce de' figliuoli, e riprende in seguito una testa, de' bracci, ed una coda. Qualche volta produce de' figliuoli senza perfezionare se stesso. Altre volte la testa di un polpo tenero prende il luogo di quella, che avrebbe dovuto gittare alla parte anteriore del tronco.

190. *Idre prodotte per sezione.*

Se si fende un polpo, incominciando dalla testa, e che non si tiri la sezione, se non fino al mezzo del corpo, si avrà un polipo a due teste, che mangerà nello stesso tempo con due bocche. Se si ripete l'operazione sopra ciascuna testa, si farà un' *Idra* a quattro teste, e ripetendola ancora un'altra volta, un' *Idra* a otto teste. Finalmente, se si tagliano queste teste, l'*Idra* ne gitterà delle nuove, e ciò, che non

(1) Vedi la bella Prefazione, che il Sig. di Reaumur ha posta a capo del sesto volume delle sue *Mémoires pour servir à l'Histoire des insectes*.

non avrebbe la stessa favola osato d'inventare, ciascuna testa tagliata produrrà un polpo, di cui si potrà fare una novella Idra (1). Se poi in luogo di fendere così un polpo, si apre semplicemente da una parte all'altra, e dopo averne stesa la pelle, questa si sminuzza nell'anteriore estremità, si avrà parimente un' Idra; e quel che importa molto il notare, le nuove teste si staccheranno qualche volta da per loro stesse dal tronco, e diverranno altrettanti polpi (2).

191. *Polpi tritati, e ciò, che ne risulta. Come si formi il nuovo stomaco ne' più piccoli frammenti.*

Finalmente un polpo tritato dà tanti polpi, quanti frammenti se ne son fatti. Ho detto, che il corpo di questi insetti è formato a guisa di cannello. La cavità di questo cannello tien loro luogo di stomaco. Gli orli opposti di un frammento non si accostano, per formare questo cannello, come segue ne' polipi tagliati per la loro lunghezza; ma il frammento si rigonfia interiormente; vi nasce una piccola cavità, che è l'abbozzo di un canello (3).

192. *Sperienze dell'Autore sopra i vermi acquatici, che moltiplicano come i polpi, a barbatella (o per incisione) Idea dell'organizzazione di tali vermini. Regolarità della circolazione del sangue sino nelle minori porzioni. Scale degli aumenti delle parti tagliate. Verme, che gitta successivamente dodici teste.*

Nulla è unico nella natura. Dappoichè siamo stati convinti, che una proprietà è stata accordata ad una specie, si può conchiudere, essere stata accordata anche ad altre. Prima ch'io sapessi, se il polipo appartenesse alla classe degli animali, io m'ero assicurato con una speranza, che era stato dato all'animale

(1) *Memoires sur les Polypes par Mr. Trembley, Mem. 4. Edit. in 8. pag. 194. 195.*

(2) *Ibid. pag. 197.*

(3) *Ibid. pag. 206. 207.*

male di potere essere moltiplicato per tallo, o per incisione (1). Ho tenuto dietro alla riproduzione di un verme acquatico, *senza gambe*, che avea diviso trasversalmente in due. L'interno del polipo non offerisce niente, che rassomigli alle viscere degli altri insetti. Un sol cannello voto, e la pelle son, che lo formano, nè presenta all'occhio armato di microscopio, se non una moltitudine innumerabile di piccoli granelli, che si colorano per mezzo del cibo. L'interno del mio verme al contrario mi offerisce lo stesso apparecchio d'organi, o presso a poco, che si scopre in quello della maggior parte degli insetti. La principale Arteria sopra tutto, colle sue ramificazioni laterali, formava un grande spettacolo. Non sapevo lasciare di contemplarvi la circolazione del sangue, che si facea regolarmente dalla coda verso la testa (2). Un essere, nel quale si scopre un cuore, uno stomaco, e degli intestini; un essere, in cui circola un liquore analogo al sangue, non poteva esser preso nè pure per un istante per una pianta; e se quest'essere si moltiplicava per incisione, restava dimostrato, che questa proprietà era comune al vegetabile, ed all'animale. Osservai dunque le viscere prolungarsi in ciascuna parte del verme tagliato; vidi de' nuovi organi formarsi appoco appoco, una testa, degli anelli, una coda, ed in brevissimo tempo io ebbi due vermi completissimi (3). Io partii questi vermi in ventisei parti, che non erano quasi atomi, e questi atomi divennero sotto i miei occhi animali perfetti

(1) *Traité d'Insectologie; ou Observations sur quelques especes de vers d'eau douce qui croissent par morceaux, deviennent autant d'animaux complets.* Seconde Partie, Introduction, Paris 1744. 2. vol.

(2) Ibid. Obs. I.

(3) Ibid. Obs. II.

fetti (1). La circolazione del sangue era così regolare in questi atomi prima della riproduzione, come lo era nel tutto, di cui innanzi facevano parte (2). Io innalzai delle scale dell'aumento graduale di diverse porzioni di questi vermi, e queste scale mi ferono conoscere ciò, che non avrei mai pensato, che dagli ottavi, e da' decimi faceano in tempo eguale tanto progresso, quantodalle metà, e da' quarti (3). Vidi lo stesso individuo lasciato nell'acqua pura, gittare successivamente dodici teste, dopo essere stato tagliato undici volte nella sua parte anteriore (4). Io scopersi in seguito più altre spezie di vermi d'acqua dolce, del medesimo genere de' precedenti, ed i quali io moltiplicai similmente per sezione. Ma fra queste spezie, una ve n'ebbe, che mi offerì una grande singolarità, di cui ho fatta menzione nel Capitolo IV. pag. 34. e seguenti (5).

193. *Che i vermi di terra moltiplicano parimente per incisione.*

I vermi di terra sono elefanti, a paragone di quelli, di cui ho finora parlato; e questi elefanti possono essere parimente moltiplicati per incisione, ma molto più lentamente. Me ne sono io assicurato, facendo sopra essi le medesime sperienze, che avea fatte sopra i vermi d'acqua dolce (6).

194. *Che la stessa proprietà è stata scoperta dopo in altre spezie di animali.*

Io ho avuto soltanto il vantaggio di aver confermata il primo una scoperta, che sarà sempre celebrata nella storia naturale, e della quale noi ne
fia-

(1) Ibid. Observ. III.

(2) Ibid. Obs. XV.

(3) Ibid. Obs. IV. IX.

(4) Ibid. Obs. X.

(5) Ibid. Observ. XXI. e segg.

(6) Ibid. Explication des figures, pag. 208. e segg.

fiamo debitori alla grande sagacità del Sig. Trembley, amico mio, e mio compatriotto; ella è stata poi confermata anche da eccellenti osservatori, che hanno stese le loro ricerche ad insetti di differenti generi. Le *stelle*, e l' *ortiche* di mare, che hanno tanta relazione per la loro struttura co' Polipi, non ne hanno minore per la maniera, onde si producono, dopo essere state divise. Una stella gitta de' nuovi raggi in luogo di quelli, che le sono stati levati. Tagliata, o lacerata, ella dà altrettante stelle, quanti ne furono fatti frammenti. L'ortica la cui forma è conica, tagliata in diverse parti, dà parimente più conj. o ortiche, alle quali nulla manca. Una spezie di *millepiedi*, nonostante il gran numero de' suoi anelli, e delle sue gambe, può altresì essere moltiplicata per incisione; e questa proprietà appartiene ancora ad una spezie di *sanguisuga* (1).

195. Che questa proprietà non è meno estesa nel vegetabile, che nell' animale. Prove: le incisioni delle foglie ec.

Allor che si vede un polpo, o un verme stritolato in pezzi riprodursi in porzioni di una piccolezza estrema, verrebbe la tentazione di credere, che l'animale possedesse questa proprietà in un grado più eminente, che il vegetabile. Ma una foglia è certamente presso a poco a tutto il corpo di una pianta ciò, ch'è una di queste porzioni a tutto il corpo dell'insetto. Ora una foglia può divenire una pianta, ella può, come una pianta intera, o come una barbatella, gittare delle radici, e vegetare così di per se stessa. Questo è ciò, che ho più volte avuto il piacere di vedere (2), e che toglie

(1) Vedi la Prefazione del sesto Volume delle *Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes*.

(2) *Recherches sur l'usage des feuilles dans les Plantes*. Art. LXXVIII.

glie i dubbj ragionevoli, che formarli possono sopra le curiose sperienze di Agricola (1). Si fa ancora, che certe radici, tagliate con sottilissime rotelle, possono divenire tante piante perfette.

196. *Cagione finale di questa proprietà negli insetti.*

I diversi accidenti, a' quali molte spezie d'insetti sono naturalmente esposte, esigevano apparentemente, che esse potessero riparare le perdite, che cagionano loro questi accidenti. Io ho pescato ne' rivi di questi vermi, che ho moltiplicati per incisione, de' quali gli uni aveano perduta la testa, gli altri la coda, altri la testa, e la coda insieme. Fra tali vermi ve n'erano di quelli, che cominciavano a perfezionarsi sotto i miei occhi (2). Lo stesso si rileva delle stelle di mare, che non hanno, se non un sol raggio, accompagnato da uno, o da più raggi nascenti (3).

197. *Polpi, ed anguille, che moltiplicano naturalmente per barbatella.*

La moltiplicazione per incisione di alcune spezie d'insetti non dipende sempre dall'arte, o dalle circostanze esteriori. Pare, che sia stato loro accordato il moltiplicarsi naturalmente per questa via. I polipi a branche si dividono qualche volta da per loro stessi. Si forma alle volte sul loro corpo una leggiera contrazione. Questa contrazione cresce appoco appoco, e diviene finalmente sì profonda, che le due parti non tenendo più insieme, se non per un filo delicato, il più piccolo movimento dell'animale basta per separarle. Esse riprendono poi ciò, che loro mancava,

per

(1) *L' Agriculture parfaite &c.*

(2) *Traite d'Insectologie* Obs. VI.

(3) Prefazione del sesto volume delle *Memoires pour servir à l'Histoire des Insectes.*

per essere perfetti polpi (1). Le mie osservazioni sopra una piccolissima specie d'anguille d'acqua dolce, conducono a credere, che sia stato dato anche a loro di moltiplicarsi naturalmente per barbatella. Ho mostrato fin dove può giugnere questa maravigliosa moltiplicazione (2).

198. Millepiedi, che moltiplica parimente di per se stesso per barbatella, e come.

Una piccola specie di millepiedi acquatica, notabile per un dardo carnosso di cui la sua testa è armata, si moltiplica altresì naturalmente per barbatella, ma in una maniera singolarissima. Nasce una testa circa a due terzi di corpo dell'insetto, contando dal punto anteriore. Si vede il dardo di questa nuova testa innalzarsi perpendicolarmente sopra il corpo del millepiedi. La parte posteriore, guernita di questa nuova testa, si separa dal resto del corpo; e così di un solo millepiedi se ne formano due (3). Questo insetto può così essere moltiplicato per fezione (4).

199. Moltiplicazione de' polipi a mazzo per divisione naturale.

I ruscelli sono popolati di una piccolissima specie di polpi, che s'attacca a diversi corpi, e che si prenderebbe per una muffa. La sua forma imita quella di una campana rovesciata. L'apertura di questa campana è la bocca del piccolo animale; gli orli ne sono i labbri. Vi si scopre un moto rapidissimo, che fissa gradevolmente l'attenzione, e che facilmente si paragonerebbe a quello di un piccolo muli-

(1) *Memoires sur les Polypes* &c. Mem. 3. in 8. Tom. 2. pag. 94. e 95.

(2) *Traité d'insectologie*. Obs. XXI.

(3) *Memoires sur les Polypes*. Mem. 3. in 8. Tom. 2. p. 152.

(4) *Ibid.* Prefazione del sesto volume delle *Memoires pour servir à l'Histoire des Insectes*, pag. 59.

mulino. Questo moto eccita nell'acqua una corrente, che porta nella bocca i piccoli corpi, de' quali si nutrisce l'insetto. La campana è portata da un piccolo picciuolo, che s'allunga appoco appoco, e la cui estremità si fissa a qualche appoggio. La generazione di questi piccolissimi polipi differisce molto da quella de' polipi *a branche*. Allorchè un di questi polipi è sul punto di moltiplicare, perde appoco appoco la forma di campana: la sua parte anteriore si ferra, e si ritonda. I labbri rientrano indentro, ed il loro moto sparisce. L'animale si scortisce in seguito sempre più, e finalmente si divide insensibilmente nel mezzo secondo la sua lunghezza. Dopo una tal divisione, veggonsi due corpi separati, e rotondi nella loro parte anteriore e attaccati ad un picciuolo comune, per mezzo di un altro picciuolo proprio. Questi sono due nuovi polipi, più piccoli di quello, dal quale sono stati formati. La loro parte anteriore si dilata appoco appoco, le labbra viepiù si mostrano. Vi si vede un moto da principio lentissimo, e che si accelera a misura, che la campana si apre. Ventiquattro ore dopo ciascun polpo si divide ancora secondo la sua lunghezza, e si veggono quattro polpi attaccati al medesimo tronco. Questa divisione singolare cresce così di giorno in giorno; ella vada di quattro a otto, di otto a sedici, di sedici a trentadue ec. Tutta questa attaccatura, ed unione forma unbel mazzo, che ha fatto dare a questi polipi il nome di *polipi a mazzo*. Si distaccano quindi, e non vi si trova altro in luogo del mazzo, se non che il tronco accompagnato co' suoi rami. I polpi, che si sono staccati, vanno nuotando a fissarsi sopra qualche corpo, dove danno l'essere a nuovi mazzi (1).

(1) *Memoires sur les Polyptes a Bouquet*, par Mons. Trembley, tiré des *Transactions Philosophiques*, a Leide chez Elie Luzac le fils 1777.

200. *Moltiplicazione de' polpi a imbuto per divisione naturale.*

Altri polpi ancora più piccoli, de' quali la forma s'appressa a quella di un imbuto, moltiplicano similmente dividendosi in due; ma affatto diversamente da' polipi *a mazzo*. I polipi *a imbuto* si dividono a sbieco, ovvero a scarpa. Quindi de' due polpi che provengono da questa divisione, l'uno ha la vecchia testa, ed una nuova coda, l'altro una nuova testa, e l'antica coda. Si comprende facilmente, che la testa è quì l'imboccatura dell'imbuto, la coda il fondo. Quello che subito si scorge nel polpo che incomincia a dividersi, sono i nuovi labbri del polpo inferiore, o di quello che ha la coda vecchia. Essi hanno un moto assai lento, che li ajuta a farli distinguere. Non sono disposti per linea dritta sulla lunghezza del polpo, ma a sbieco. La porzione del corpo, ch'è circondata da questi labbri, appoco appoco si raccoglie; i labbri si avvicinano insensibilmente; e sopra una banda del polpo formasi un gonfio, che diventa finalmente una nuova testa. Prima che questo gonfio abbia fatti de' progressi, si distinguono già i due polpi che si formano, e quando è molto avanzato, il polpo superiore non s'attiene più al polpo inferiore che per la sua estremità. Il polpo superiore fa allora de' movimenti, che tendono a distaccarlo dall'altro. Si stacca finalmente, e va nuotando a fissarsi altrove. Il polpo inferiore resta attaccato a quella parte, ov'era il polpo, di cui esso è una metà. Così questa spezie di polpi non forma *mazzetti* (1).

201. *Moltiplicazione per divisione naturale di certi polipi a mazzo, denominati polpi a bulbi, o cipolle.*

Si trova ne' ruscelli una spezie di polpi *a mazzo* molto più notevole, che non è quella, di cui ho parlato, e che moltiplica dividendosi parimenti in due.

(1) Ibid. sub fine.

due. Questi polpi hanno come gli altri, la forma di campana; ma il mazzo ch'essi compongono è diverso. Le branche che partono dal tronco comune non son semplici; anch'esse portano delle branche più piccole, la cui disposizione imita quella della *nervatura* di una foglia. Nell'estremo di tutte le branche è una campana, o un polpo; e quà, e là su queste branche si scoprono piccoli bottoni, che per la loro forma, per la loro posizione, e per la loro immobilità non rassomiglian male alle galle che s'alzano sopra la nervatura delle foglie della quercia. Se si giudica di questi polipi unicamente per analogia, non si dubiterà punto, che non si moltiplichino, come gli altri polipi *amazzo*; cioè per la divisione continua delle loro campane: ma l'analogia c'inganna bene spesso, e bisogna, che la natura ci raddrizzi. Da principio non sono già le campane che si dividono; ma i bottoni, de' quali ho parlato. Essi crescono assai presto, e quando hanno preso tutto il loro accrescimento, sono molto più grossi che le campane. Allora si staccano dal mazzo, e vanno nuotando a fissarsi sopra qualche corpo. Vi si attaccano per un cortissimo picciuolo che si allunga molto in breve tempo. Lasciano ben presto la loro figura sferica per prender quella ovale. Ciascun bottone si divide in seguito pel mezzo secondo la sua lunghezza, e dopo la divisione veggonsi due bottoni ellittici più piccoli del primo, ma più grossi anche del polpo a campana che s'attengono al medesimo tronco. Non tardano anche questi a dividersi, ed a formare così una spezie di pennacchio terminato da quattro bottoni, più piccoli de' due primi, ma più grossi similmente di un polpo a campana. Le suddivisioni continuano nella stessa guisa, e ben presto il mazzo si trova composto di sedici bottoni. Essi non sono tutti eguali. I più piccoli cominciano a manifestarsi sotto la forma di una campana, gli altri continuano a dividersi.

Que-

Questa divisione non cessa, se non allora, che tutti i bottoni son giunti alla forma, ed alla grandezza propria de' polpi di questa spezie. Questo si fa tanto presto, che in meno di 24. ore si vede un mazzo composto di 110. polpi, provenuti dalla divisione di un solo bottone (1). Ma allorchè i polpi hanno presa la forma di campana, l'aumento del mazzo si fa per la loro suddivisione, per appunto come nella spezie, di cui si è parlato quì sopra, ed in tutte l'altre.

202. *De' Polpi innestati.*

Gli insetti, che moltiplicano, come le piante per germoglio, e per barbatella, hanno ancora con esse un'altra conformità, che non è meno maravigliosa. Essi possono essere *innestati*. La medesima mano, che di un sol polipo *a branche* ne ha fatti più, ha potute ancora di più polipi farne un solo. Se dopo aver divisi trasversalmente diversi polpi in due, o più porzioni, si accostano queste porzioni l'une all'altre, e applicandovele a mano a mano, si sforzano a toccarsi, elle si riuniranno, e s'innesteranno così per *approssimazione*. L'unione non si farà da principio, che per un filo cortissimo e delicatissimo. Le porzioni appariranno separate per mezzo di profonde contrazioni, che scemeranno appoco appoco, e finalmente dispariranno del tutto. Si vedrà dunque il contrario di ciò che vedesi accadere allorchè i polpi si dividono naturalmente, come ho detto quì sopra (2). Finchè la contrazione sarà tuttavia profonda, l'unione sarà già molto intima. Gli alimenti passeranno immediatamente dall'una delle porzioni nell'altra. Non solamente le porzioni di uno stesso polpo, o quella de' polpi della medesima spezie, possono essere innestate, ma ancora quelle di spezie differenti. Si può

(1) *Memoires de Mr. Trembley, qui contient ses dernieres Découvertes sur différentes espèces de polypes à Beauquet. Ce Mémoire a été imprimé dans les Transactions Philosophiques.*

(2) Num. 197.

può innestare la testa , o la parte anteriore di un polipo sopra il corpo, o sopra la parte anteriore di un polipo di un'altra specie. Il polpo unico che verrà da questa unione, mangerà, crescerà, e moltiplicherà, come ogni altro polipo. Si vedranno uscire de' figliuoli, o sia dalla parte anteriore, o sia dalla posteriore (1). Se ciò che riporta un Autore, è sincero, i polpi *a branche* s'innesterebbono naturalmente per *avvicinamento*, come ho detto, che fanno alcune parti delle piante (2). Due rampolli, o due teneri polpi, che si spingeano molto da vicino l'un l'altro, essendo giunti a toccarsi, si sono innestati, ed essendosi poi staccati dalla lor madre, sono restati uniti per la coda, ed hanno mostrato di formare un polipo unico a due teste (3). Avvi un'altra maniera d'innestare i polpi, più singolare, e più difficile di quella, di cui ho fatta menzione. Ella consiste nell'introdurre un polpo per la sua coda nella bocca di un altro polpo, affondandovelo sino presso alla testa, raddoppiandolo, per così dire, e tenendovelo soggetto per qualche tempo. Si fa, che il corpo del polpo è una sorta di cannello: questi dunque sono due cannelli, presso a poco della stessa lunghezza, che s'inseriscono interamente l'uno nell'altro. Questa è, se si vuole, una specie d'innesto *a flauto*. Quando l'inserzione è fatta, non si vede che un sol polpo; ma la cui testa è molto più guernita di branche, che non lo è quella de' polpi comuni, poich'ella unisce nello stesso tempo le branche di due individui. Il polpo, che si è così forzato ad entrare in un altro polpo, vi si trova sconcio. Fa grandi sforzi

per

(1) *Memoires sur les Polypes a bras* par Mr. Tremblay, Mem. 4. in 3. Tom. 2. pag. 285. e seg.

(2) V. il num. 194.

(3) *Essai sur l'Histoire naturelle du polype insecte*, par Mr. Bracher pag. 84. 85.

per uscirne; e malgrado le precauzioni che si prendono per ritenervelo, spesso giugne a squarciare la pelle del polpo che lo racchiude, ed a separarsene o in tutto, o in parte. Questo innesto non pertanto qualche volta riesce: il polpo interiore resta nel polpo esteriore. Le due teste s'innestano l'una all'altra, e non ne compongono più che una sola, e questo polpo da principio doppio, ed in seguito unico, mangia, cresce, e moltiplica (1). L'*ortiche di mare* possono altresì *innestare*. Si possono riunire la metà di diverse ortiche; ma per assoggettarle, è necessario ricorrere alla cucitura (2).

203. *Altro esempio d'innesti animali: l'innesto dello sprone del Gallo sopra la Cresta.*

Noi abbiamo un altro esempio d'innesto animale, di cui dirò una parola. Dopo aver tagliata la cresta ad un gallo giovine, gli si sostituisce uno de' suoi sproni. Vi s'innesta, e diviene un corno di più pollici di lunghezza. Questo corno cade in seguito naturalmente o in tutto, o in parte, e si riproduce. Il meccanismo di questa caduta, e di questa riproduzione è semplicissimo. Il corno è composto di più cornetti incastrati gli uni negli altri, e che successivamente s'induriscono. I cornetti esterni s'induriscono i primi, e l'induramento incomincia sempre dalla cima del corno. Questa è già ossuta, mentre la base è tuttavia cartilaginosa. Quando i cornetti più esteriori hanno finito d'indurirsi, non possono più cedere all'impulsione di quelli di sotto, che tendono a prolungarli per tutti i versi. Si staccano,

(1) *Memoires sur les polypes à bras*, Mem. 4. in 8. Tom. 2 pag. 282.

(2) *Ibid.* Experience faite per Mr. de Villars, & rapportée dans une Lettre de Mr. de Reaumur à Mr. Trembley. Mem. sur les polypes Tom. 2. pag. 294. & 295. in 8.

cano, e cadono, ed un nuovo corno prende il luogo del vecchio (1).

204. *Rifutazione dell' opinione singolare di Vallisnieri sopra la formazione de' Bachi Tenia, o Solitarj.*

Prima che la sperienza avesse insegnato, che un animale potesse essere innestato, come una pianta; si era creduto, che il baco *Tenia* fosse formato di una serie di vermi, che s'innestassero in qualche guisa gli uni con gli altri. *Vallisnieri* quell'eccellente osservatore, che ha tanto arricchita la storia naturale, ha accreditato il primo questa strana opinione, e la sua autorità ha impegnati degl' illustri suffragj. Io ho osato di confutarlo in una Dissertazione, che l'Accademia Reale delle scienze ha pubblicata nel primo volume de' *Letterati stranieri*, e dovea comporre la terza parte della mia *Infettologia*. Ho seguitato questo Autore passo passo, ed ho fatto vedere quel, che egli ne ha imposto. Avvi luogo di maravigliarsi, che questo valente Naturalista si sia contentato di argomenti così fievoli, come son quelli, su' quali egli appoggia il suo sentimento. Essi possono ridursi a questi tre. Primo. Gli anelli del *Tenia*, dopo essere stati separati gli uni dagli altri, gli son paruti capaci de' medesimi movimenti, che sogliono fare i vermi senza gambe. Secondo. Egli crede avere scoperte nell'estremità anteriore di questi anelli due spezie d'uncinetti, i quali vadino ad inserirsi in due piccole fosse, che si osservano nell'estremità posteriore dell'anello, che precede. Terzo. Non ha potuto comprendere alcun vaso continuo da un canto all'altro del *Tenia*. Può vedersi nella mia Dissertazione

(1) Mr. Duhamel, *Memoires de l'Accademia Royale des sciences*, années 1746. 1751.

ne (1) la discussione di ciascuno di tali argomenti. Io mi contenterò di richiamare quì. Primo, che i membri di molti insetti conservano, dopo essere stati separati dall'animale, i medesimi moti, che avevano prima di essere stati separati. Secondo. Che questi pretesi uncinelli non son altro, che appendici carnose, incapaci delle funzioni, che dà loro l'Autore. Terzo, che si sono iniettati i vasi del *Tenia*, e che l'iniezione è passata senza interruzione da un'anello nell'altro. Ma quello, che finisce di dissipare i dubbj sono l'unità del *Tenia*, si è la scoperta, che ho fatta io, della sua testa. Si sà bene, quanto l'esistenza di questa testa abbia eccitate dispute tra' Naturalisti. Io ho provato, che ella è guernita di quattro capezzoli, o succhiatoj, di cui ho descritta la forma, e che sono situati nell'estremità di quel filo delicato, che compone la parte anteriore dell'insetto (2). Questo filo è formato di una serie di piccoli anelli che crescono di grandezza a gradi, a misura, che si scostano dal punto anteriore. Or, se il primo anello del *Tenia* ha delle parti, che non si trovano negli altri anelli; se queste parti sono atte per la loro struttura a fare l'ufizio di bocca, come negare la conseguenza naturale, che ne risulta, cioè, che il *Tenia* sia, come tutti i vermi, che noi conosciamo, un solo, ed unico animale? Il giudizio del Sig. Di Reaumur è di un sì gran peso in questa materia, ch'io non posso dispensarmi di quì trascriverlo. Io lo tratto da una Lettera, che mi fe l'onore di scrivermi il dì 17. d' Ago-

(1) *Dissertation sur le ver nommé en latin. Tenia, & en françois solitaire, où après avoir parlé de nouveau secret pour l'expulser des intestins dans le quels il est logé, qui a eu d'heureux succès, l'on donne quelques observations sur cet insecte.* Q. IV. Mem. de Math. & de Phil. présentés à l'Académie Royale des sciences par divers sçavants &c. par. 513. & suiv. Tom. I. in 4. 1750.

(2) Ibid. Addition, pag. 495. & 496.

Agosto dell'anno 1747. di cui ecco l'estratto. *L'osservazione, che voi non avevate ancora fatta, mentre scrivevate sopra la quarta Quistione, e che avete aggiunta alla vostra Lettera, decide meglio questa quistione, che tutti i buoni ragionamenti, co' quali voi confutate il sentimento del Vallisnieri. Dappoichè l'ultimo anello di uno degli estremi ha delle parti, che non si veggono neg'li altri anelli, e che queste parti son fatte come quelle, destinate a succhiare, resta già dimostrato, che questa lunga catena non è fatta tutta di una serie di anelli simili; e dappoichè l'ultimo della catena ha solo le parti atte a succhiare, non resta meno dimostrato, che quest'ultimo anello è incaricato di nudrire tutti gli altri, e che n'è insomma la testa. Ma quando io dico, che il Tenia non è formato di una serie di vermini, io non pretendo già, che i suoi anelli, separati l'uno dall'altro, e ravvicinati là nell'atto, non possano riunirsi, come segue alle porzioni di un polpo. Io ho mostrato nella mia Dissertazione, Quistione V. essere probabilissimo, che il Tenia ributti, dopo essere stato tagliato: potrebbe dunque rassembrare anche ad un polpo per quest'altra proprietà, di potere essere innestato. Il Sig. di Reaumur pare portato a crederlo; almeno questo è ciò, che mi è permesso inferire da un altro passo della sua Lettera. Mi pare, dic'egli, che non si possa appena negare, che i vermicucurbitini non si attacchino alle volte gli uni agli altri; io credo aver lette su questo delle osservazioni, che non oserei creder false; ma per crederle vere, io vorrei averle da voi. Voi non vi sareste già contentato di affermare il fatto, ma avreste esaminato, come questi vermini si uniscano, e se ciò sia con una regolarità, che possa dare apparenza di un verme composto di più anelli, se vi sieno delle irregolarità, che svelino la congiunzione fatta, per così dire ad arte. Io aggiugnerò nondimeno, che mi sembra difficilissimo, che l'innesto, di cui si par-*

la, possa farsi in un luogo tale, quale sono gl'intestini, dove i moti sono quasi continui, e gli ostacoli alla riunione sì moltiplicati. Il Sig. Trembley ha notato, che se le porzioni del polpo, che si vogliono riunire, e non si toccano esattamente, e non sono in una perfetta quiete, la loro riunione non si fa.

205. *Polipi rovesciati, e radrizzati. Fenomeni notabili, che seguono il rivoltamento incompleto.*

Io proseguo a raccontare de' prodigj. I polpi a *branche* ne hanno un altro da mostrarci; di cui non abbiamo ancora alcuno esempio nè nel regno vegetabile, nè nel regno animale. Essi possono essere rovesciati, come un guanto; e ciò, ch'è vero, e non solamente verisimile, i polpi così rovesciati, mangiano, crescono, e moltiplicano, come se non fossero stati rivoltati. Questa operazione, che non potea essere immaginata, ed eseguita, se non dal Sig. Trembley, fa dunque dell'esterno del polipo il suo interno, e dell'interno il suo esterno. Le pareti dello stomaco divengono così l'epiderme, e quel che prima era l'epiderme diviene le pareti di un nuovo stomaco. Non bisogna dimenticarsi, che tutto il polipo non è altro, che una specie di budello, o di sacco: l'operazione dunque consiste nel rovesciare questo sacco, e nel conservarlo in questo stato (1). Un polpo, che si rovescia, habene spesso de' figliuoli nascenti, attaccati alle sue costole. Dopo l'operazione questi figliuoli si veggono racchiusi nell'interno del sacco. Quelli, che hanno già preso un certo aumento, si stendono nello stomaco della Madre, e vanno ad uscirne della sua bocca, per quindi separarsene (2). Quelli al contrario, che son poco cresciuti si rovesciano da per loro

(1) *Mém. sur les polypes*, Mém. 4. edit. in 8. pag. 208. e segg. Tom. 2.

(2) *Ibid.* pag. 253.

loro stessi, e si pongono così nell'esterno della Madre, sulle coste della quale continuano ad urtare (1). Un polpo rovesciato più volte non cessa già di compiere tutte le sue funzioni. V'ha di più: Lo stesso polpo può essere successivamente tagliato, rovesciato, ritagliato, o rovesciato di nuovo, senza che l'economia animale, ne soffra il minimo che (2). Il polpo non ama di stare rovesciato; si sforza per mettersi nel suo primiero stato; si raddrizza in tutto, o in parte. S'impedisce di giugnervi, traforandolo vicino alla bocca con una setola di Cignale, nè questa specie di briglia nuoce ad alcuna delle funzioni dell'animale. I polpi, che si sono raddrizzati in parte, non son meno singolari di quelli, che restano rovesciati interamente. Qualche volta gli sforzi, che fa il polpo traforato per raddrizzarsi lacera un poco i suoi labbri, e questa piccola piaga dà luogo alla produzione di due teste, che da principio non hanno punto collo, e poi ne acquistano uno (3). Ma i Fenomeni più interessanti per lo più gli offrono i polpi rovesciati, lasciati a se stessi, e che sono giunti a raddrizzarsi in parte. Essi rivestono successivamente delle forme assai bizzarre, fanno delle produzioni in ogni genere, e di cui io non saprei dare un'idea esatta, senza ricorrere alle figure. Mi limiterò solo a qualcheduna. Quando un polpo incomincia a raddrizzarsi, rivolta la sua parte anteriore sopra la porzione del suo corpo, che rimane rovesciata. Quella s'applica, e s'innesta sopra questa. La pelle del polpo è come raddoppiata in questa parte. I labbri rispondono così al mezzo del corpo, il quale essi abbracciano, come una cintura

ra

(1) Ibid. pag. 226.

(2) Ibid. pag. 232.

(3) Ibid. pag. 224. e 225.

ra guernita di frange; queste frange sono le branche del polpo, rivolte allora verso il di lui estremo posteriore. Il polpo non ha dunque più, che la metà della sua lunghezza. Si stà attendendo, che egli vada a gittare una nuova testa al termine anteriore, a quel termine, dove la pelle ha il doppio di densità, di quel che abbia ordinariamente; a quel termine, in una parola, che è restato aperto; poichè il termine opposto è sempre chiuso: ma ecco, che segue tutt' altro: quì si rischia soventemente l'ingannarsi, volendo indovinar la natura; i polpi sono eccellenti maestri di Logica, che è necessario consultare. Non cerchiamo dunque d'indovinare, ed osserviamo solamente. L'estremità anteriore si chiude, diviene una coda soprannumeraria, che s'allunga di mano in mano. Che farà dunque questo polpo a due code, e senza testa? Come si nudrirà? Ma non diffidiamo de' mezzi, che la natura si è riserbati nell'economia maravigliosa degli insetti. Nel mezzo del corpo, presso gli antichi labbri, si forma non una sola bocca, ma più; e questo polpo, di cui noi dimandavamo, già un momento prima, come si sarebbe nudrito, ha in un tratto più organi perciò, di quel che sia d'uopo (1). Si sa, che la bocca de' polipi di questo genere è guernita di un gran numero di branche, che non son altro, che delicate fila, capaci di moti diversissimi, e che si allungano, e si scorciano a grado dell'animale. Con queste fila afferrano gl'insetti, de' quali si nutriscono. Le nuove bocche, che si formano presso gli antichi labbri, hanno talora uno de' loro canti guerniti delle antiche branche mentre dall'altro ne gittano delle nuove, da principio cortissime, e che giungono appoco appoco alla lunghezza delle antiche. Se sopra una di queste bocche si lascia cadere un piccolo insetto vivo,

(1) Ibid. pag. 238.

vivo, le branche subito lo afferrano, la bocca l'inghiottisce, ed il cibo si spande in tutto il corpo. Subito che il polpo è giunto a svolgersi in parte, resta steso per linea dritta. Ben presto però si piega; la porzione si volta, e raddirizzata incomincia a fare un angolo con quella, che rimane rovesciata. Quest'angolo diviene appoco appoco eguale. La bocca principale è alla sommità. Le due code del polpo sono le gambe dell'angolo. Esse prendono di giorno in giorno maggiore aumento, ed escono da amendue piccoli rampolli. In un polpo, che si era raddirizzato in parte, e quindi piegato, apparve un figliuolo nel termine anteriore della porzione, che era rimasta rovesciata; questo s'innestò, e compose con essa un sol polpo, tanto più singolare, quanto era formato di un figliuolo e di una porzione di sua madre, sopra la quale era innestato. (1).

206. *Prontezza delle riproduzioni ne' polpi.*

Del resto tutto s'opera ne' polpi assai prontamente. O che si taglino trasversalmente, o secondo la loro lunghezza; o che s'innestino, o che si rovescino, non fa loro di mestieri più che un giorno nell'estate, per potere fare, e compiere le loro funzioni. Essi moltiplicano tanto più, quanto più prendono di cibo, etanto più cibo prendono, quanto è più caldo. I polpi *a mazzo*, e quelli *a imbuto* si dividono in meno di un'ora (2).

207. *Riflessioni sulla bella storia de' polpi del Sig. Trembley, e sopra un passo dell'Istoria dell'Accademia di Prussia.*

Lo schizzo, che ho finora delineato, delle scoperte del Sig. Trembley, corrisponde tanto imperfet-

ca-

(1) *Memoires sur les polypes à bras &c.* Mem. 4. in 8. T. 3. pag. 256.

(2) *Ibid.* Mem. 3. e 4. *Memoires sur les polypes à Bouques.*

tamente alla tavola, che egli stesso ce n'hadipinta nelle sue belle memorie, ch'io non posso, se non rimandare il mio leggitore all'opera medesima. Io non so, cosa ammirarvi più, se le maraviglie, che essa racchiude, o la dottrina, colla quale è scritta. Io la proporrò con tutta fidanza a' naturalisti, come il miglior modello, ch'ei possano seguire, e come una Logica, nella quale debbano studiare l'artetropo poco conosciuta ancora di regularsi nella ricerca delle verità della natura. Io non posso finire questo Capitolo, senza rilevare un passo dell'Istoria dell'Accademia Reale delle scienze di Prussia, dell'anno 1745. In questo passo il celebre Istoriografo di questa dotta compagnia, il Sig. Formey, intraprende a provare, che la scoperta degl'insetti, che si moltiplicano per incisione, non è tanto nuova, quanto era apparita. „ Io osserverò, dic'egli (1), che per „ quanto maravigliosa sia la scoperta de' polpi non „ è però tanto nuova, quanto è paruta. Avvi in „ questo qualche cosa ben singolare, e ben notata „ nel piccolo Trattato *della cognizione delle bestie* „ (2) che pubblicò il Padre *Pardies* verso il fine „ del passato secolo. Vengo a trascriverne un passo, „ al quale mi sono maravigliato, che non si sia fatta „ maggiore attenzione. *Consideriamo uno di que' pic-* „ *coli animali a molti pièdi, simile a quello, di cui* „ *parla S. Agostino nel libro della Quantità dell'ani-* „ *ma. Questo Santo Dottore racconta, che uno de'* „ *suoi amici prese uno di questi animali, che lo pose* „ *sopra una tavola, e che lo divise in due, e che* „ *nel medesimo tempo queste due parti così tagliate si* „ *messero a camminare, ed a fuggire molto forte, l'* „ *una da una banda, l'altra dall'altra.... Ho fatto* „ *spes-*

(1) *Histoire de l'Academie de Prus.* 1745. pag. 84.

(2) Pag. 48. de l'edition de la Haye.

„ *spesse volte una simigliante sperienza , con molto*
 „ *piacere ; ed Aristotile dice , che ciò segue alla mag-*
 „ *gior parte degl' insetti lunghi a più piedi ; e dice*
 „ *ancora in un' altro passo , che segue quasi a certi*
 „ *animali ciò , che noi veggiamo negli alberi ; impe-*
 „ *rocchè siccome prendendo un rampollo , e trapian-*
 „ *tandolo , il veggiamo vivere , e di parte d' albero ,*
 „ *ch' era prima , divenire egli stesso un' Albero parti-*
 „ *colare ; così dice questo Filosofo , tagliando uno di*
 „ *questi animali , i pezzi , che per l' innanzi non*
 „ *faceano uniti , se non un solo animale , divengo-*
 „ *poi tanti animali separati . S. Agostino dice , che*
 „ *questa sperienza lo rapì d' ammirazione , e che re-*
 „ *stò qualche tempo , senza sapere , che pensare della*
 „ *natura dell' anima . Ecco , che si ha tutto di occa-*
 „ *sione di restar convinti della massima del favio ,*
 „ *cioè nulla esservi di nuovo sotto il Sole . “*

Io farò osservare dal canto mio ancora al Sig.
 Formey , che la scoperta di cui si tratta , non con-
 siste nel provare , che alcune porzioni di vermi del-
 la terra , di mille piedi ec. conservino la vita , il
 moto , dopo essere stati separati dall' animale . I
 Bambini ancora lo hanno saputo in ogni tempo . Ma
 si tratta di dimostrare con esperienze ben fatte , che
 ciascuna porzione acquisti ciò , che le manca , per es-
 sere un insetto perfetto , che ella gitta una testa ,
 delle branche , una coda ec. , che vi si sviluppano
 nuove viscere , un nuovo cuore , un nuovo stomaco ec.
 ed ecco ciò , che Aristotile , S. Agostino , ed il P. Par-
 dies non hanno veduto , e non hanno ne pure cerca-
 to di vedere . Essi non hanno parlato , che di un pic-
 colo fatto , assai notevole per verità , e che era sotto
 gli occhi di tutto il Mondo ; e quando Aristotile con-
 chiude questo fatto , che certi insetti moltiplicano per
 incisione , come le piante , la sua conclusione è gitta-
 ta a rischio , perchè ella non s' appoggia ad alcuna
 prova : imperocchè qual conseguenza tirare dalla con-
 fer-

servazione della vita , e del moto nelle parti dell' insetto diviso , alla riproduzione di una testa , di un cervello , di un cuore ec. Una vespa tagliata per mezzo il corpo , continua a andare , ed il suo ventre spigne l' ago , come farebbe la vespa medesima . Sarebb' egli ben fondato il conchiuderne , che la vespa moltiplica per incisione ? La conchiusione sarebbe falsissima . La massima del savio non ha quì la sua applicazione . Il *rovesciamento* , e l' *innesto* de' polpi non son' ora conosciuti per qualche cosa di nuovo sotto il Sole ? E quante maraviglie sconosciute al savio , ed agli antichi , hanno a noi svelate i nostri strumenti , ed il nostro metodo ? Nel render giustizia agli antichi , è d' uopo schifare il far torto a' moderni .

C A P I T O L O XII.

Riflessioni sopra la scoperta de' polpi , sopra la scala degli esseri naturali , e sopra le regole pretese generali . Esposizione abbreviata di varj fatti concernenti i vegetabili , e con questa occasione , dell' analogia degli alberi , e degli ossi . Saggio di spiegazione di questi fatti .

208. Che noi siamo meglio disposti , per ispiegare le maraviglie de' polpi , che non si era a tempo della loro scoperta . Riflessioni sopra le cagioni , che hanno ritardata questa scoperta .

ORa che siamo alquanto rinvenuti dall' eccesso d' ammirazione , nel quale ci aveano gittati i polpi , e che siamo in istato di paragonare fatti d' ogni genere , noi possiamo incominciare a ragionare sopra la generazione , e sopra la riproduzione di questi insetti .

Finchè i naturalisti non hanno avuto per la testa ,

sta, se non li modelli degli animali più conosciuti, non poteano credere, che fosse stato accordato all'animale il moltiplicarsi per vie, che erano sempre parute proprie del vegetabile. Usi erano nonper- tanto de' fatti ben contestati, che invitavano a fare in questo genere delle nuove sperienze. Si sono veduti cento, e cento volte de' vermini di terra de' mille piedi ec. le cui porzioni separate conti- nuavano a vivere, ed a muoversi. Era senza dubbio naturalissimo il procurare di scoprire ciò, che dive- nivano queste porzioni e se riproducevano la specie. Ma quando si conosce la forza de' pregiudizj, non è da maravigliare, che da Aristotile fino al Sig. Trem- bley, nessuno abbia tentata un'esperienza sì facile. Gli antichi, ed i moderni conoscevano pertanto de- gli animali, che molto si scostano dagli altri, per la loro maniera di crescere, voglio dire, degli insetti, che si *trasformano*. Era, e pare, cosa molto sempli- ce il tirarne questa conseguenza, che non bisognava giudicare di tutti gli animali da quelli che erano i più conosciuti; e questa conseguenza dovea condur- re ad abbandonare quì l'analogia per abbandonarsi all'esperienza. Contuttociò questo non è seguito. L'idea di un'animale, che rinasce dall'incisione era per tutti i Fisici una sorta di contradizione, e non si pensa mai ad impugnare una contradizione colle sperienze. Ma i pregiudizj, e gli errori medesimi sono talora utili. Il pregiudizio sopra l'impossibili- tà della moltiplicazione di un animale per incisio- ne, che sembrava, non essere atto, che a dilun- garci sempre dall'esperienza, questo pregiudizio, dico, è ciò precisamente che è costata al Sig. Trem- bley la sua bella scoperta. Egli n'era imbevuto, come tutti gli altri naturalisti; e fu per assicurarsi, se il suo polpo fosse una pianta, o un animale, che avvertì di partirlo. Ne fa egli stesso la modesta con-
fessio-

fessione nelle sue memorie (1). „ L'idea, dic' egli,
 „ nella quale siamo stati, che nissuno animale po-
 „ tesse essere moltiplicato per incisione, non pare-
 „ atta, che a far perdere le occasioni di scoprire la
 „ proprietà, che si è trovata ne' polipi, quando so-
 „ no stati tagliati; contuttociò è seguito per un acci-
 „ dente assai singolare, perchè questa idea ha anzi
 „ molto contribuito a tale scoperta; imperocchè io
 „ non ne ho intrapresa l'esperienza, di cui quella
 „ n'è stata una conseguenza, se non perchè ho sup-
 „ posto, che i pezzi di un animale non potessero
 „ divenire animali completi. “

209. *Che il polpo mette in chiaro la gradazione, che è tra tutte le parti della natura. Estratto di una lettera di Leibnitz, che prova, aver egli sospettata l'esistenza di questo insetto. Riflessioni sopra la scala degli esseri naturali pubblicata dall'Autore.*

La scoperta del Sig. Trembley ha molto estese le nostre cognizioni intorno al *sistema organico*. Ella ha messo per così dire, in chiaro quella gradazione maravigliosa, che alcuni filosofanti aveano conceputa nelle produzioni naturali. Leibnitz avea detto, che *la natura non va per salti*; ed è molto notabile, che la Metafisica di questo grand'uomo l'abbia condotto a credere l'esistenza di un'essere tale, qual'è il polpo. „ Gli uomini, scriveva egli al suo ami-
 „ co Ermanno (2), tirano dagli animali, questi
 „ dalle piante, e queste di nuovo da' fossili, che si
 „ legarono dal canto loro a' corpi, che i sensi, e l'
 „ immaginazione ci rappresentano, come perfetta-
 „ men-

(1) *Memoires pour servir a l'Histoire des polypes a bras*, pag. 328. Tom. 2. in 8.

(2) *Appel au public* par Mr. Koenig, Leide, chez Eliè Luzac, 1752. pag. 44. & suiv.

„ mente morti , ed infermi . Or poichè la legge
 „ della continuità esige , che *quando le determina-*
 „ *zioni esserziali di un essere si accostano a quelle*
 „ *di un altro , così per conseguenza tutte le proprie-*
 „ *tà del primo debbano appressarsi gradualmente a*
 „ *quelle dell'ultimo* , egli è necessario , che tutti gli
 „ ordini degli esseri naturali non formino , che una
 „ sola catena ; nella quale le classi differenti , come
 „ altrettanti anelli s'attengono sì strettamente gli
 „ uni agli altri , che è impossibile a' sensi , ed alla
 „ immaginazione il fissare precisamente il punto ,
 „ ove alcuno di loro incomincia , o dove finisce ;
 „ dovendo tutte le spezie che circondano , o che
 „ occupano , per così dire , le regioni dell'inflessio-
 „ ni , e di risalimento , essere equivoche , e dotate
 „ di caratteri , che possono egualmente riportarsi
 „ alle spezie vicine . Così l'esistenza de' Zoofiti ,
 „ per esempio , o come Buddeo li chiama , delle
 „ *pianze animali* , non ha nulla di mostruoso ; ma
 „ è anzi convenevole all'ordine della natura , che
 „ vi sieno . E tale è la forza del principio di con-
 „ tinuità presso di me , che non solamente non fa-
 „ rei punto sbigottito dal concepire , che si fossero
 „ trovati degli esseri , che per rapporto a moltè
 „ proprietà , per esempio , a quelle di nutrirsi , o
 „ di moltiplicarsi , potessero passare per vegetabili
 „ tanto giusta ragione , quanto per animali , e che
 „ rovesciassero le regole comuni , fondate sopra la
 „ supposizione di una perfetta separazione , ed as-
 „ soluta da' diversi ordini degli esseri simultanei ,
 „ che riempiono l'universo ; io non sarei , dico , sì
 „ poco sbigottito , quanto sono altresì convinto ,
 „ che debbano esservene alcuni , che l'istoria na-
 „ turale giugnerà forse a conoscere un dì , quando
 „ ella avrà studiato più questa infinità d'esseri vi-
 „ venti , che ruba alle comuni osservazioni la picco-
 „ lezza loro , e che si trovano fitti nelle viscere del-

„ la terra , e nell'abisso dell'acque . Solamente da
 „ jeri in quà noi offerviamo , come siamo per es-
 „ sere ben fondati a negare alla ragione ciò , che
 „ non abbiamo ancora avuta occasione di vedere . “

Di rado la metafisica è tanto felice , che possa indovinare la natura . La specie di predizione , che avea ispirata a Leibnitz , si è adempiuta . Il polpo è stato scoperto nell'acque , e i due regni *organici* si sono uniti . Preso da questa catena , io arrischiavi nel 1744. d'alzare una scala di esseri naturali , che può vedersi al fine della Prefazione del mio *Trattato d'Insettologia* . Io non la diedi allora , che per quello , che era in effetto , voglio dire per un debole sbozzo , nè ora ne penso più favorevolmente . Avvi certamente una gradazione naturale nella natura ; ed assai fatti concorrono a stabilirla . Ma noi altro non facciamo , se non che traspirare questa gradazione , nè conosciamo , che un piccolo numero di termini . Per prenderla in tutta la sua estensione , bisognerebbe avere esaurita la natura , e noi altro fatto non abbiamo finora , che sfiorarla , o , come dice Leibnitz , noi non l'offerviamo , che da jeri in quà . Se il polpo ci mostra il passaggio dal vegetabile all'animale , dall'altro canto noi non ne scopriamo quello del animale al vegetabile . Quella natura ci sembra fare un salto ; la gradazione è per noi interrotta , poichè l'organizzazione apparente di alcune pietre , e delle cristallizzazioni , non corrisponde , se non assai imperfettamente a quelle delle piante .

210. Osservazioni sopra il sentimento del Sig. Bourguet e di alcuni altri Autori , riguardo alla pretesa organizzazione de' sali , de' cristalli , e delle pietre . Che noi ignoriamo il passaggio dal fossile al vegetabile .

Un letterato degno di stima , la cui immaginazione si è compiaciuta di tutto organizzare , ha voluto farci ravvisare i *sali* , ed i *cristalli* , come tanti tutti organici , che legano il minerale col vegetabi-

tabile (1). Egli avea fatte curiose ricerche sulla loro formazione, che l'aveano condotto a riconoscere una maravigliosa regolarità. Egli avea scoperto, che il *cristallo* è formato della ripetizione di un numero pressochè infinito di triangoli, che rappresentano, per così dire il tutto in molto piccolo. Ma il cristallo, come tutti i corpi *minerali*, si forma *per apposizione*, ed un corpo organizzato non si forma già, a parlar propriamente, ma egli è *preformato*, e non fa altro, che svilupparsi. Le molecole triangolari, che sono gli elementi sensibili del cristallo, si dispongono, e si uniscono per le sole leggi di moti, e di contatto. Gli atomi nutritivi si dispongono, e si uniscono nel tutto organico, conformemente alle leggi di una organizzazione primitiva. Quindi gli atomi nutritivi non formano il tutto organico; ma ajutano al suo sviluppo. Io rimando intorno a questo a quanto ho esposto nel Capitolo VI. ed in particolare nell' ultimo paragrafo del Capitolo X. Sarebbe adunque un abusare della significazione della parola *organizzazione*, il volerle applicare al cristallo, a' sali, ed agli altri corpi minerali, ne' quali si scopre una costante regolarità. Paragonare un sale, od un cristallo ad una pianta, egli è paragonare una piramide ad una macchina idraulica. Vi ha anche molta distanza dal corpo minerale più perfetto alla pianta meno elevata nella scala. Ma forse nuove osservazioni verranno un giorno a riempire questo voto. Se le pretese piante marine, che si sono appellate *pietrose*, fossero in effetto *piante*, la catena parrebbe quasi così continua dal minerale al vegetabile, come

(1) *Lettres Philosophiques sur la formation des seix, & des cristaux, e sur la generation, e le mecanisme organique des plantes, & des animaux ec.* par Mons. Bourguet, a Amsterdam chez Francois l' Honoré 1729. in 8. pag. 57. e 58.

come lo è dal vegetabile all'animale ; ma si è veduto quì sopra all'articolo 188. ciò , che dee pensarsi di queste produzioni marine . Contuttociò quando vi fossero delle piante veramente *pietrose* , se queste piante non differissero dall'altre , che per la natura de' loro fughi , questa differenza sarebbe assai leggiera , in comparazione di quella , che l'organizzazione mette tra il vegetabile ed il minerale . Questo è egli contenuto originalmente in un germe ? Si riguarderann'elleno le piccole piramidi de' sali , e de' cristalli , come altrettanti germi ? Ciò sarebbe un allontanarsi troppo dall'idea , che si ha del termine *germe* , e che io mi sono sforzato di ben diffinire in quest'opera . Così vi sarebbe quasi anche bastante fondamento di dire , che la natura passi dal minerale all'animale ; perchè si è scoperta una moltitudine di conchiglie ; delle quali è composto interiormente , ed esteriormente tutto il corpo de' piccoli cristalli . (1). Niente prova meglio , quanto possa la prevenzione a favore di un sistema , quanto la persuasione , nella quale era Tournefort , che le pietre vegetassero . Si fa ciò , che avea fatto credere la prevenzione a questo valent'uomo , e prima di lui , a Teofrasto , a Peiresc , e poi ad altri (2). Ora le pietre non vegetano più , e l'arte le imita ; mache dico , le imita ? agguaglia anzi in questo fatto la natura . Un Fisico è giunto , per una via semplicissima a fare delle selci artificiali , simili in tutto alle selci naturali (3). Concludiamo dunque , che noi ignoriamo ancora , per quali gradi la natura s'innalzi dal minerale al vegetabile , e qual
sia

(1) Savammerdam ha descritto questo ammasso di Conchiglie singolare nella sua magnifica bibliotheca della natura, *concha, vivipara mirabilis* .

(2) *Voyage au Levant. Hist. de l'Acad. 1708. obs. curieuses sur la Phys.* Tom. I. pag. 419. e seg. 1730.

(3) Il Sig. Bazin. *Hist. de l'Acad. 1730. pag. 1. e 2.*

sia il legame, che unisce l'aumento *per apposizione* a quello *per intussuscezione*. Il minerale non lavora i luoghi, de' quali è formato: il vegetabile si assimila quelli, de' quali è nudrito. Ma non diciamo per questo, esservi quì un salto, una lacuna: la lacuna non è, se non nelle nostre attuali cognizioni.

211. *Osservazioni intorno all' opinione del Sig. Di Maupertuis, sopra la pretesa realtà delle interruzioni nella scala degli esseri naturali. Riflessioni sopra i progressi dello spirito umano nelle ricerche fisiche.*

Fu il Sig. Di Maupertuis a pensare diversamente. Egli ha creduto, che l'avvicinamento di una avesse distrutta una parte delle spezie, e che quindi ne risultassero quelle interruzioni, che noi ritroviamo nella scala (1) • ma prima di cercare una cagione a questi interrompimenti, bisognava essersi assicurati nella loro realtà. Finchè era ancora ignoto il *polipo*, sembrava mancare un'anello alla catena. Leibnitz osò predire, che questo anello si sarebbe scoperto, e non credette punto, che una cometa l'avesse distrutto. Che si penserebbe mai di un fisico, che non facendo altro, che entrare in un ricco gabinetto d'Istoria naturale, s'impegnasse a pronunziare, che le *serie* non ne fossero complete? Quante spezie, o anella, delle quali non dubitiamo punto dell'esistenza, e che pure qualche felice accidente, o qualche nuova ricerca potranno forse scoprirci! Osservate i progressi della Fisica, e dell'Istoria naturale dopo il rinascimento delle lettere: quante verità sconosciute agli antichi, e quante conseguenze sicure da tirarsi da queste verità! Non saprebbe dirsi, quali sieno i confini dell'intelletto umano in materia di sperienza, e d'osservazione; perchè dir non potrebbe quel che possa, o non possa lo spirito d'invenzione. L'antichità
potea

(1) *Essai de Chronologie*; Leide, chez Elie Luzac, 1751
pag. 54. & suiv.

potea ella indovinare l'anello di Saturno, le maraviglie dell'elettricità, quelle della luce, gli animalculi dell'infusioni ec. L'invenzione di alcuni strumenti ci ha guadagnate tutte queste verità; e non potranno un dì perfezionare questi strumenti, ed inventarsene de' nuovi, che porteranno le nostre cognizioni molto di là dal termine, che ora le veggiamo? L'istoria naturale è tuttora nell'infanzia; quando ella avrà toccata l'età della perfezione, voglio dire, quando s'avrà la nomenclatura esatta di tutte le spezie, che contiene il nostro globo, allora, e solamente allora potrà dirsi, se la scala degli esseri naturali sia realmente interrotta. Aspettando, invece di supporre, che una cometa abbia rotta la catena del nostro Mondo si anteporrà senza dubbio il pensare, che se ella ha precorso qualche cosa, ciò sia stato al più cervello troppo mobile dell'Autore. Questo globo, dove egli non vede, che un *ammasso di ruine*, è pe' veri Architetti un'edifizio regolatissimo, e di cui tutte le parti sono strettamente legate con rapporti, che si scorgono dappoichè non si ha interesse alcuno a non vederli. *La maggior parte degli esseri non sembrano* al Sig. di Mau-
perruis, *che come tanti mostri*: egli non trova che *oscurità nelle nostre cognizioni*: *la terra gli pare un edifizio percosso dal fulmine*. Io non mi maraviglio, che un uomo, che vedeva tante mostruosità nelle cose particolari, abbia impugnato i *fini*, ed abbia loro sostituita la legge della *minimità* (1). Io son molto lontano dal procurare d'infievolire la prova, che questa Legge si cara all'Autore gli somministra a favore dell'esistenza di Dio; ma credo bene, che il senso comune confesserà sempre, che l'*occhio è stato fatto per vedere*, e non credo, che questa prova la ceda in evidenza a quella, che può tirarsi dalla considerazione di una legge della natura.

(1) Ibid. *Avant propos.* pag. 12. e 13. & suiv.

212. *Lumi , che i polpi possono spandere sopra diversi punti di Fisiologia.*

Non solamente la scoperta de' polpi conduce ad ammettere una gradazione nelle produzioni naturali ; ma può anche contribuire allo schiarimento di molti punti interessanti di Fisiologia. Grandi anatomici, che hanno meditati i polpi, un Albino, un Aller, fanno tutto quello , che può somministrare questo ramo secondo dell'anatomia *acquistata*. Mille cose vi sono nel corpo umano , sopra le quali la riproduzione de' polipi dà lume. Le fibre elementari, simili in qualche guisa a questi insetti, si riproducono così nelle piaghe di ogni genere, e la loro riproduzione diviene più facile a concepirsi, allorchè si paragona a quella de' polpi, e di altri insetti, che possono essere innestati, e moltiplicati per incisione. Le sperienze, che si tentano su questi animali, possono ancora servire a rischiarare le grandi quistioni, che ci offeriscono la *sensibilità*, e l'*irritabilità* (1). Finalmente io mostrerò altrove, che la scoperta, di cui parlo, concorre a sminuire le tenebre, che coprono la prima origine degli esseri organizzati.

213. *Che i polpi c' insegnano a diffidare delle regole generali . Riflessioni sopra l' uso e sopra l' abuso dell' analogia.*

Ma questa scoperta ci dà sopra tutto l'importante lezione di diffidare delle regole generali , e di usare sobriamente dell' analogia. La natura ha certamente delle leggi costanti ; la conservazione del sistema le suppone . Alcuni valenti genj ci hanno scoperte alcune di queste leggi : e quante ve ne sono, che tuttora ignoriamo ! Quante forze, quante proprietà, quante modificazioni della materia, che s'in-

(1) Vedi l'opera del Sig. De Haller, che ha per titolo *Memoires sur les parties sensibles , & irritables du corps animal*, Tom. 4. *Response a Mr. VVhytt*. Lausanne 1760.

s' involano a' nostri sensi, ed al nostro intendimento! si è voluto giudicare della totalità degli esseri da un piccol numero d'individui. Da casi particolari si sono tratte delle conclusioni generali. Vi è stato l'impegno di fare delle regole, prima di avere studiati gli esseri, che gratuitamente si supponevano essere a quelle sottoposti. Era un'aver fatto molto, l'aver dimostrata la falsità delle generazioni *equivocate*; ma si era andato troppo avanti, quando se n'era quindi inferito, che ogni generazione esigeva il concorso de' due sessi. Il *gorgoglione* è venuto a smentire questa regola, pretesa generale. Si era riguardato come un carattere distintivo dal vegetabile la proprietà di poter essere moltiplicato per incisione: il polpo ci ha insegnato, che questa proprietà è comune ad un gran numero di spezie d'insetti. Si son divisi gli animali in due classi generali; in *vivipari*, ed in *ovipari*, ma ora noi conosciamo degli animali, che sono vivipari in un tempo, ed ovipari in un' altro. Noi ne conosciamo ancora di quelli, che non son nè vivipari, nè ovipari; mache moltiplicano dividendosi, e suddividendosi naturalmente. Finalmente perchè si veda il sangue *circolare* ne' grandi animali, si è concluso, ch'è circolasse in tutti, e si è stesa questa conclusione fino alle piante. Contuttociò la *tellina*, ed il *polpo* non ci danno niente, che abbia rapporto al sistema della circolazione, ed ho mostrato nella quinta memoria delle mie *ricerche sopra l'uso delle foglie nelle piante* quanto probabile cosa sia, che troppo siasi dato all'analogia, quando si è sostenuta la circolazione del sugo. Ci manca una *Logica*, che farebbe infinitamente utile, non solamente nelle scienze fisiche, ma ancora nelle morali; voglio dire, di un *Trattato dell'uso, e dell'abuso dell'analogia*. Iovi aggiugnerei principj dell'*arte d'osservare*, quell'arte sì universale, e da cui io trarrei i pre-

cetti, e gli esempli ne'gran maestri, che ci hanno scoperte tante verità. Vorrei, che quest'opera fosse l'istoria del progresso del loro spirito nella scoperta di queste verità. Se l'analogia ci fa qualche volta smarrire, ella può anche condurci al termine. Il segreto del metodo analogico consiste principalmente a raunare sopra ciascun genere i più de' fatti, che sia possibile, a paragonargli, a combinarli, ed a rendersi attenti alle conseguenze, che ne derivano più immediatamente. L'ipotesi, che rischiarerà il lato oscuro del fenomeno, dee nascere dalla collezione di queste conseguenze.

214. *Introduzione al saggio di spiegazione delle riproduzioni vegetabili, ed animali.*

Mi voglio provare, secondo questi principj, a spiegare in una maniera, che soddisfaccia, ciò, che concerne gl'innesti, e le incisioni, o sia de' vegetabili, o sia degli animali, e generalmente tutti i fatti, che ho esposti nel Capitolo precedente. Io mi sono già occupato nel Capitolo IV., ma debbo ora trattare più in particolare ciò, che ho considerato solamente d'affai lontano, e penetrare, per quanto ne son capace, un soggetto sì degno delle ricerche di un Fisico. Io incomincerò da' vegetabili, perchè sono generalmente più conosciuti, e più facili a osservare. Io esporrò qualche nuovo fatto, e svilupperò un poco quelli, che ho soltanto indicati.

215. *Delle piaghe degli alberi, e di ciò, che segue nella loro consolidazione.*

Se si fa una piaga a un albero, togliendone un pezzetto di scorza; e se si scopre così il legno vivo, n'esciranno degli strati più interni della scorza, o se si vuole, tralla scorza, ed il legno, un cordone verdastro. Questo cordone si farà vedere da principio nella parte superiore della piaga; poi sulle coste, e finalmente nella parte inferiore, dove rimarrà sempre

più piccolo, che nella parte superiore. Questo sarà una nuova scorza, che si stenderà insensibilmente sopra del legno, e lo ricoprirà appoco appoco; ma senza unirsi mai al medesimo. Il legno servirà soltanto d'appoggio alla nuova scorza, e se questo appoggio venisse a lei a mancare, la piaga non si cicatrizzerebbe più. Ecco ciò, che segue nelle piaghe, che si lasciano allo scoperto: il legno non vi fa alcuna produzione, perchè si secca. Se si previene questo disseccamento, chiudendo la piaga in un cannello di cristallo, che ponga il legno al libero contatto dell'aria, esso concorrerà a formare la cicatrice. Si vedrà allora uscire dall'alto della piaga un cordone galloso, che in seguito si farà vedere dalle bande, e nella parte inferiore. Poco dopo si osserveranno quà e là sopra la superficie de' piccoli bottoni gelatinosi, ed isolati, che sembreranno nascere dagl'interstizj delle fibre della sugna dell'albero, ch'erano rimaste attaccate al legno. Si osserveranno ancora in diverse parti della superficie del legno delle piccole macchie rosse, che si riconosceranno ben presto per membrane, o per istrati nascenti. Si vedranno quindi condensarsi a gradi. Alcune produzioni granulose, biancastre, mezzo trasparenti, gelatinose, parranno sollevare le fogliette membranose. Questa materia gelatinosa diverrà bigiccia, poi verde; e tutte queste produzioni prolungandosi dall'alto al basso ricopriranno la piaga, e formeranno la cicatrice. Questa cicatrice non sarà liscia, ma come ella risulterà dall'unione di molte parti, che erano da principio isolate, vi si scopriranno molte ineguaglianze. Se in vece di togliere semplicemente un pezzetto di scorza, si faccia al tronco un' incisione annulare, che penetri fino al legno, la piaga si cicatrizzerà un poco diversamente. E' nascerà, come ordinariamente avviene, un cordone corticale, che tenderà a ricoprire il legno, ma que-

questo cordone non uscirà , se non dalla parte superiore della piaga (1).

216. *Legge della consolidazione delle piaghe vegetabili. Risultati generali.*

La riunione delle piaghe degli alberi segue dunque delle leggi costanti. Quello che più somministra alla riparazione è il labbro superiore della piaga; ed in certe circostanze la fa egli solo. Le fibre, che sviluppandosi ricoprono appoco appoco il legno, tendono a prolungarsi da alto a basso. Esse rassomigliano da principio una sostanza mucilaggiosa; divengono poi erbacee, e finalmente corticali, o legnose, come ho detto altrove (Art. 169.) Si è veduto quì sopra (2), (VI. Fatto), che nel principio dell' incubazione le viscere del pulcino sono quasi fluide, e che questa sorta di fluidità, che non è che apparente, nasconde una vera organizzazione. Una sperienza dimostra, esser lo stesso dello stato di mucilaggine, cui sembranoda principio rivestire le fibre degli alberi. Se si riempie d' acqua il cannello di cristallo, nel quale, si racchiude la piaga, la mucilagine non vi si discioglierà punto, e la piaga si cicatrizzerà. Questa mucilagine dunque è solamente apparente, ed essenzialmente ell' è organizzata (3).

217. *Sperienza che conferma la produzione di un nuovo legno.*

Noi abbiamo veduto, che il legno può in certe circostanze produrre una nuova scorza, la scorza può altresì in certe circostanze produrre un nuovo legno. Se si applichi sopra il legno già scoperto un foglio di carta, o di stame, e si rimetta diligentemen-

(1) *Physique des arbres* par Mr. Duhamel lib. 4. cap. 3. art. 3. & 5.

(2) Art. 147.

(3) *Physique des Arbres* Liv. 4. Chap. 3. art. 2. §. 7.

mente sul luogo il pezzetto di scorza , che si era staccato , questo s' innesterà alle parti vicine , per lo prolungamento reciproco delle fibre laterali , ed in termine di qualche tempo si troverà il foglio di carta ricoperto di un nuovo strato legnoso (1).

218. *Che il legno perfetto è incapace di fare nuove produzioni. Ordine, e progressi dell'indurimento ne' diversi strati.*

Ma quando si dice , che il legno può fare delle produzioni , questo dee soltanto intendersi del legno ancora imperfetto , o che non ha finito d'indurirsi. Imperocchè , come la fibra *animale* divenuta *osso* non si stende più , così ancora la fibra *vegetabile* divenuta *legnosa* non è più suscettibile di aumento . Io ho insistito su questo nel Capitolo X. Ivi ho fatto osservare , che un'albero è un composto di un numero infinito di conj inseriti l' uno nell' altro. Di fatto si vede a occhio , che il tronco , ed i rami sono tanti conj assai prolungati. I conj più interni s' induriscono i primi ec. Quindi alla base , ed al centro di un'albero di cent'anni avvi un cono legnoso di cent'anni ; mentre alle cime dello stelo , e de' rami non vi sono , se non conj di un'anno . Bisogna dunque rappresentarsi ciascun cono legnoso , o destinato a divenir legnoso , come formato egli stesso di un gran numero di lamine infinitamente minute , delle quali l'une sono già indurite , e l'altre sono ancora capaci di fare delle produzioni . Quando si dice che la scorza può produrre nuovo legno , questo dee solamente intendersi della parte della scorza , che è la più interna , o la più vicina al legno . Se si toglie una lama di scorza , che abbia poco densità , quel che si riprodurrà in luogo di essa sarà scorza.

219.

219. *La sugna dell'albero , sua natura ,
e sue funzioni.*

La *sugna* dell'albero , quella sostanza bianca , posta tra la vera scorza ed il vero legno , è un legno imperfetto , o che non ha ancora acquistato il grado di consistenza propria del legno perfetto. Si potrebbe paragonare la *sugna* alla cartilagine , che ha da divenire osso ; questo è uno stato di mezzo , pel quale passa il legno , passando da quello di scorza , per giugnere al suo stato di perfezione. La durezza di questo stato di mezzo è proporzionale al vigore del soggetto ; ed è tanto più breve , quanto è più vigoroso. La densità , ed il numero degli strati della *sugna* osservano la stessa proporzione ; essi sono tanto più densi , e tanto meno numerosi , quanto ha più di vigore il soggetto. La più gran densità degli strati della *sugna* risulta dunque dal più grande aumento delle lamine ; la diminuzione del numero degli strati risulta dalla prontezza , colla quale le lamine si convertono in legno (1).

Se si riguardano gli strati più esteriori della *sugna* , come componenti parte della scorza , farà vero il dire , che questa parte della scorza possa divenire vero legno. Ma è un fatto certo , che gli strati corticali che non attengono punto alla *sugna* , non si convertono mai in legno. Se dunque si toglie via qualcuno di questi strati , la piaga si cicatrizza per la produzione di nuovi strati puramente corticali (2).

220. *Differenze caratteristiche tra la struttura del legno , e quella della scorza. Che non v'è vera conversione della scorza nel legno. Ragioni di que-*

(1) *Physiq. des Arbres* Liv. 1. Chap. 3. art. 6.

(2) *Ibid.* Liv. 4. Chap. 3. §. 8.

questa asserzione. Scioglimento di una difficoltà del Sig. Duhamel.

Ma non solamente per la sua densità , e per la sua durezza differisce il legno dalla scorza ; egli differisce ancora per caratteri più essenziali : egli ha degli organi , che non si sono fin quì trovati nella scorza . Si sa , che le *trachee* delle piante sono canaletti formati di una lamina elastica , torta a spirale a guisa di un ordigno *ad anelli* ; la conformità perfetta di queste trachee con quelle degl'insetti suppone nelle une , e nell'altre le stesse funzioni . Ora non vi sono , se non gli strati legnosi , o destinati ad esser tali , che abbiano delle trachee . La sugna ha dunque delle trachee , e la scorza propriamente detta non ne ha . Finalmente il legno ha delle funzioni che gli son proprie , e queste funzioni dipendono dall'azione de' vasi , de' quali è sprovvista la scorza . Io ho provato molto a lungo nell'ultima memoria del mio libro *sopra l'uso delle foglie nelle piante* , che il sugo non s'innalza , se non per le fibre legnose . Elle son dunque i cannelli destinati a portare il sugo nutritivo a tutte le parti ; e se io non ho mai visto questo sugo salire per la scorza , questa è una prova , ch'ella è sprovvista di questi cannelli . Vi ha di più ; quando io ho spogliati alcuni rami della loro scorza , i liquori coloriti non hanno lasciato di sollevarvisi colla stessa rapidità che ne' rami guarniti della loro scorza (1). Così , come il cambiamento del bruco nella farfalla non è una vera *metamorfosi* , (2) , così il cambiamento della scorza in legno non è una vera *conversione* . Il legno è essenzialmente nella sua origine ciò che sempre sarà , e non è meno legno quando si mostra tale a noi sotto l'apparenza in-

(1) *Recherches sur l'usage des Feuilles dans les Plantes* : Art. 90.

(2) Vedi sopra num. 160. 161.

ingannevole di una *mucilagine*, che allorchè resiste al taglio dell'ascia, o che sostiene i più gran pesi. Se dunque la scorza pare in tante circostanze produrre del nuovo legno, non è perciò ch'ella si converta realmente in legno; ma alcune fibre originalmente legnose, nascoste sotto la scorza, e che senza queste circostanze non si farebbono sviluppate, si sviluppano, e somministrano nuovi strati legnosi. Su questi principj mi proverei a risolvere la difficoltà che il Sig. Duhamel si propose alla pag. 47. della seconda parte del suo eccellente libro sopra la *Fisica degli Alberi*. „ Nondimeno, dic' egli, se l'eterogeneità degli strati destinati ad essere legnosi, o „ corticali, fosse provata, come concepire, che lo „ stesso organo ch'è il tronco, possa formare nel „ medesimo luogo, tralla scorza ed il legno, delle „ produzioni sì diverse? Questa è una difficoltà, „ che merita l'attenzione de' Fisici “

221. *Analogia tra la formazione del legno, e quella degli ossi, secondo l'idea del Sig. Duhamel.*

Si può paragonare il corpo legnoso agli ossi. Esso è rivestito della scorza siccome quelli lo sono del perioftio. Sembrano staccarsi dalla scorza sottili lame per somministrare l'accrescimento, e la riparazione del corpo legnoso. Quindi quegli strati annuali, e concentrici che si osservano sopra il taglio orizzontale del tronco. Sembrano altresì staccarsi delle sottili lame dal perioftio per somministrar l'aumento, e la riparazione dell'osso. Quest'analogia è stata per molti anni l'oggetto delle profonde ricerche del Sig. Duhamel, ed ei l'ha seguitata con una grandissima sagacità (1). Il mio disegno non è di trattare quì a fondo dell'analogia degli alberi, e degli ossi;

(1) *Memorie dell'Accademia Reale delle Scienze.* Anno 1739. 1741. 1743. 1746. cc.

offi ; devo rimettere questa discussione al mio *Paralello delle Piante, e degli Animali*, ma indicherò solamente i fatti, che hanno maggior rapporto col mio soggetto, e che possono servire a schiarirlo. Noi abbiamo veduto, che tutta la scorza non è atta a produrre il legno: tutto il perioftio non è atto di più a produrre l'osso. Può accadere nulladimeno che tutto il perioftio si ossifichi, come accade che si ossifica un'arteria. Le lame più interne della scorza contengono gli elementi del legno; le lame altresì più interne del perioftio contengono gli elementi dell'osso. Siccome la scorza non si converte propriamente in legno, così ancora il perioftio non si converte propriamente in osso: ma le lame interne di questa membrana hanno una organizzazione, e delle qualità donde ne risulta l'ossificazione, ed i suoi diversi effetti. La scorza, ed il perioftio non s'indurano che a gradi. Il legno, che ha acquistata tutta la sua durezza, non si estende più: l'osso perfetto non è più suscettibile di aumento. Negli alberi feriti, o rotti le fibre veramente legnose non concorrono alla riparazione; ma nascono dalla scorza delle fibre erbacee, che prendono adagio adagio la consistenza del legno, e la piaga vien segnata da un cordone, che produce lo sviluppamento di queste fibre. Negli offi bucati, o rotti, le fibre veramente ossose non concorrono alla riparazione; ma emanano dal perioftio delle fibre membranose, che prendono appoco appoco la consistenza dell'osso, riempiono il voto, o ricuoprono la frattura, che si trova segnata ad una grossezza, che si chiama *callo*, e che deve la sua origine allo sviluppamento di queste fibre.

222. *Compendiosa esposizione del sentimento del Sig. De Haller sopra la formazione delle ossa contrapposta a quella del Sig. Duhamel.*

Il Sig. De Haller, che ha veduto sì da vicino la formazione del pulcino, ha confutata questa analogia
nel-

nelle sue memorie sopra le ossa (1). Io ho dato il preciso delle sue prove. Dall'estremità di un'osso rotto n'esce un sugo gelatinoso, che si condensa a gradi, e diventa una tremolante gelatina. Questa gelatina acquista appoco appoco la consistenza di cartilagine, e finalmente quella di osso. Il *callo* si termina, e le due estremità si riuniscono. Si vede bene che questa gelatina animale da principio è organizzata, com'è la gelatina vegetabile. Ma ciò che non importa meno osservare si è, ch'ella si spande qualche volta sopra la superficie del periostio, e che questo non è punto aderente al *callo*. Lungi dal precedere la formazione dell'osso, il periostio non rinasce se non quando il callo è già molto avanzato; la struttura del periostio differisce essenzialmente da quella dell'osso. Quest'ultimo è formato di fibre parallele al suo asse. Il tessuto del primo al contrario è cellulare: le sue piccole fibre non hanno alcuna costante direzione, e da questo difetto di direzione si riconoscono le ossificazioni contro natura. Ne' primi anni il periostio è di una sottigliezza estrema, e non punto legato all'osso. Allorchè incomincia ad unirvisi, vi si unisce precisamente ne' luoghi, ne' quali ancora non si fa l'ossificazione. Se si staccassero le lame sottili del periostio per somministrare l'aumento dell'osso, sembra che questa membrana doves's'essere più densa nel feto che nell'adulto. Ella dovrebbe esser sempre fortemente unita all'osso, e particolarmente ne' luoghi dove incomincia l'ossificazione. Ella è sempre bianca: la *robbia* benchè colori le ossa, non la colora giammai. Dunque i vasi del periostio non ammettono delle particelle coloranti; egli dunque non nutrisce le ossa; egli dunque non contribuisce al loro accrescimento; poichè l'esperienza dimostra,

(1) *Memorie sopra la formazione degli ossi*, A Lufanna 1758. pag. 39. e seguenti, pag. 245. e seg.

stra, che la cartilagine non diventa osso, se non allorchè i suoi vasi si sono abbastanza allargati per ammettere i globetti rossi del sangue (1). Ora i vasi del perioftio restano sempre piccolissimi, e quasi invisibili. Finalmente vi sono delle ossa non rivestite dal perioftio, e nientedimeno crescono senza il suo soccorso: tali sono in particolare i noccioli offosi, e i denti.

223. *Preciso della risposta del Sig. Fougereux alle obbiezioni del Sig. De Haller per servire di schiarimento all'analogie del Sig. Duhamel.*

Il Sig. Fougereux dell'Accademia Reale delle scienze, e nipote del Sig. Duhamel, risponde al Sig. De Haller. Regna da una parte, e dall'altra in questa disputa una modestia, una pulizia, ed una moderazione, che non possono venire che da un sincero amore per la verità, e se tutte le dispute letterarie fossero come questa, noi non avremmo adolerci della indecenza, e dell'inutilità di molte. Abbreviando le risposte del Sig. Fougereux, procurerò di non indebolirle (2). Io le esporrò secondo l'ordine che ho presentate le obbiezioni del Sig. De Haller. Secondo la buona Fisica, un fugo sparso non può formare che semplici concrezioni, ed il callo non è una semplice concrezione, egli è organizzatissimo: ma da per tutto dove v'ha rottura di vasi, v'ha uno spargimento di fuchi; così segue di tutte le piaghe, o sieno di parti molli, o di parti dure. Se dunque il callo si fa vedere da principio sotto l'ingannevole

ap-

(1) Vedi il Cap. X. art. 163.

(2) Memorie sopra gli ossi, per servir di risposta alle obbiezioni proposte contro il sentimento del Sig. Duhamel du Morceaux, riportate ne' Volumi dell'Accademia Reale delle scienze; colle memorie de' Signori De Haller, e Bordegrave, che hanno dato luogo a questo travaglio. Parigi 1760. in ottavo.

apparenza di una *gelatina tremolante*, non bisogna immaginarsi, che non sia in fatti com'essa, e che questa pretesa gelatina proceda dal coagulo del sugo sparso. Questa specie di mucilaggine non è altro che le lame più interne del perioftio tumefatto, che incominciano a svilupparsi per operare la riunione. E' non segue dunque di queste lame come di tutti i corpi organizzati, che incominciano dall'esser molli, o quasi fluidi, avanti di acquistare il grado di consistenza propria della loro specie. Il pulcino ne somministra un esempio rimarcabile (*IV. Fatto Capitolo IX.*). Il perioftio gonfia mai sempre intorno alle rotture; ed i tumori del perioftio sono ossificazioni nascenti. Ora le lame di cui io parlo è tanto vero che appartengono a questa membrana, che se si leva, si leverà con essa il tumore, e col tumore la mucilaggine, e la rottura resterà allo scoperto (1). Queste medesime lame sono da principio mucilagginoe, dopo cartilaginoe, e finalmente formano un turacciolo osso nelle ossa che si sono forate. Levando il perioftio, si leva ancora questo turacciolo. Dunque e' non è che un'espansione (2). Dunque si obietta invano, che il perioftio non rinasce se non dopo il callo, dappoichè si è dimostrato, che il callo si produce dal perioftio. Se l'organizzazione del perioftio differisce da quella dell'osso, l'organizzazione della cartilagine destinata ad ossificarsi, non è meno diversa da quella dell'osso; dunque la difficoltà si riduce a spiegare come l'uno e l'altra diventino osso. La struttura del perioftio non è ancora ben conosciuta, ed è diversa in diversi ossi. Con l'aiuto della macerazione si vede che le fibre delle lame interiori hanno più di regolarità di quelle delle

lame

(1) Seconda mem. pag. 119. 120.

(2) Ibid. pag. 105.

lame esteriori (1). Dunque è un andare troppo lontano l'affermare, che le fibre del perioftio non hanno alcuna costante direzione. Egli si straccia più facilmente secondo la sua lunghezza, che secondo la sua larghezza. Dunque le fibre, che lo compongono hanno una direzione paralella all'asse dell'osso: si rompono quando si straccia il perioftio secondo la sua larghezza; non si fa altro che separarli, quando si straccia secondo la sua lunghezza (2). Non si può decidere se tutte le lame del perioftio sieno originalmente atte a diventar osso; ma si è provato, che le lame più interne si ossificano, e per l'addizione di queste lame all'osso, e' cresce per tutti i versi; cresce in grossezza per apposizione, e in lunghezza pel prolungamento delle lame. Dunque si può riguardare la parte interna del perioftio come l'organo destinato alla formazione, e riparazione dell'osso; nella medesima maniera che la parte interna della scorza è l'organo destinato alla formazione, ed alla riparazione del corpo legnoso. Se ne' primi tempi il perioftio non sembra unito all'osso, se allorchè incomincia ad unirvisi, questo accade precisamente ne' luoghi, ne' quali ancora non si fa l'ossificazione, ciò non prova, che il perioftio non sia l'organo dell'ossificazione. Una mucilaggine non può essere molto aderente; e noi abbiamo veduto, che le lame del perioftio che deono diventar osso, da principio sono mucilagginose. La scorza non è mai meno aderente al legno di quando ella lo produce: le sue fibre sono allora sì imbevute di succhi, che sembrano non esser altro, che una gelatina condensata. Accade il medesimo di quelle del perioftio avanti che abbiano presa la

con-

(1) Ibid. prima mem. pag. 31.

(2) Ibid. pag. 32.

consistenza di cartilagine . Ma quando sono indurite fino ad un certo punto si accostano tanto più fortemente quanto sono più ossificate . E siccome l'ossificazione comincia sempre dalla parte di mezzo dell'osso, accade che si trovano delle lame del periostio , che non sono ossificate che per metà . Queste lame sono molto aderenti alla parte di mezzo, e pochissimo all'estremità, dove elle non sono ancora , che cartilaginose , o membranose (1) . Nell'embrione ogni osso è così molle , che non si può distinguere dal periostio il tutto e quasi periostio . Dunque non si deve affermare che la nascita nell'osso preceda quella del periostio, egli è ancora più difficile il distinguere queste due cose in un embrione così piccolo come quello del pulcino . Somministrando il periostio degli strati all'osso non deve diminuire di densità , poichè a misura che si staccano delle lame per unirsi all'osso , se ne sviluppano delle nuove o cartilaginose , o membranose . Così la scorza non si diminuisce punto, benchè somministri annualmente degli strati, concentrici al legno ; ogni anno se ne sviluppano de' nuovi , o legnosi , o corticali (2) . Se la *robbia* non colora il periostio , non è perchè le lame interne di questo non possino ammettere il colore ; ma fintantochè queste lame sono membranose , o cartilaginose , elle non hanno tutte le condizioni requisite per la colorazione . Una bella esperienza dimostra, che le ossa deono la loro durezza , e la loro fragilità ad un *tartaro ossoso*, ad una sostanza *cretacea*, o terrosa , che penetra nelle maglie della cartilagine , e vi s'incorpora . Questo tartaro si scioglie coll'immerger l'osso nello spirito di nitro allungato ; e si vede con maraviglia trasformarsi l'osso in cartila-

(1) Ibid. pag. 38. 39.

(2) Ibid. pag. 37.

tilagine , e quella cartilagine vi si divide in molte lame , che palesano la sua origine . Il *callo* perfetto offerisce il medesimo fenomeno ; egli ha altresì la medesima sorgente . Questo tartaro osseo si carica della tintura di robbia , e la porta nel tessuto dell' osso ancora imperfetto : gli ossi , che hanno acquistata tutta la loro durezza non si colorano ; imperciocchè non possono ammettere più il tartaro , e conseguentemente particelle coloranti . Dunque allorchè i vasi del periostio , o della cartilagine si sono abbastanza allungati per ricevere il tartaro , allora incomincia l'ossificazione , e la colorazione (1) . Ancora il legno senza dubbio nessuno deve la sua durezza ad una sostanza terrosa , che non si è ancora tentato di estrarre ; se vi si arrivasse , si trasformerebbe così il legno in iscorza ; od almeno si darebbe alle fibre del legno la flessibilità di quelle della scorza ; ma questa scorza avrebbe de' vasi , che non ha la scorza propriamente detta . (*Vedi l'articolo 220.*) L'esperienza del rammollimento degli ossi mediante un'acido somministra un mezzo semplicissimo per distinguere le concrezioni veramente ossee , od organiche , dalle concrezioni puramente terrose , ed inorganiche . Lo scioglimento di queste è totale , e non lascia dopo di se alcun segno di cartilagine . Questo accade nelle concrezioni de' gottosi (2) . Quando si osserva il progresso dell'ossificazione , si vede deporsi il tartaro nelle lame cartilaginose , ora a grani , ora a filetti , o a ramificazioni che si prolungano appoco appoco (3) . I *noccioli ossei* sono concrezioni , che hanno per base una cartilagine , e questa cartilagine riguardo al nocciolo fa le veci

(1) Ibid. Discorso preliminare pag. 25. Prima mem. pag. 25. e seg. pag. 33. e seg.

(2) Ibid. pag. 33. 34.

(3) Ibid. pag. 46.

ci del perioftio, fe ancora effo non è ftato una volta perioftio (1). *Lo ſmalto de' denti* è una ſoſtanza particolare; ma le loro barbe ſono veri offi, che ſi dividono in lame diſtinte, e concentriche, ſono colorate dalla robbia, ed hanno il loro perioftio (2).

224. *Ragioni, che inducono l'autore a ſoſpendere il giudizio ſopra la quiftione controverſa tralli due celebri Fiſici.*

Non appartiene a me il pronunziare tralli Signori Duhamel, e De Haller; io devo amarli, ed ammirarli, e non giudicarli; dunque mi contengo nell'uffizio di ſemplice rapportatore, e laſcio agli Accademici, o piuttosto all'eſperienza, la diſiſione di queſto famoſo proceſſo. Quantunque io abbia molto abbreviate le prove di una parte, e dell'altra; mi luſingo di non aver fatto perder loro niente di forza, e di aver eſpoſto chiaramente lo ſtato della quiftione; l'amicizia, e la confidenza che hanno per me queſti due celebri Fiſici, e che io merito per i ſentimenti, che ho loro confidati, gli hanno indotti dopo molti anni a confidarmi per lettere le loro oppoſte idee, e a domandarmi le mie. Io gli ho aſcoltati come miei maetri, e mi è ſtato altrettanto facile il ſoſpendere il mio giudizio, quanto io ero trà due autorità, che mi parevano riſpettabili egualmente. Il Sig. Duhamel mi fece parte delle ſue ultime idee ſopra la formazione delle oſſa in una lettera molto lunga ch' e' mi ſcriſſe di Parigi il 27. di Luglio del 1757. Io mandai ſubito l'originale di queſta lettera al Sig. De Haller, perſuaſo ch'egli non farebbe meno maravigliato di quel che ne foſſi ſtato io, della modeſtia, e del candore che vi regnavano.

(1) Ibid.

(2) Ibid. pag. 47.

vano : egli ne fece una orrevole menzione alla pag. 161. delle sue memorie sopragli ossi, ma sarebbe stato meglio, che l'avesse analizzata. Io inferirei quì questa lettera; come una prova, che il Sig. Duhamel non è meno degno della stima del Pubblico per la qualità del suo cuore, che per quelle del suo spirito, se la lettura del discorso preliminare del Sig. Foucheroux non mi dicesse, che ella è stata impressa, ed inserita nel *Giornale di Medicina* del mese di Settembre 1757. (1)

225. *Risultati generali de' fatti indipendenti dalla quistione agitata.*

Qualunque partito, che si prenda sopra la formazione degli ossi, o sopra l'analogia cogli alberi, e sarà sempre vero che gli uni, e gli altri non arrivano al loro stato di perfezione che per uno sviluppo successivo, conciossiachè le loro parti essenziali si mostrino da principio sotto l'ingannevole apparenza di una gelatina, o di una mucillaggine, che sembra condensarsi a gradi: ella diventa appoco appoco membrana, cartilagine, ed osso; e per simile successione erba, scorza, legno. I vasi si spiegano, si allargano, ammettono delle molecole cretacee, o terrestri, sorgenti della durezza: queste molecole s'incorporano nella tessitura; la cartilagine diventa osso, e la scorza legno. La divisione dell'osso, e del legno in lame sottili, prova che crescono per l'addizione di strati concentrici, che col tempo si condensano, si allungano, e s'induriscono. L'estratto del tartaro ossoso fatto coll'acido, e la permanenza della cartilagine dimostrano, che questa è il fondo, che riceve le molecole di questo tartaro, e che le ritiene. Io tenterò altronde di applicare questa cosa alla teoria generale dell'aumento

to (1); intanto torno a diversi fatti , che risguardano i vegetabili.

226. *Cordoni delle piaghe vegetabili , loro natura , loro formazione , loro effetti . Maniera di moltiplicare per incisione tutte le spezie di alberi .*

Noi abbiamo veduto cicatrizzarsi le piaghe degli alberi . Io ho indicate le principali particolarità , che si osservano nella formazione di queste cicatrici . Ho fatto osservare , che se si fa ad un ramo una incisione annulare , che arrivi fino al legno , si formerà un *cordone* sopra l' incisione , e questo cordone estendendosi , ricoprirà appoco appoco la piaga (2) . Si osserverà il medesimo , se si faccia una legatura forte al ramo . Questo cordone merita una grande attenzione . Egli è un' opera della natura , che serve di preparazione a produzioni più importanti . Io ho detto nell' articolo 220. che le iniezioni colorate provano direttamente , che il succhio sale per le fibre del legno : queste medesime iniezioni dimostrano ; ch' e' scende per le fibre della scorza , per concorrere allo sviluppamento , ed al nutrimento delle radici . Questo è assai naturale ; poichè non sarebbe a proposito che le barbe si nutrissero del succhio crudo , ch' esse attraggono immediatamente dalla terra ; il cuore non si nutrisce del medesimo sangue , che passa nelle sue cavità ; egli vien nutrito da un' altro sangue che gli è portato dalle proprie sue arterie . Il *cordone* di cui trattiamo , è un' altra prova del succhio discendente : e non si mostra che nella parte superiore dell' incisione , o della legatura : gli dunque è prodotto da un succhio , che scende dalle cime dello stelo , e de' rami . Se la legatura non avesse impedito il corso
di

(1) Si rilegga l' articolo 170. e particolarmente l' ultimo paragrafo ; e si comprenderà meglio quello che qui voglio dire .

(2) Vedi l' art. 215.

di questo succhio, e' sarebbe arrivato alle barbe, e non avrebbe formato alcun cordone. Dunque si può concludere che questo cordone appartiene alla natura delle barbe: egli è una specie di *bulbo*, o di cipolla, e questa conclusione tanto più è legittima, quantochè se s'inviluppa di erba umida si vedranno uscire delle radicette, che si prolungheranno nell'erba. Travagliando sopra li strati interiori della sugna dell'albero, il succhio discendente vi cagiona lo sviluppamento di un gran numero di fibrette, o di piccole lame, e da questo sviluppamento accidentale nasce il tumore, ed il bulbo. Quando si taglia questo bulbo, dopo averlo fatto bollire, si scoprono nel suo interiore delle piccole *papille* legnose, che si possono risguardare come i *bottoni* delle radicule. Se si taglia il bulbo secondo la sua lunghezza si osserverà, che le antiche fibre legnose, quelle che esistevano avanti che si facesse la legatura avranno conservata la loro naturale direzione; voglio dire, che si troveranno paralelle all'asse del tronco, o del ramo, mentrechè le nuove fibre, quelle, che avrà fatto sviluppare il succhio discendente, non avranno al contrario alcuna costante direzione; si osserverà quà, e là nel bulbo de' *nodi*, che tenderanno o ad una papilla, o ad una radicula: ogni papilla sarà formata di un piccolissimo cono legnoso, ricoperto di una scorza che nel prolungarsi averebbe prodotto una radicula (1). Se si taglia il ramo sotto il cordone, e si pianta in terra dappoi che il cordone avrà incominciato a produrre delle radicule, diventerà un'albero, e questo è un modo semplicissimo, e sicurissimo di moltiplicare per *incisione* tutte le sperienze di alberi. Trà molti rami di olmo eguali, e simili, che si saranno piantati, non

(1) Fisica degli alberi, lib. 4. cap. 5. art. 1. pag. 110. e seg. della seconda parte.

non si attaccheranno che quelli , che saranno stati provvisti del cordone (1).

227. *Si conferma l'uso , e l'importanza de' cordoni nelle barbatelle.*

Dunque il cordone è una preparazione necessaria per la germinazione delle radicle. Questo segno è sì essenzialmente quello della natura , che se si piantano delle barbatelle senza preparazione , e che si sbarbino allorchè avranno incominciato ad attaccarsi , si vedrà che tutte le radici nasceranno da un cordone (2). Soventi volte la natura non si metterà in pensiero per la produzione del cordone. Il tumor naturale , che serve di sostegno ad un bottone , piccole escrescenze accidentali , o inegualità della scorza , formano le veci del cordone (3). Dunque un mezzo di assicurare , che le *barbatelle* si attacchino , è di fare in maniera , che la loro estremità inferiore , l'estremità , che deve esser posta in terra sia ricoperta di tumori , o di cordoni.

228. *Esperienze dell'Autore sopra la vegetazione delle barbatelle.*

Molti anni avanti che io avessi avuto cognizione delle belle esperienze del Sig. Duhamel sopra la vegetazione delle barbatelle , io ne avevo fatte alcune nella medesima maniera che l'ha fatte questo celebre Accademico. Io le ho riportate nella mia seconda memoria *sopra la vegetazione delle piante in diverse materie , e principalmente nell'erba* , pubblicate dall'Accademia Reale delle scienze (4). Aveo veduti i tuber-

(1) Ibid. pag. 111.

(2) Ibid. pag. 112.

(3) Ibid. pag. 114.

(4) *Memorie di Matematica , e di Fisica presentate all'Accademia da varj uomini dotti , e lette nelle Assemblee. T. I. 1759. in quarto pag. 442. e seguenti.*

tubercoli, o cordoni, ed ecco come gli avevo descritti. „ Io mi proposi nel 1746. di esaminare lo stato „ della parte inferiore delle barbatelle, poichè mi „ pareva degno di attenzione; scopersi nella loro „ estremità, nella superficie fatta dalla sezione de' „ piccoli tubercoli biancastri di grossezza ineguale, „ il più grosso de' quali si accostava alla grossezza „ di una lente, eglino uscivano dalla densità della „ scorza, e formavano intorno al legno posto „ nel centro, una specie di corona, che in una „ delle barbatelle era compita, ma nell'altre non „ era che per metà: questi tubercoli erano delicatissimi, per poco che si pressassero nell'ugna, si „ staccavano; la loro figura variava secondo la loro „ grossezza, ma generalmente ella si accostava a „ quella de' bottoni più o meno ritondi „. Pensai, che questi tubercoli nelle barbatelle facessero l'ufficio delle radici (1). Era dunque molto vicino alla scoperta del Sig. Duhamel.

229. *Osservazioni sopra il succhio discendente causa della produzione de' cordoni. Che questo succhio scende mediante una forza, che gli è propria.*

Noi non sappiamo chi costituisca la vita nelle piante, o per ispiegarmi in altri termini, non sappiamo qual sia la potenza che innalza il succhio. Noi conosciamo solamente alcune cause particolari, che possono accrescere, o diminuire il suo moto; ma sappiamo benissimo che questa potenza non è come quella, che innalza l'acqua in una spugna (2). Se si pretendesse di conoscer meglio la causa, che fa scendere il succhio, se si affermasse, che questa causa è la gravità, uno s'ingannerebbe. Noi abbiamo veduto nascere un cordone sopra una legatura; e ne
ab-

(1) Ibid. pag. 444.

(2) Vedi gli articoli 168. 169.

abbiamo concluso, che era prodotto dal succhio discendente. Se questo succhio scendesse unicamente pel suo peso, in un ramo tenuto voltato all'ingiù e sopra il quale si fosse fatta una incisione, o una legatura, non dovrebbe formarvisi il cordone: e pure accade precisamente il contrario; si forma un cordone posto nel luogo solito sopra la legatura, e che non differisce niente affatto da quelli, che nascono ne' rami, che si sono lasciati nella loro situazione naturale. La scesa del succhio, siccome la sua salita, sono dunque l'effetto di una forza espressa (1).

230. *Effetto de' due cordoni che nascono sopra, e sotto la piaga.*

Tutto concorre a stabilire, che il succhio discendente è destinato allo sviluppamento, ed al nutrimento delle radici, e se a questo succhio gli s'impedisce il corso con un'incisione, o con una legatura, e' produce un cordone, che può far nascere delle radici. Quando un'albero ha più ordini di radici posti gli uni sopra gli altri, quelle dell'ordine superiore sono sempre le più grosse, e siccome i rami sono nutriti al contrario del succhio ascendente, quelle dell'ordine inferiore sono sempre le più considerabili: Dunque se nascesse un cordone sotto l'incisione, o legatura, questo cordone produrrebbe de' polloni, siccome il cordone superiore produce delle barbe: infatti nasce un cordone sotto l'incisione; ma è sempre più piccolo dell'altro. Se si ferma intorno ad esso un umido conveniente, usciranno ben presto da esso de' piccoli polloni. (2).

231. *Esperienze che provano, che questi cordoni sono*

(1) *Fisica degli alberi*. Lib. 4. Cap. 5. art. 1. pag. 108. della seconda parte.

(2) *Ibid.* pag. 113. 123.

sono della medesima natura. Alberi piantati colle radici all'insù, e che si attaccano.

Contuttociò noi non obblighiamo ad inferire da queste esperienze, che i due cordoni differiscano essenzialmente. L'esperienza medesima c'induce a credere, che siano della medesima natura. Se si scorona un albero, e si attenda a spogliarlo di tutti i suoi polloni, uscirà trà il legno, e la scorza un grosso cordone, che darà la nascita a de' piccoli polloni: se si taglia nel medesimo modo una delle principali radici di quest'albero, e si ricopra di terra lo *sterpo* si formerà similmente trà il legno, e la scorza un cordone, donde usciranno delle piccole radici, ma se lo *sterpo* non si ricopre di terra, e resti all'aria scoperta, il cordone produrrà de' polloni (1). Tutti i polloni dunque sono atti a produrre de' polloni, e delle radici; de' polloni all'aria scoperta, e delle radici sotto la terra. Questa circostanza puramente esteriore ha tanta influenza, che fa sviluppare de' rami fino sopra le radici, e delle radici sopra i rami. Un salce piantato a rovescio, vale a dire, i rami in terra, e le radici all'aria, non perisce, ma se si bada che non secchino le radici, elleno produrranno de' polloni, come i rami naturali; uscirà nel medesimo tempo da' rami che si faranno posti in terra una moltitudine di radici, le principali delle quali nasceranno da' nodi che sono alle triforcazioni de' rami, e dal piccolo cordone naturale, che serve di sostegno alle foglie (2). Poichè un albero piantato a rovescio continua a vivere, e fa delle nuove produzioni; già si vede che deve seguire il medesimo nelle barbatelle piantate a rovescio. Si possono ancora disporre in maniera che le radici naschino sopra i pol-

(2) Ibid. pag. 103.

(3) Ibid. pag. 115.

polloni nascenti, ed allora si averà un piano di radici poste sopra un piano di polloni; ma la natura non ama la violenza: in tutti questi casi, le produzioni saranno al principio meno rigogliose che nell'ordine naturale (1).

232. *Conseguenza tratta dalle precedenti esperienze contro le valvule, che alcuni Autori hanno ammesse ne' vasi. Esperienza dell' Autore intorno a questa materia.*

L'analogia avea fatto supporre delle valvule nelle fibre legnose, perchè se ne trovano ne' vasi sanguigni: si era ancora creduto di vedere queste valvule. L'esperienze, che io porto, non lasciano luogo di ammetterle: io ho veduto una tintura d'inchostro alzarfi molto in alto nelle barbatelle, che avevo piantate a rovescio. I tratti che segnavano il passaggio della tintura erano solamente più fini, o più deboli, che nella situazione naturale (2). Ho detto di sopra, „ che i vasi succhiosi dello stelo essendo piccoli con molto allungati, la base de' quali è stretta, i tratti, che vi produce la materia colorante, devono esser più fini, e meno stendersi, allorchè questa materia penetra nel tronco per la loro base; nel primo caso le particelle coloranti sono in quantità assai minore; e si dividono sempre più a misura, che si alzano; poichè deono occupare un maggiore spazio, onde sempre diventano meno sensibili. “

233. *Perchè il cordone superiore sia più grosso dell' inferiore. Azione delle foglie stabilita dall' Autore.*

Del resto se il cordone che si forma sopra l'incisione, o legatura, è sempre più grosso di quello, che

(1) Ibid. pag. 115. 116.

(2) Ricerche sopra l'uso delle foglie nelle piante pag. 257.

che si forma sotto di essa, si aggiugne senza dubbio al succhio ascendente un altro succhio, che le foglie attraggono dall'aria, e che elle trasmettono ai rami, ed al tronco, donde e' scende alle radici. Io ho trattato molto a lungo dell' *uso delle foglie nelle piante*, e particolarmente negli alberi, ed ho provato con un gran numero di esperienze ripetute con tutta l'attenzione, che la superficie inferiore delle foglie, che sono i principali organi, che le mettono in istato di attrarre l'umidità sparsa nell'aria, e con essa le particelle eterogenee, delle quali essa è impregnata (1). Io ho dimostrato ancora che nella superficie inferiore delle foglie vi sono i principali organi di quella traspirazione, di cui il Signor De Haller ha osservati sì dappresso, e con tanta destrezza i diversi effetti (2).

234. *Che i cordoni favoriscono l'eruzione de' germi; ma che non gli sono necessari. Prove tratte da alcune barbatelle singolari dell'Autore.*

Io non penso, che i tumori, o cordoni così naturali, come artificiali sieno assolutamente necessari alla produzione delle radici: la favoriscano solamente; quindi è ch'elle nascono più facilmente. Ho parlato nel precedente Capitolo, Articolo 195. di alcune barbatelle singolari, di barbatelle, che provenivano da semplici foglie staccate dal loro soggetto, e che aveano germogliato delle radici; ho veduto uscire immediatamente queste radici dalla superficie della scorza, ed allungarsi molto; qualche volta sono state in gran numero: alcune restavano semplici, altre germogliavano ancor esse delle radicle, che nascevano dal picciuolo, ora uscivano dalla sua estremità, ora dalle sue parti; in quest'ultimo caso, quelle delle foglie del *fagiuolo* avevano

(1) Articoli 6. 7. 9. 10. 15.

(2) Ibid. Art. 16. 17. 88.

vano un'ordine simetrico molto osservabile : elle si distribuivano sopra quattro linee paralelle , ed in egual distanza le une dalle altre. Io ho osservato il medesimo ordine nelle radicule che nascevano dallo stelo ; vedevo quà e là sopra la scorza delle piccole aperture bislunghe , che annunziavano l'eruzione delle radicule : esaminate colla lente sembravano uscir tutte da una simile apertura. Avendo io immerso lo stelo in una tintura di *robbia* , le radicule vi presero un colore molto rosso , e lo stelo restò bianco. Queste radicule nascenti erano simili alle piccole spine (1).

235. *Dell'unione dell'innesto col suo soggetto considerata nelle diverse spezie d'innesti .*

L'unione degl'innesti col loro soggetto , si fa come la riunione di tutte le piaghe , che offendono la scorza , ed il legno ; Negl'innesti fatti a fenditura , la principale attenzione consiste nel far unire , e corrispondere esattamente la *sugna* del soggetto con quella dell'innesto . Esce ben presto dall'uno , e dall'altro una sostanza da principio gelatinosa , poi erbacea , e finalmente corticale , o legnosa , che fa l'unione , e fa l'innesto un ramo naturale del soggetto . Io ho detto in molti luoghi di quest'opera , che il legno una volta formato non si estende più : si osserva altresì che il legno del soggetto , e quello dell'innesto non contribuiscono niente alla vicendevole unione . I nuovi strati , che si sviluppano nell'uno , e nell'altro , si uniscono in diversi punti , e vedonsi inclinare quelli del soggetto verso quelli dell'innesto . A misura che l'unione si fortifica mediante lo sviluppamento di questi strati , e mediante l'induramento ch'essi acquistano appoco appoco si forma un cordone sopra l'inserzione , che tende a ricoprire

(1) Ibid. Art. 106.

prire la piaga. Questo cordone ha la medesima origine di quello, che abbiamo veduto formarsi sopra le incisioni, o legature; egli vien prodotto dal fucchio, che scende dall'innesto nel soggetto, e quello che non lascia luogo di dubitarne, si è, che si ricopre di terra, e produrrà delle radici della medesima natura di quella del albero, da cui si farà presso l'innesto, e se queste radici vengono a germogliare de' *polloni*, avranno tutti i caratteri dell'innesto, e non quelli del soggetto: in questo caso l'innesto cesserà da esser tale, e diventerà una barbatella (1). Io credo di aver dimostrato quì sopra nell' Articolo 183., che il cordone di cui parlo, non è un *filto*, o una ghianda vegetabile, come hanno creduto alcuni fisici. L'innesto fatto per *impiastrazione* offre le medesime particolarità essenziali, che quello a fenditura; esce dalle estremità dell'impiastrazione una sostanza simile a quella, che ho descritta, che forma all'intorno de' punti di aderenza col soggetto, dimodochè l'impiastrazione sembra cucita con esso. Dopo si sviluppa sopra la superficie interiore dell'impiastrazione una foglietta legnosa, che di giorno in giorno acquista maggior consistenza, e che si unisce per diversi punti al soggetto, le di cui produzioni concorrono altresì a questa unione (2).

L'innesto fatto a corona, e quello fatto a zuffolo o a flauto, non sono che modificazioni dell'innesto a fenditura, e di quello fatto per *impiastrazione*. L'innesto fatto per *approssimazione* partecipa dell'uno, e dell'altro, e da per tutto v'è il medesimo principio di unione, e di rigenerazione. Si fanno degli innesti che potrebbonsi chiamare *corticali*, poichè

(1) *Fisica degli alberi*. Lib. 4. Cap. 4. Art. 6. seconda parte, pag. 80. e seg. Cap. 5. Art. 1. pag. 109.

(2) *Ibid.* Cap. 4. Art. 6.

chè consistono nella semplice unione di due pezzi di scorza , o sia che si stacchi da loro soggetti , o sia che si innesti per *approssimazione* non innestando che le scorze . Nell' uno , e nell' altro caso , seguirà l' unione mediante lo sviluppo di piccole vene erbacee , che nasceranno dalle due scorze (1). Siccome il legno una volta che sia formato non cresce più , così la scorza una volta che sia formata è incapace di fare delle nuove produzioni . Le generazioni d' ogni specie non seguono che negli strati corticali , o legnosi , che non hanno terminato di svilupparsi (2).

236. *Saggio di spiegazione della rigenerazione delle piaghe vegetabili. Risorse preparate dalla natura.*

Io ho radunati molti fatti , e certi intorno a vegetabili , ed intorno alle loro varie produzioni ; e si tratta adesso di tirare dalla comparazione di questi una ragionevole spiegazione . Si è veduto , che il corpo di un albero è composto di un numero infinito di coni molto allungati , inseriti gli uni negli altri (3). Questa composizione si osserva fino nel più piccolo ramoscello ; i coni non sono semplici ma sono formati di sottilissime lame applicate una sopra l' altra ; nella loro prima origine questi coni erano gelatinosi , o quasi fluidi ; ho dimostrato come appoco appoco s' induriscono , e quali sieno le leggi che presiedono a questo indurimento ; ho indicata la meccanica che determina l' accrescimento in grossezza , ed in altezza ; suppongo , che il mio lettore abbia tutto questo presente allo spirito . Vediamo adesso ciò , che deve passare nella rigenerazione di una *piaga* , che penetra fino al legno . Questa piaga ha interessati tutti i coni compresi nella superficie este-

(1) Ibid. pag. 84. (2) Ibid.

(3) Vedi l' Articolo 169.

esteriore della scorza fino al legno, tutti hanno sofferto in questo luogo uno scioglimento di continuità. Dunque i labbri della ferita sono formati di un ammasso di foglietti d'ineguale densità, e d'ineguale consistenza; trà questi foglietti ve ne sono alcuni che sono tuttavia gelatinosi, o erbacei; mentrechè altri hanno terminato d'indurirsi: si è provato, che questi non possono contribuire alla riunione della piaga, poichè sono incapaci di estensione. Dunque il succhio travaglierà intorno agli altri. Noi abbiamo veduto ch'è sempre quello, che scende dalle parti superiori dell'albero pel nutrimento, e per lo sviluppamento delle radici, che maggiormente contribuisce alla rigenerazione delle piaghe: se questo succhio provasse da per tutto la medesima resistenza, e' travaglierebbe egualmente sopra tutti i foglietti, che non hanno terminato di svilupparsi, o d'indurire: e tal è il caso di un'albero, che non sia stato ferito; ma la diminuita resistenza attorno gli orli di una piaga, le parti che riagivano sono restate sopprese; dunque il succhio discendente dovrà portarsi con maggior facilità alle estremità de' foglietti, o strati posti intorno all'orlo superiore della piaga; dovrà tendere a prolungarsi dall'alto al basso, ed intorno alle parti: dunque si vedranno uscire tralla scorza, ed il legno de' piccoli foglietti erbacei, che facilmente si conosceranno al loro color verde, ed alla delicatezza della loro tessitura. La divisione de' canali intercettando il corso del succhio, questo si fermerà attorno i labbri della piaga, vi svilupperà un gran numero di fibre, e di fibrette, che si prolungheranno in diverse parti, e formeranno il cordone descritto nell'Articolo 215. Mille diversi accidenti minacciavano gli esseri organizzati; ma l'autore della natura che li aveva preveduti, ha preparate di lontano delle sorgenti di riparazione. Egli ha costrutta la sua opera sopra rap-

por-

porti più, o meno diretti a certi casi possibili. Egli l'ha organizzata nel rapporto alla sanità, e alla malattia. Un albero sano contiene originalmente una moltitudine di fibre, che non sono chiamate a svilupparsi se non in certe circostanze puramente accidentali. Tali sono la maggior parte di quelle, che concorrono alla riunione delle piaghe di ogni specie.

237. *Come tutte le fibre appoco appoco s'induriscano, e sembrino rivestire un'altra natura.*

Queste fibre si fanno vedere da principio sotto la figura di una gelatina; ma l'esperienza prova, che non è se non una semplice apparenza, che nasconde una vera organizzazione (1). In questo primo stato i canali sono di una sottigliezza estrema; allora non ammettono che i succhi più delicati; un segreto impulso li sviluppa (2): si aumenta il loro calibro, e si rende proporzionato a ricevere delle particelle eterogenee, e grossolane; si aumenta poi sempre più, ed ammette finalmente la terra sorgente della maggior durezza. Così la pretesa gelatina diventa erba, scorza, sugna dell'albero, e legno. Ma l'alimento che l'essere organizzato a se assimila, non cangia la struttura degli organi. La quercia posta nella stretta capacità di una ghianda è essenzialmente tale quale sarà allorchè alzerà in alto la sua testa maestosa. L'alimento non organizza niente, ma ciò, ch'era avanti organizzato, lo riceve, lo prepara, lo dispone, e se lo incorpora (3). Dunque non dite, che la scorza si cangia in legno. Voi così non fareste esatto; lo farete bensì dicendo, che gli strati legnosi, i quali non aveano se non la consistenza della scorza, acquistano quella di legno (4).

238.

(1) Vedi l'Art. 216.

(2) Vedi l'Art. 168.

(3) Vedi l'Art. 179.

(4) Vedi l'Art. 220.

238. *Germi sparsi in tutto il corpo della pianta, sorgente feconda di riproduzioni. Prove di questa disseminazione.*

Vi sono negli esseri organizzati dell'altre sorgenti di riparazione, voglio dire de' germi destinati alla produzione de' *tutti organici*: quanto più si penetra la natura della *organizzazione*, e tanto più uno si persuade, che quella della minima fibra non può essere il risultato del semplice condensamento de' *fucchi*: A più forte ragione un organo, ed un sistema di organi, non possono avere una simile origine. Il *pulcino* mette questa verità nel più chiaro meriggio: si è già provato che tutte le sue parti coesistono nel medesimo tempo, e che la loro invisibilità non è che l'effetto della loro trasparenza, e della loro picciolezza (1): dunque una *radicula* un *nollone* nascente esistevano in piccolissimo nel corpo che sembra produrli. Essi non provengono dal prolungamento delle fibre della sugna dell'albero, nella quale hanno presi i primi loro aumenti. Egli è facile l'assicurarsi, che un *bottone*, o *gemma* contiene un ramo in miniatura; le sue parti hanno delle forme, delle proporzioni, de' rapporti, una disposizione, che non hanno le fibre, che compongono gli *stacci* della sugna dell'albero, e che non potrebbero acquistare per nessuna meccanica a noi conosciuta. Se la natura ha concentrati, per così dire, in un punto tutti gli organi del *pulcino*, perchè non può aver ella concentrati nella medesima maniera in un punto tutti gli organi di una *pianta*? Noi siamo contenti di ammetterlo, poichè lo vediamo coll'occhio nella sezione di un bottone, ed in quella di un seme: scopriamo i *grani* lungo tempo avanti, che si apra
il

(1) Vedi gli Articoli 142. 143. 144. 145.

il bottone (1). Io mi contento di richiamare que' fatti conosciutissimi, e schivo di ricorrere ai prodigi, che in questo genere hanno infantati i microscopj di Leeuwenhoek: egli è troppo difficile il vedere dopo esso in questa regione dell'infinito; si avrà maggior confidenza nelle osservazioni meno maravigliose del Malpighi, del Grevv, e del Duhamel. Si osserva una conformità grande tralla produzione delle radici, e quella de' rami: le radici devono la loro nascita ad alcune *papille* molto analoghe a' *bottoni* donde nascono i rami (2). Se le radici, ed i rami, erano contenuti originalmente ne' *germi*, bisogna sapere, che questi germi sono sparsi universalmente in tutto il corpo dell'albero. Questa conseguenza è molto legittima, poichè non vi si trova alcun punto, da cui non possa uscire, o da cui non si possa fare uscire delle *radicule*, e de' *polloni*. Le barbatelle fatte di foglie ne somministrano una prova assai rimarcabile (3).

239. *Come certe determinate circostanze favoriscano l'eruzione de' germi.*

Tutti questi germi *naturalmente* non arrivano a svilupparsi; ve ne sono moltissimi, che non si sviluppano, che coll'ajuto di circostanze puramente *accidentali* per le quali pare, che sieno stati posti in riserva. Se i germi nascono ordinariamente ne' *cordoni naturali*, o *artificiali*, questo accade perchè il succhio vi prova de' ritardi, che danno luogo al travaglio, e alle preparazioni favorevoli all'eruzione de' germi. Le piegature, e ripiegature, che i vasi patiscono in que' tumori, producono sopra il succhio i medesimi effetti essenziali, che vi producono i contornamenti de' *vasi differenti de' frutti*.
Le

(1) Vide l'Articolo 162.

(2) Vedi l'Art. 226.

(3) Vedi l'Art. 195.

Le incisioni, e le legature intercettano il corso del succhio, e lo rivoltano a favore de' germi, e de' vasi, che loro corrispondono. I canali divenuti più, o meno tortuosi rallentano più o meno il moto del succhio, e si hanno mille prove, che questo rallentamento è vantagiosissimo alla fruttificazione.

240. *Come una semplice barbatella, una semplice foglia ec. possono fare di per se medesime delle nuove produzioni.*

Gli organi essenziali alla vita sono sparsi in tutto il corpo della pianta, e fino nelle sue minime parti. Si trovano in una semplice foglia tutti i vasi, e tutte le viscere proprie del vegetabile, delle fibre legnose, delle trachee, de' vasi propri, delle otricelle; dunque la foglia ha in se medesima tutto ciò, ch'è necessario alla vita vegetabile; dunque ella può continuare a vegetare separata dal suo soggetto; germogliare delle radici, e divenire una barbatella: così le barbatelle ordinarie, gl'innesti, le impiastrazioni, possono fare di per se medesime delle produzioni; elle sono provviste di organi, che ricevono, preparano, digeriscono i succhi, che attraggono al di fuori.

241. *Spiegazione degl'innesti.*

Un innesto è una specie di barbatella piantata in un tronco vivente; ella non vi getta delle vere radici, ma vi germoglia de' vasi, che n' esercitano le funzioni più essenziali. Eglino si anastomosano, o si uniscono a quelli, che partono dal soggetto: eglino non si abboccano direttamente; la sezione degl'innesti dimostra, che gli uni, e gli altri cangiano di direzione, che si ripiegano in diverse parti, eglino dunque si uniscono per diversi punti (1). Questa unione tanto più è durevole, quanto è più

(1) *Fisica degli alberi.* Lib. 4. Cap. 4. Art. 3. seconda parte pag. 95. 96.

più perfetta; e tanto è più perfetta, quanto v' ha più *analogia* tra il soggetto, e l' innesto. Questa analogia consiste principalmente nel rapporto dell' organizzazione, e de' liquori. L' innesto deve diventare un ramo *naturale* del soggetto; così quanto più egli avrà de' rapporti co' rami naturali, tanto più avrà della disposizione ad unirsi con esso. I rapporti, che s' incontrano nell' organizzazione, e ne' liquori determinano il tempo, in cui il soggetto ed il nesto entrano in succhio, e la quantità del liquido, che l' uno, e l' altro deono tirare pel loro sostentamento, e pel loro aumento. Io non citerò che un esempio: se s' innesta il *mandorlo* sopra il *fusino*, l' innesto non sussisterà, che pochi anni; da principio ingrosserà molto, e si formerà alla sua estremità inferiore un cordone considerabile. Il soggetto al contrario diminuirà di grossezza, ed a proporzione che si accrescerà la diminuzione, l' innesto sempre più sarà rigoglioso: finalmente lo sposterà affatto, e periranno ambidue. Il mandorlo più rigoglioso, e più primaticcio del fusino gli chiede troppo, e troppo presto. Si osserverà il contrario nel nesto del fusino sopra il mandorlo, e questa osservazione finisce di dimostrare l' importanza dell' analogia (1). Bisogna abbandonare questi principj per giudicare di quegli innesti straordinarj, o mostruosi tanto vantati dagli Autori poco fisici: alcuni seccano senz' aver fatta produzione alcuna; altri sembrano attaccarsi da principio, e dopo seccano. Una sezione attenta di questi fa vedere, che essi doveano i loro spostati progressi ed alcune fibre, che si erano sviluppate, e che aveano tirato tanto sugo, quanto basta per concorrere a piccole produzioni (2). Quello che fa il

ter-

(1) Ibid. Art. 7.

(1) Ibid. pag. 83. 89.

terreno alla *barbatella*, il soggetto lo fa al *nesio*, e siccome il terreno non cangia la *specie* delle *barbatelle*, e così il soggetto non cangia la *specie* de' *nesti*; siccome diverse piante crescono sopra il medesimo terreno, così diversi innesti crescono sopra il medesimo soggetto. Questo risulta dalla proprietà che hanno i corpi organizzati, di *assimilarsi* le materie alimentizie. Noi ancora non sappiamo il meccanismo di questa assimilazione; ma sappiamo, che non dipende da una *impregnazione originale* (1); più tosto dipenderebbe dalla natura, dagli elementi, e dalle fibre, o da' vasi, e dal *diametro* del loro calibro. Dalla prima ne risulterebbe l'*affinità*, ed una specie di attrazione tragli elementi *analoghi* (2). Dalla seconda risulterebbe l'*ammissione* delle molecole *proporzionali ec.* Comunque sia, egli è certissimo, che gli organi appropriati alle *secrezioni* sono sparsi in tutto il corpo dell'albero, e fino nel picciuolo de' frutti. Un cedro grosso come un pisello, innestato pel suo picciuolo sopra un arancio, vi prende tutto il suo aumento, e vi conserva tutti i caratteri propri del cedro (3). Ma ci sono delle sostanze sì strettamente unite alle materie, che si assimila l'essere organizzato, che non ne possono esser separate. Quindi *il sapore di terra*. Io ho profumato delle foglie, e de' fiori immergendo l'estremità inferiore degli steli ne' liquori odoriferi (4). Di una maniera analoga si profumano i pollami (5); si colorano gli ossi, ed i vegetabili ammettono similmente le iniezioni colorate. Io schivo di entrar quì in una più minuta de-

scri-

(1) Vedi l'Articolo 147. VI. Fatto.

(2) Consultate il Capitolo VI.

(3) *Fisica degli Alberi*, seconda parte, pagina 97.

(4) *Ricerche sopra l'uso delle foglie*, Articolo 14. 85. 86.

(5) *Arte di far nascere i Pulcini* 5.

scrizione delle secrezioni *vegetabili*, che non conosciamo meglio delle secrezioni *animali*. Io rimando sopra questa oscura materia all'eccellente opera del Sig. Duhamel, donde ho già presi tanti fatti egualmente certi, ed interessanti. Si può consultare particolarmente l'Articolo, che ha per titolo: *Se tutte le piante di diversa specie si nutrano di un medesimo succo tratto dalla terra.* (1).

FINE DEL PRIMO TOMO.

T A-

(1) *Fisica degli Alberi*, Lib. 5. Cap. 1. Articolo 4. seconda parte pag. 207. e seguenti.

T A V O L A

D E' C A P I T O L I ,

E DEGLI ARTICOLI.



C A P I T O L O P R I M O .

- D**E' germi , principj de' Corpi Organizzati. Pag. 1
1. Fondamento della esistenza de' germi.
 2. Due ipotesi sopra i germi.
 3. Prima ipotesi dello inviluppo .
 4. Seconda ipotesi della disseminazione .

C A P I T O L O I I .

- Del crescimento de' Corpi Organizzati in generale . pag. 3*
5. Difficoltà della materia .
 6. Principj sopra il crescimento . La natura non va a salti .
 7. Gradazioni universali .
 8. Sviluppamenti .
 9. La nutrizione , cagione dello sviluppo .
 10. Alimenti .
 11. Loro preparazione .
 12. Tre operazioni de' vasi .
 13. Composizione de' vasi .
 14. Idee sopra la distribuzione , e l' assimilazione de' sughi nutritivi .
 15. Limiti del crescimento .

C A P I T O L O I I I .

- Della generazione de' Corpi Organizzati . De' Mostri , e de' Muli in generale . Principj , e conghietture sopra la loro formazione .*

pag. 6

16. In-

16. *Introduzione.*
17. *La generazione è un mistero, che forse col tempo si scoprirà.*
18. *Due ipotesi intorno al sito dell'embrione. Prima; che ammette degli uovi, e de'grani prolifici.*
19. *Seconda, che pone l'embrione nel liquore seminale.*
20. *Animali spermatici.*
21. *Sistemi, a' quali hanno data cagione questi animali.*
22. *Applicazione fatta di uno di questi sistemi alla generazione delle Piante.*
23. *Dubbi, e difficoltà sopra il sistema degli animali spermatici.*
24. *Riflessioni sopra le nuove conghietture, che possono immaginarsi per ispiegare la generazione.*
25. *Principio fondamentale intorno alla generazione.*
26. *Che la generazione non è altro, che un semplice sviluppamento di ciò, che esisteva prima in piccolo.*
27. *Che questo sviluppamento si fa per mezzo della nutrizione.*
28. *Quistione intorno a questo soggetto: se il liquore seminale sia il sugo nutritivo destinato a procurare i primi sviluppiamenti del germe?*
29. *Applicazione di questa idea a principali fenomeni della generazione.*
30. *De' Mostri.*
31. *Quattro generi di Mostri.*
32. *De' Muli.*
33. *Quistioni, che nascono da' principali fenomeni della generazione nell'ipotesi dell'Autore.*
34. *Tentativi per risolvere alcune di tali quistioni.*
35. *Qual sia la vera idea, che dee farsi del germe.*
36. *Conseguenza di questa idea.*
37. *Altra conseguenza, che si tira dalla varietà delle parti del corpo animale, relativamente alle loro proporzioni, ed il loro grado di consistenza.*
38. *Rap-*

38. Rapporti del liquore seminale a queste varietà.
39. Supposizione dell' Autore intorno al liquor seminale per tentare di spiegare la generazione.
40. Saggio di spiegazione del Mulo, conforme a' principj dell' Autore, e breve esposizione della sua ipotesi.
41. Obbiezioni, e risposte.
42. Intortanza delle sperienze sopra i bastardi, per ischiarire il misterio della generazione. Riflessioni intorno a questo soggetto.
43. Principio della circolazione nel germe, secondo l' ipotesi dell' Autore.
44. Maniera, con cui l' Autore ravvisa la sua ipotesi: egli la riguarda solo come un romanzo.
45. Riflessioni favorevoli a questa ipotesi.

CAPITOLO IV.

- Della moltiplicazione per incisione, e di quella, che si fa per via di germogli.* pag. 19
46. Fatti principali, che quì si offeriscono all' esame del Fisico.
 47. Primo fatto: La conservazion della vita in ciascuna parte. Spiegazione.
 48. Secondo fatto: La consolidazione della ferita, ed i primi accrescimenti. Spiegazione.
 49. Terzo fatto: La produzione di una nuova testa, e di una nuova coda. Spiegazione.
 50. Difficoltà, che risulta dalla precedente spiegazione.
 51. Risposta alla difficoltà.
 52. Conghietture sulla maniera, onde sono distribuiti i germi ne' vermini moltiplicati per incisione, e del modo, con cui giungono a svilupparvisi.
 53. Esempi tratti dalle piante, e dalle loro barbatelle.
 54. Fatto straordinario. Vermini, che gittano una coda.

da in luogo di una testa . Difficoltà di spiegare questo fatto .

55. Differenza tralla moltiplicazione de' vermi per via di taglio, e quella delle piante.
56. Moltiplicazione del polipo per germoglio . Spiegazione .
57. Obbiezione contro il sistema de' germi, tratta dalla loro prodigiosa piccolezza, e dalla velocità del loro ingrandimento . Risposta .
58. Della conservazione de' germi, e maniera di concepirla .

CAPITOLO V.

Nuove riflessioni sopra i germi, e sopra l'economia organica .

pag. 27

59. Introduzione, e fine dell'Autore .
60. Prima quistione . Perchè certi germi abbiano bisogno del liquore, che somministra il maschio per svilupparsi? Risposta .
61. Seconda quistione . Come il germe continui a crescere dappoichè il liquore seminale ha cessato di agire? Risposta .
62. Terza quistione . Perchè i germi, che si introducono ne' maschi, non vi si sviluppino? Risposta .
63. Quarta quistione . Perchè di tanti germi, che s'introducono nelle femmine, solamente due o tre, giungono a svilupparsi? Risposta .
64. Di ciò, che può avvenire in quei germi, de' quali sono stati fermati i primi sviluppiamenti . Egli è impossibile, che ritornino al loro primiero stato .
65. Quinta quistione . I germi di una medesima specie, son' eglino tutti identici, ovvero vi sono tra essi diverse specie? Risposta .
66. Riflessioni sopra la rassomiglianza de' parti a loro generanti .
67. Sesta quistione . Perchè i bastardi non generino? Risposta .

68. Settima quistione . I germi, che nelle piante producono i rami, producon eglino eziandio la pianticella situata nel grano? Risposta.
69. Ottava quistione . Come si formi una nuova scorza, ed una nuova pelle? Risposta.
70. Nona quistione . Se i cambiamenti, e le metamorfosi degli insetti, la produzione de' denti, e la riproduzione delle zampe ne' Gamberi, provino, esservi de' germi appropriati a diverse parti? Risposta.
71. Decima quistione . Un germe di una data specie, può egli svilupparsi in un tutto organizzato di diversa specie? Risposta.
72. Riflessioni sopra l'origine de' vermi del corpo umano.
73. Undecima quistione . Come si faccia la moltiplicazione senza congiungimento? Risposta.
74. Riflessioni sopra il congiungimento.
75. Conghietture sopra la ragione metafisica del congiungimento.

C A P I T O L O VI.

Della nutrizione considerata relativamente alla generazione. Conghietture sopra la formazione del liquor seminale. pag. 38

76. Dissegno di questo Capitolo.
77. Della nutrizione in particolare, e delle materie alimentizie.
78. Differenza tralle materie alimentative delle piante, e quelle degli animali, e tralla maniera, con cui l'una, e gli altri ricevono il nudrimento.
79. Idea della meccanica della nutrizione. Principj sopra questo soggetto.
80. Degli elementi, e delle loro combinazioni.
81. Due sorte d'Elementi.
82. Della tendenza degli elementi ad unirsi insieme. Riflessioni sopra l'attrazione Newtoniana.

83. Idee sulla maniera , con cui gli elementi entrano nella composizione de' tutti organici.
84. Principj intorno alla meccanica dell' assimilazione.
85. Delle secrezioni in generale.
86. Conghiottura sulla maniera , con cui gli atomi nutritivi si uniscono al tutto organico.
87. Due principali risultati della nutrizione ; il sostentamento delle parti , ed il loro accrescimento per ogni banda.
88. Della disposizione originale delle fibre a distendersi per tutti i versi. Ragione di tal disposizione.
89. Ragioni della solidità , che acquistano le parti , dappoichè hanno ricevuto tutto il loro aumento , e delle cause naturali della morte.
90. Saggio d' applicazione de' principj precedenti allo sviluppo del germe.
91. Supposizione dell' Autore sopra la struttura degli organi della generazione , e sopra la formazione del liquor seminale. Conseguenze naturali di questa supposizione.
92. Riflessioni sopra l' opinione , che ammette , essere il liquor seminale un' estratto del tutto organizzato. Maniera di concepirlo.
93. Perchè i fanciulli non generino?
94. Ricerca sopra la disseminazione.

CAPITOLO VII.

Osservazioni microscopiche sopra i liquori seminali , e sopra le infusioni di diverse spezie . Nuovo sistema sopra la generazione.

pag. 52

95. Occasione , e disegno di questo Capitolo.
96. Preciso delle osservazioni del Signor di Buffon.
97. Seconda sperienza , sopra lo sperma umano.
98. Terza sperienza , sopra lo sperma del cane .
99. Quarta sperienza , sopra lo sperma del cane .
100. Quinta sperienza , sopra lo sperma del coniglio .

101. Sesta sperienza, sullo sperma del coniglio.
102. Settima sperienza, sopra lo sperma del montone.
103. Ottava sperienza, sopra lo sperma delle femmine.
104. Nona sperienza, sopra la mescolanza de' due spermi.
105. Decima sperienza sopra i testicoli della vacca.
106. Undecima sperienza, sul medesimo soggetto.
107. Dodicesima sperienza, sopra l'acqua dell' ostrica, e sopra la gelatina del vitello.
108. Tredicesima sperienza, sopra le infusioni de' granelli del garofano, e del pepe.
109. Quattordicesima sperienza, sopra il discioglimento di una polvere pietrosa coll'acqua forte.
110. Quindicesima sperienza, sopra i latti de' pesci, e particolarmente sopra quelli del calamajo.
111. Riflessioni sopra la bellezza di sì fatte osservazioni microscopiche.
112. Il preciso del nuovo sistema. Molecole organiche comuni a' vegetabili, e agli animali.
113. Che il soprappiù delle molecole organiche, è mandato ad un serbatojo comune; e qual sia questo serbatojo?
114. Liquore seminale. Modello interiore. Globetti mobili.
115. Origine de' vermi nel corpo umano, secondo il nuovo sistema.
116. Vegetazione filamentosa.
117. Della nutrizione, dello sviluppamento, e della riproduzione, secondo il nuovo sistema.
118. Scrgenti de' principali fenomeni della generazione, secondo il nuovo sistema. Origine del Feto.
119. Perchè i piccoli animali sieno più fecondi, che i grandi, i pesci di scaglia, che gli animali pelosi.
120. Osservazioni sopra questo particolare. Del sistema del Sig. de Buffon.
121. Conseguenze generali di questo sistema.

CAPITOLO VIII.

- Esame del nuovo sistema ; comparazione di questo sistema , con quello de' germi. pag. 67*
122. *Principali sorgenti delle obbiezioni , che si possono fare contro il sistema delle molecole organiche.*
123. *Comparazione abbreviata del nuovo sistema col sistema degli antichi , e con quello delle nature plastiche.*
124. *Obbiezioni contro il sistema delle molecole organiche.*
125. *Risutazione delle conseguenze , che i partigiani dell' Epigenesi traggono dalle osservazioni del Malpighi sopra il Pollastro , e di quelle d' Arvejo sopra le Cervie.*
126. *Che il nuovo sistema è ingegnoso , ma meno probabile di quello de' germi.*
127. *Osservazioni sopra l' incastro ; maniera di giudicare della sua possibilità.*
128. *I tutti organizzati , considerati nell' ipotesi dell' incastramento.*
129. *I tutti organizzati , considerati nell' ipotesi della disseminazione.*
130. *Ricerche sopra la natura de' Globetti mobili , ed errori da temersi nelle osservazioni di sì fatti corpi. Vicissitudini delle opinioni umane ; sforzi della ragione , e suoi sbagli.*
131. *Vista del mondo fisico nella supposizione , che i globetti mobili , sieno veri animali.*
132. *Conghietture , e riflessioni sopra la natura di questi animalletti . Osservazioni sopra le nostre idee della economia animale.*
133. *Gli animalletti de' liquori ec. paragonati ai polipi.*
134. *Quello che possa credersi divenire gli animalletti dello sperma , dappoichè questo è stato riassorbito.*
135. *Di ciò , che debba pensarsi dell' apparenza degli ani-*

animaletti nelle materie bollite. Nota importante, ed estratti di lettere del Sig. Reaumur, che portano, che i globetti mobili son veri animali.

- 136. *Spiegazione del Mulo nell'ipotesi dell'Autore, supponendo che il germe sia somministrato dal maschio.*
- 137. *Invito a fare delle nuove sperienze sopra gli animali bastardi, per ischiarire la materia della generazione.*
- 138. *Osservazione sopra gli effetti dell'accoppiamento tra individui di spezie molto distanti.*
- 139. *Che il numero delle spezie può essersi accresciuto da congiunzioni fortuite.*
- 140. *Riflessioni sopra la grandezza degli oggetti, che ci offerisce la materia della generazione.*

CAPITOLO IX.

Nuove scoperte sopra la formazione del Pulcino nell'uovo. Conseguenze di tali scoperte. Comparazione delle sperienze dell'Arvejo sopra la generazione delle Cervoie, con quelle sopra la formazione del Pulcino. pag. 86.

- 141. *Introduzione. Scoperte del Sig. de Haller sopra il Pulcino.*
- 142. *Primo fatto sopra il Pulcino, che dimostra, che il germe appartiene unicamente alla femmina. Conseguenza, che se ne può tirare riguardo al granello.*
- 143. *Secondo fatto. Stato di fluidità delle parti dell'embrione, allorchè incomincia a svilupparsi. Nuova pruova dell'esistenza degli spiriti animali. Come tutte le parti acquistino appoco appoco della consistenza. Conformità co' vegetabili.*
- 144. *Terzo fatto. Per quali cagioni, e con qual ordine tutte le parti dell'embrione divengano visibili, d'invisibili ch'erano per l'avanti. Osservazione sopra l'uovo della Pecora.*

145. *Quarto fatto. Nascita de' colori , e de' sapori. Osservazione sopra un passo del Sig. De Haller intorno alla cagione de' colori ne' vegetabili.*
146. *Quinto fatto. Che le parti dell'embrione si rivestono successivamente di nuove forme , e di nuove positure , che aiutano coll' opacità a farle conoscere. Ordine di questi cangiamenti e loro cagioni meccaniche. Che il Pulcino è originalmente un animale a due corpi, e come.*
147. *Sesto fatto. Che le viscere tuttora fluide adempiscono già le loro funzioni. Osservazioni sopra la maniera con cui si operano le secrezioni.*
148. *Conseguenza importante di questi fatti sopra la prima origine del germe.*
149. *Che le cause de' vivipari contengono de' veri uovi; nuova prova tratta dal gorgoglione viviparo in un tempo, ed oviparo in un altro.*
150. *Simiglianza, e dissimiglianza de' vivipari, e degli ovipari. Analogie del vegetabile, e dell'animale.*
151. *Che il granello, e l'uovo, la gemma, e la vescichetta racchiudono originalmente un embrione, cui rende invisibile la sua trasparenza. Passo del Sig. De Haller, che finisce di dimostrarlo.*
152. *Falsità dell'opinione, che vuole, che il germe risieda originalmente nel liquore apprestato dal maschio.*
153. *Quanto possa contribuire la scoperta del Sig. De Haller a dar del lume sopra il mistero della generazione. Sagacità che pruova nel suo Autore. Arte di vedere.*
154. *Ricapitolazione de' fatti sopra il Pulcino; osservazioni sopra questi fatti. Che lo stato della fluidità non è altro che un'apparenza.*
155. *Riflessioni sopra lo spirito del sistema. Come il Sig. De Haller è tornato dall'epigenesi all'evoluzione.*

156. Risultati generali delle osservazioni del Sig. De Haller sopra il Pulcino.
157. Parallelo di queste osservazioni con quelle d'Arvejo sopra la generazione delle Cervie, esposte dall'Autore della Venere Fisica.
158. Osservazione dell'Autore sopra il punto vivente. Proseguimento del Parallelo.

CAPITOLO X.

- Osservazioni sopra le metamorfosi, sopra l'evoluzione, e sopra l'aumento. pag. 105
159. Uniformità, colla quale i quadrupedi, e gli uccelli si sviluppano. Cambiamenti del Pulcino paragonati alle metamorfosi degli insetti.
160. Apparenze ingannevoli nelle metamorfosi degli insetti. Riflessioni su questa materia. La farfalla esisteva già nel bruco, e come.
161. Conseguenza intorno alla preesistenza originale della farfalla. Il bruco paragonato a un uovo.
162. Fatti che provano, che i vegetabili seguitano, come gli animali, la legge dell'evoluzione.
163. Che l'impulsione del cuore è la principale potenza, che operi lo sviluppamento nell'animale. Osservazioni sopra i cambiamenti del colore del sangue, e sopra l'ossificazione.
164. Esempio notabile dell'evoluzione della membrana ombilicale del Pulcino.
165. Solidi dell'embrione ripiegati originalmente sopra se stessi; esempio preso dalle gambe, e dalle ali della farfalla.
166. Dell'aumentazione della massa de' solidi per l'incorporazione delle materie alimentizie. Iniezioni colorate, atte a dar de' lumi su questa incorporazione.
167. Della traspirazione insensibile, che si fa nel tempo che l'embrione si sviluppa. Idea de' mezzi di
ab-

abbreviare , o di prolungare ad arbitrio la vita dell'embrione . Del principio vitale nell' animale . Conseguenze .

168. Ricerche intorno alla ptenza , che opera lo sviluppamento nel vegetable . Sperienza dell' Autore sopra la prestezza del moto del sugo , e sopra le iniezioni colorate .
169. Effetti generali della potenza vitale nelle piante . Esposizione abbreviata della maniera , onde crescono gli alberi . Paralello di questo crescimento con quello degli ossi .
170. Elementi della teoria dell' Autore sopra la meccanica del aumento .

C A P I T O L O . X I .

Che l' osservazioni sopra la formazione del pulcino finiscono di distrugger il sistema delle molecole organiche . Fatti , che concernono i granelli , le gemme egualmente che gl' innesti , e l' incisioni , o vegetabili , o animali , o la moltiplicazione per germogli , e quelle per divisione naturale

pag. 119

171. Che tutti i fatti sposti nel Capitolo precedente stabiliscio l' evoluzione , come una legge della natura .
172. Che no. v' è dunque alcuna vera generazione nella natura .
173. Opposizioni delle scoperte sopra il pulcino co' sistemi ch' hanno precedute .
174. Riflession sopra gli antichi in occasione di loro opinione sopra la mescolanza de' due semi . Di alcune anioni moderne poco filosofiche intorno all' origi. degli esseri organizzati .
175. Annotazioni sopra l' esposizione , che dà l' Autore al sistema del Sig. de Buffon e sopra un passo della Vera Fisica .

176. Che l' osservazioni del Sig. de Reaumur sopra i globetti mobili , provano la loro vera origine ; e la falsità delle opinioni contrarie .
177. Che le scoperte del Sig. De Haller intorno al pulcino distruggono 'a capo a piè l' edificio innalzato del Sig. de Luffon , e come .
178. Rifutazione del sentimento del Signor Needham , sopra l' origine del gemo nel granello , e sopra la maniera colla quale è fecondato esso granello .
179. Che la scoperta intorno all' origine del pulcino , conduce per analogia a quella di tutti gli esseri organizzati .
180. Origine dei rami negli alberi . La gemma .
181. Origine della plantua . Il granello . Comparazione del granello col nuovo . Differenza del granello , e della gemma , o bottone . La barbatella .
182. Esperienza curiosa per iscoprire l' uso de' Lobi nel granello .
183. L' innesto . Idea della maniera colla quale si unisce al subbietto . Esperienza contraria all' opinione , che ammette un' una spezie di Filtro per separare i sughi .
184. Innessi naturali , origini di diverse mtruosità .
185. Polipi , che si moltiplicano per gemoglio , e come .
186. Rampolli de' vegetabili . Moltiplicazione della lenticchia acquatica per germoglio , che imita quella de' polpi .
187. Polipi carichi in un tempo medesimo di più generazioni di polipi .
188. Polipi a faggio . Origine di alcune produzioni marine , che sono state prese per piae .
189. Polpi moltiplicati dalla barbatella per sezione , e come .
190. Idre prodotte per sezione .
191. Polpi tritati , e ciò , che ne risulta . Come si for-

si formi il nuovo stomaco ne' più piccioli frammenti.

192. Sperienze dell' Autore sopra i vermi acquatici, che moltiplicano come i polpi a barbatelle (o per incisione). Idea dell' organizzazione di tali vermini. Regolarità della circolazione del sangue sino nelle minori porzioni . Scale degli aumenti delle parti tagliate . Verme , che gitta successivamente dodici teste .
193. Che i vermi di terra moltiplicano parimente per incisione .
194. Che la stessa proprietà è stata scoperta dopo in altre spezie di animali .
195. Che questa proprietà non è meno estesa nel vegetabile , che nell' animale . Prove : le incisioni delle foglie ec .
196. Cagione finale di questa proprietà negli insetti .
197. Polpi , e anguille , che moltiplicano naturalmente per barbatella .
198. Millepiedi , che moltiplica parimente di per se stesso per barbatella , e come .
199. Moltiplicazione de' polipi a mazzì per divisione naturale .
200. Moltiplicazione de' polipi a imbuto per divisione naturale .
201. Moltiplicazione per divisione naturale di certi polipi a mazzo , denominati polpi a bulbi o cipolle .
202. Polpi innestati .
203. Altro esempio d' innesti animali : l' innesto dello sprone del gallo sopra la cresta .
204. Rifutazione dell' opinione singolare di Vallisnieri sopra la formazione de' bachi Tenia , o Solitarj .
205. Polipi rovesciati , o raddrizzati . Fenomeni notabili , che seguono il rivoltamento incompleto .
206. Prontezza delle riproduzioni ne' polpi .
207. Riflessioni sulla bella storia dei polpi del Signor Trem .

Trembley, e sopra un passo dell' Istoria dell' Accademia di Prussia.

CAPITOLO XII.

- Riflessioni sopra la scoperta de' polpi, sopra la scala degli esseri naturali, e sopra le regole pretese generali. Esposizione abbreviata di vari fatti concernenti i vegetabili, e con questa occasione dell' analogia degli alberi, e degli ossi. Saggio di spiegazione di questi fatti.* pag. 174
208. *Che noi siamo meglio disposti per spiegare le maraviglie de' polpi, che non si era a tempo della loro scoperta. Riflessioni sopra le cagioni, che hanno ritardata questa scoperta.*
209. *Che il polpo mette in chiaro la gradazione, che è tra tutte le parti della natura. Estratto di una lettera di Leibnitz, che prova, aver egli sospettata l' esistenza di questo insetto. Riflessioni sopra la scala degli esseri naturali pubblicata dall' Autore.*
210. *Osservazioni sopra il sentimento del Sig. Bourguet, e di alcuni altri Autori riguardo alla pretesa organizzazione de' sali, de' cristalli, e delle pietre. Che noi ignoriamo il passaggio dal fossile al vegetabile.*
211. *Osservazioni intorno all' opinione del Signor de Maupertuis sopra la pretesa realtà delle interruzioni nella scala degli esseri naturali. Riflessioni sopra i progressi dello spirito umano nelle ricerche fisiche.*
212. *Lumi, che i polpi possono spandere sopra diversi punti di fisiologia.*
213. *Che i polpi c' insegnano a diffidare delle regole generali. Riflessioni sopra l' uso e sopra l' abuso dell' analogia.*
214. *Introduzione al saggio di spiegazione delle riproduzioni vegetabili, ed animali.*

215. Delle piaghe degli alberi , e di ciò che siegue nella loro consolidazione.
216. Legge della consolidazione delle piaghe vegetabili. Risultati generali.
217. Sperienza , che conferma la produzione di un nuovo legno.
218. Che il legno perfetto è incapace di far nuove produzioni . Ordine , e progressi dell' indurimento ne' diversi strati.
219. La sugna dell' albero , sua natura , e sue funzioni.
220. Differenze caratteristiche tra la struttura del legno , e quella della scorza . Che non v' è vera conversione della scorza nel legno . Ragioni di questa osservazione . Scioglimento di una difficoltà del Sig. Duhamel.
221. Analogia tra la formazione del legno , e quella degli ossi , secondo l' idee del Sig. Duhamel.
222. Compendiosa esposizione del sentimento del Sig. De Haller sopra la formazione delle ossa contrapposta a quella del Sig. Duhamel.
223. Preciso della risposta del Sig. Fougereux alle obiezioni del Sig. De Haller per servire di schiarimento all' analogie del Sig. Duhamel.
224. Ragioni , che inducono l' Autore a sospendere il suo giudizio sopra la quistione controversa tralli due celebri Fisici.
225. Risultati generali de' fatti indipendenti dalla quistione agitata.
226. Cordoni delle piaghe vegetabili , loro natura , loro formazione , loro effetti. Maniera di moltiplicare per incisione tutte le spezie di alberi.
227. Si conferma l' uso , e l' importanza de' cordoni nelle barbatelle.
228. Esperienze dell' Autore sopra la vegetazione delle barbatelle.
229. Osservazioni sopra il succhio discendente causa della

- della produzione de' cordoni . Che questo succhio scende mediante una forza, che gli è propria.
230. Effetto de' due cordoni, che nascono sopra e sotto la piaga.
231. Esperienze, che provano, che questi due cordoni sono della medesima natura. Alberi piantati colle radici all'insù, e che si attaccano.
232. Conseguenza tratta dalle precedenti esperienze contro le valvule, che alcuni Autori hanno ammesse ne' vasi. Esperienza dell' Autore intorno a questa materia.
233. Perchè il cordone superiore sia più grosso dell' inferiore. Azione delle foglie stabilita dall' Autore.
234. Che i cordoni favoriscono l' eruzione de' germi ; ma che non gli sono necessari . Prove tratte da alcune barbatelle singolari dell' Autore.
235. Dell' unione dell' innesto col suo soggetto considerata nelle diverse spezie d' innesti.
236. Saggio di spiegazione della rigenerazione delle piaghe vegetabili. Rifurse preparate dalla natura.
237. Come tutte le fibre appoco appoco s' induriscono e sembrano rivestire un' altra natura.
238. Germi sparsi in tutto il corpo della pianta. Sorgente feconda di riproduzioni . Prove di questa diffeminazione.
239. Come certe determinate circostanze favoriscano l' eruzione de' germi.
240. Come una semplice barbatella, una semplice foglia ec. possino fare di per se medesime delle nuove produzioni.
241. Spiegazione degli innesti.

